

В. Лучникъ (Кіевъ).

О нѣкоторыхъ *Platysmatini* австралийской фауны
(Coleoptera, Carabidae).

V. Lutshnik (Kiev).

Sur quelques *Platysmatini* de la faune australienne (Coleoptera,
Carabidae).

Я нахожу полезнымъ произвести провѣрку правильности сведенія въ синонимы того или иного вида изъ числа установленныхъ В. Мочульскимъ, такъ какъ большинство авторовъ не имѣло возможности осмотрѣть типы Мочульскаго.

По словесному сообщенію А. П. Семенова-Тянь-Шанскаго, покойный Т. С. Чичеринъ былъ до конца своей жизни увѣренъ, что коллекція Мочульскаго безвозвратно погибла, почему при оцѣнкѣ формъ, установленныхъ послѣднимъ, онъ пользовался исключительно лишь оригинальными описаніями. Мнѣ пріятно отмѣтить, что, имѣя только весьма несовершенные діагнозы Мочульскаго для сужденія о формахъ, установленныхъ послѣднимъ, Т. С. Чичеринъ почти безошибочно выяснял истинное ихъ положеніе.

Ознакомиться съ оригиналами коллекціи Мочульскаго, нынѣ находящейся въ Зоологическомъ Музеѣ Императорскаго Московскаго Университета, я могъ благодаря любезности директора послѣдняго, проф. Г. А. Кожевникова, которому считаю нужнымъ выразить мою живѣйшую признательность.

Gen. *Catadromus* Mac l. (1825).

В. Мочульскимъ въ 1869 году было предложено названіе *Catadromides*¹⁾ для рода, въ который входитъ его *Catadromus cordicollis* Motsch. Имя *Catadromides*, какъ не мотивированное, должно считаться за *nom. nudum*.

¹⁾ Motschulsky, V. Genres et espèces d'insectes publ. dans dif. ouv., 1868, p. 22.

Выдѣлять въ качествѣ особаго рода группу *Catadromides* Motsch. in litt. я не нахожу возможнымъ, въ виду отсутствія существенныхъ признаковъ, которыми эту группу можно было бы охарактеризовать. Сердцевидная форма переднеспинки и присутствіе съ каждой стороны щитка не болѣе двухъ щетинконосныхъ поръ, что впрочемъ наблюдается еще у нѣкоторыхъ видовъ рода *Catadromus* MacI. ²⁾, не могутъ служить основаніемъ для выдѣленія особаго рода.

Catadromus lacordairei Boisd. (1835).

Т. С. Чичеринъ ³⁾ вполне правильно свелъ въ синонимы къ этому виду *C. cordicollis* Motsch. ⁴⁾. Я имѣю передъ глазами типъ послѣдняго, ничѣмъ отъ *C. lacordairei* Boisd. не отличающійся.

Subgen. *Notonomus* Chaud. (1865).

Мнѣ, къ сожалѣнію, знакомо сравнительно немного представителей этого подрода. Тѣмъ не менѣе я позволю себѣ отмѣтить, что онъ безусловно долженъ быть раздѣленъ на нѣсколько группъ.

Не предлагая сейчасъ новыхъ названій, отмѣчу только, что между прочимъ могутъ быть различаемы слѣдующія секціи, въ качествѣ каковыхъ я разсматриваю „роды“ В. Мочульскаго.

Сectio *Orbitus* Motsch. (1865). Отличается элитрами, у которыхъ не только 3-ій, но также и вторичные промежутки (2-ой, 4-ый, 6-ой) съ глубокими ямками. Типъ: *Platysma opacicolle* Chaud.

Сectio *Ternox* Motsch. (1865). Надкрылья съ неясно выраженными, къ боковому краю совсѣмъ сглаженными бороздками. Типъ: *Platysma molestum* Chaud.

Такимъ образомъ я, не уничтожая предложенныхъ В. Мочульскимъ названій, разсматриваю ихъ въ качествѣ обозначеній для группъ, подчиненныхъ подроду *Notonomus* Chaud.

При дальнѣйшемъ раздѣленіи послѣдняго, секціей *Notonomus* s. str. должна считаться группа видовъ сближаемыхъ съ *Platysma aeneomicans* Chaud.

Platysma (Notonomus) accedens Chaud. (1865).

Mr. Sloane ⁵⁾, совершенно справедливо считаетъ синонимомъ къ этому виду *Neuropates pristonychoides* Motsch. (1865) ⁶⁾. Я имѣю передъ глазами типъ послѣдняго, который не идентиченъ съ

²⁾ Tschitschérine, T. Ann. Mus. Zool. Acad. Pétersb. I, 1896, p. 3—4.

³⁾ Tschitschérine, T. Horae Soc. Entom. Ross. XXV, 1891, p. 169.

⁴⁾ Motschulsky, V. Bull. Soc. Natur. Moscou, 1864, n^o 4, p. 350.

⁵⁾ Sloane, Th. Proc. Lin. Soc. New South Wales, 1902, p. 565.

⁶⁾ Motschulsky, V. l. c., p. 264.

Notonomus pristonchoides Chaud. (1874)⁷⁾ = *N. angustibasis* Sloane (1902).

Platysma (Notonomus) mastessi Casteln. (1868).

Очевидно, это название является болѣе правильнымъ для обозначенія вида, обычно называемаго *Notonomus nitidicollis* Chaud. (1865).

Послѣднее имя, какъ занятое раньше⁸⁾, не можетъ быть сохранено.

Platysma (Notonomus) dyscoloides Motsch. (1865).

Отъ типичнаго экземпляра этого вида въ коллекціи В. Мочульскаго сохранились только обломки. Судя по нимъ, трудно рѣшить, что это за видъ. Вѣроятно же всего онъ заслуживаетъ сохраненія, а синонимами къ нему должны быть отнесены *Feronia victoriae* Casteln. (1868) и *F. semiviolacea* Casteln. (1868).

Platysma (Notonomus) heroicum, nom. nov.

Это название здѣсь предлагается для *Notonomus colossus* Sloane (1902)⁹⁾, такъ какъ послѣднее имя было раньше занято въ родѣ *Platysma* (Воп.) Tschitsch.¹⁰⁾

Название *heroicum* примѣняется мною по любезному совѣту А. П. Семенова-Тянь-Шанскаго, которому я очень признателенъ за многія цѣнныя указанія, сдѣланныя имъ мнѣ.

Platysma (Notonomus, Orbitus) opacicolle Chaud. (1865).

Синонимомъ къ этому виду является *Orbitus purpuripennis* Motsch. (1865), что впрочемъ ясно и изъ оригинальнаго описанія послѣдняго¹¹⁾.

Platysma (Sarticus) oberulum Chaud. (1865).

Синонимомъ къ этому виду¹²⁾, но не къ *Platysma civile* Germ.¹³⁾, является *Sarticus orbicollis* Motsch. (1865), типичный экземпляръ котораго имѣется у меня передъ глазами. Видъ этотъ легко отличается по формѣ своей переднеспинки.

⁷⁾ Chaudoir, M. Ann. Mus. Civ. Genova, 1874, p. 588.

⁸⁾ Motschulsky, V. Mém. Acad. Pétersb., XIII, 1845, p. 160.

⁹⁾ Sloane, Th. I. c., p. 314.

¹⁰⁾ Le Conte. Ann. Lyc. New-York, IV, p. 243.

¹¹⁾ Motschulsky, V. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1864, n^o 4, p. 248.

¹²⁾ Sloane, Th. Proc. Lin. Soc. New South Wales, 1889, p. 507; Tschitschérine, T. Horae Soc. Entom. Ross., XXVII, 1893, p. 457.

¹³⁾ Tschitschérine, T. Horae Soc. Entom. Ross., XXV, 1891, p. 169.

Platysma (Sarticus) discopunctatum Chaud. (1865).

Въ коллекціи Мочульскаго имѣется экземпляръ, снабженный этикеткой: „*Sarticus ovipennis* Motsch.“. Очевидно, это не что иное какъ *Sarticus ovicollis* Motsch. (1865), типа котораго въ коллекціи нѣтъ. Экземпляръ этотъ относится къ *discopunctatum* Chaud., чѣмъ подтверждается правильность предположенія Т. С. Чичерина объ идентичности этихъ двухъ видовъ¹⁴⁾.

Отмѣчу здѣсь кстати, что пунктировка эпистернъ у видовъ подрода *Sarticus* Motsch. врядъ-ли можетъ служить, въ виду своего непостоянства, для различенія видовъ этого подрода¹⁵⁾. Я надѣюсь еще вернуться къ этому вопросу.

Sudgen. Coronocanthus MacI. (1877).

Я нахожу нужнымъ выдѣлять подродъ *Coronocanthus* MacI. и разсматривать его въ качествѣ группы, хотя и близкой, но не подчиненной подроду *Sarticus* Motsch.¹⁶⁾.

Помимо значительнаго отличія во вѣшнемъ видѣ у *Pl. (Coronocanthus) quadrisulcatus* Chaud. (1878) отъ видовъ подрода *Sarticus* Motsch., я для этого раздѣленія вижу основанія въ значительно разнящемся строеніи мужскаго копулятивнаго аппарата у видовъ этихъ двухъ группъ.

Platysma (Rhytisternus) carpentarium Sloane (1894).

Этотъ видъ, описанный изъ Сѣвернаго Квинслэнда¹⁷⁾, имѣется у меня изъ Викторіи. Быть можетъ, правильнѣе было бы считать его не самостоятельнымъ видомъ, но лишь формой отъ *Pl. liopleurum* Chaud., таксономическое значеніе которой мнѣ не совсѣмъ ясно.

Platysma (Rhytisternus) liopleurum Chaud. (1865).

Amastus nigricolor Motsch. (1865) является, какъ это было указано Т. С. Чичеринымъ¹⁸⁾, не болѣе, какъ синонимомъ этого вида.

Platysma (Simodontus) australe Dej. (1828).

Предположеніе Т. С. Чичерина объ идентичности этого вида съ *Orthomus antipodus* Motsch. (1865)¹⁹⁾ вполне правильно. Оригинальный экземпляръ Мочульскаго вполне подходитъ къ описанію *Pl. australe* Dej, даваемому Дежеан'омъ²⁰⁾ и Слоане²¹⁾

¹⁴⁾ Tschitschérine, T. I. c., p. 169.

¹⁵⁾ Sloane, Th. I. c., pp. 502-503.

¹⁶⁾ Tschitschérine, T. Horae Soc. Entom. Ross., XXXV, 1902, p. 508 (nota).

¹⁷⁾ Sloane, Th. Proc. Lin. Soc. New South Wales, 1894, pp. 437, 443.

¹⁸⁾ Tschitschérine, T. Hor. Soc. Entom. Ross., XXV, 1891, p. 169.

¹⁹⁾ Tschitschérine, T. I. c.

²⁰⁾ Dejean. Spec. Gén. des Coléopt., III, 1828, p. 262.

²¹⁾ Sloane, Th. Proc. Lin. Soc. New South Wales, 1898, p. 481.