

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА Agonum Bon.

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР И КАВКАЗА /в СССР около 80 видов/

I /2/. Надкрылья резко двуцветные, с большим синим или зеленым пятном в вершинной части; голова и переднеспинка зеленые, реже синие, основание усиков и ноги желтые. 6.0 - 8.0 мм - Ср. полоса, юг; Кавказ. Наименее гигрофильный вид рода. На сухих лугах, в степи, на горных склонах, лесных опушках и т. д. Часто

..... I. *A. (Agonum) dorsale* (Pont.)

2 /1/. Надкрылья одноцветные, реже со светлым боковым краем /и иногда швом/ .

3 /82/. 3-й членик усиков голый помимо обычных вершинных щетинок.

4 /17/. Задние углы переднеспинки резкие, более-менее прямоугольные, боковые края переднеспинки явно выемчатые.

5 /6/. Лапки сверху со срединной бороздкой. 3-й промежуток надкрылий с двумя дорсальными щетинконосными порами. Смоляно-черный, бока и шов надкрылий обычно бурые, усики, щупики и ноги желтые. Основание переднеспинки густо пунктировано. 6,8 - 9,0 мм - Лесная и лесостепная зоны. На открытых заболоченных местах близ воды; нечасто

..... 2. *A. (Agonum) alpinus* Fabr. (редко в Гз.)

6 /5/. Лапки без срединной бороздки. Надкрылья обычно с 3 дорсальными порами.

7 /8/. Переднеспинка узкая, едва шире головы, ее боковой край очень узко окантован. Бороздки надкрылий с грубыми точками. Меньше:

5.0 - 6,6 мм. Смоляно-бурый, надкрылья желто-бурые, переднеспинка иногда рыжая, усики и ноги желтые. - Кроме тундры и сухих степей; Кавказ. В заболоченных лиственных и смешанных лесах и на лесных болотах; часто

..... 3. *A. (Agonum) obscurus* Hbst

8 /7/. Переднеспинка гораздо шире головы, ее боковые края широко окантованы. Бороздки надкрылий в мелких и нежных точках. Крупнее: не менее 8 мм. Верх черный или бурый, усики и ноги едва светлее тела

9 /14/. Нижние крылья развиты, плечи выступающие. Верх черный, голени /редко ноги целиком/ иногда красно-бурые.

10/11/. Задние углы переднеспинки большие, резко прямоугольные; боковые края перед ними сильно выемчатые. Надкрылья очень широкие с глубокими бороздками. Черный, усики, щупики и ноги черно-бурые, голени иногда светлее. 9 - 13 мм. Кроме крайнего севера; Кавказ. В лесах, парках и т.п. Обычен.

..... 4. *A. (Platynus) assimile* Payk.

II /10/. Задние углы переднеспинки короткие, зубовидно выступающие в сторону. Боковые края перед ними слабо выемчатые.

12/13/. Надкрылья примерно втрое длиннее переднеспинки. Наибольшая ширина переднеспинки в передней трети. Эпистерны заднегруди вдвое длиннее своей ширины. 10,5 - 12 мм - Юг лесной и лесостепная зоны. Реже предыдущего.

5. A. (Platynus) kzinickii Speck.

13/12/. Надкрылья примерно вчетверо длиннее переднеспинки. Наибольшая ширина переднеспинки немного впереди середины. Эпистерны заднегруди втрое длиннее своей ширины. 11 - 14 мм. - Юг лесной и лесостепной зоны. В сырых лесах, местами часто.

6. A. (Platynus) longiventris alkamb.

14/9/. Нижние крылья редуцированы, плечи округлены. Верх смоляно-бурый или бурый. Высокогорные виды.

15/16/. 3-й промежуток надкрылий с 2 порами. Верх смоляно или красно-бурый. 9,5 - 10,5 мм - Укр. Карпаты, высокогорье. Редко.

7. A. (Platynus) glaciale Rtt.

16/15/. 3-й промежуток надкрылий с 4 порами. Верх черно-бурый. 7 мм. - Большой Кавказ. Высокогорье. Недостаточно изученный вид.

8. A. (Platynus) grandicollis Matsud.

17/4/. Задние углы переднеспинки тупоугольные или округлены; боковые края перед ними не выемчатые или едва выемчатые.

18/21/. Голова за глазами с резкой перетяжкой, хорошо видной сверху. Лоб обычно с 2 светлыми пятнами.

19/20/. Смоляно-бурый, усики и ноги рыжие, вершины члеников усиков и бедра часто затемнены. Задние углы переднеспинки совершенно округлены. 7,8 - 11 мм. - Лесная и лесостепная зоны; Запад Предкавказья. В заболоченных лиственных лесах под мхом и опавшими листьями. Не часто.

9. A. (Platynus) Greene Gyll.

20/19/. Черный или смоляно-черный, усики и ноги едва светлее. Задние углы переднеспинки слегка намечены. 10 - 11,5 мм. - Лесная зона. В заболоченных сырых таежных лесах и на сфагновых болотах. Редко.

10. A. (Platynus) mannetscheimi Dej.

21/18/. Голова за глазами без перетяжки.

22/27/. Голова вместе с сильно выпуклыми глазами такой же ширины или едва уже, чем переднеспинка. Тело уплощенное, надкрылья с параллельными боками. 4,2 - 8 мм.

23/26/. Тело сплошь черное, верх иногда с бронзовым отливом

24/25/. Надкрылья на 3 промежутке с 4 /редко с одной стороны 3 или 5/ яркообразными дорсальными порами, занимающими всю ширину промежутка. Верх обычно с легким бронзовым блеском. 4,2-6 мм. - Лесная и лесостепная зоны; б.ч. на гаях. Местами часто.

11. A. (Sericocha) quadripunctata (Degeer)

25/24/. Надкрылья на 3 промежутке с 3 /редко с одной стороны 4/ небольшими щетинконосными дорсальными порами. Верх без металлического блеска, черный. 6,4 - 8 мм. - Тайга; редок и спорадичен.

12. A. (Sericocha) bogemanni (Gyll)

26/23/. Верх металлический: Голова и переднеспинка зеленые, надкрылья бронзово-бурые или бронзовые. 3 промежуток с 4 небольшими порами. Усики и ноги ржаво-бурые, 1-й членик усиков светлее, ноги иногда затемнены. 5,5 - 6,5 мм. - Северный Урал /Сибирь/. Б.ч. в горных районах.

13. A. (Stictanctus) alpinus Matsud.

27/22/. Голова с глазами обычно гораздо уже переднеспинки; если немного уже, то длина больше 8 мм.

28/29/. Верх зеленый или бронзовый; широкие боковые края надкрылий желтые, низ черный, 1-й членик усиков и ноги желто-бурые, голени желтые. 8,8 - 10,4 мм.- Ср. полоса, юг; Кавказ. На влажной глинистой или песчанной почве по берегам водоемов. Часто.

.....14. A. (s. str.) marginatum L.

29/28/. Верх одноцветный или двуцветный. Надкрылья без желтой боковой каймы.

30/43/. Основные вдавления переднеспинки с грубой сливающейся пунктировкой. Дорсальных пор на надкрыльях обычно 5 или больше, редко 3-4. Боковые края переднеспинки обычно широко отогнуты.

31/32/. Надкрылья с 5-7 крупными порами, занимающими всю ширину 3 промежутка. Надкрылья блестящие, 0 - матовые; верх медный или бронзовый, редко - зеленый. 8-9,5 мм. - Лесная и лесостепная зоны. Местами обычен.

.....15. A. (s. str.) impressum Panz.

32/31/. Надкрылья на 3 промежутке с небольшими порами, не занимающими всю ширину промежутка.

33/38/. Верх металлический, низ черно-зеленый, усики и ноги черные или смоляно-черные.

34/35/. Переднеспинка с маленькими, но явственными задними углами. Надкрылья у самцов слабо-блестящие, у самок матовые. Окраска варьирует: обычно переднеспинка медно-красная, надкрылья зеленые, иногда пришовные промежутки или надкрылья целиком бронзовые; иногда весь верх бронзовый / или зеленый. 8,5 - 9,5 мм. - Запад, юг; Кавказ; преобладает на юго-востоке. Б.ч. на лугах, активен днем. Нередко.

.....16. A. (s. str.) viridicinctum Gress.

35/34/. Задние углы переднеспинки совершенно округлены. Надкрылья у обоих полов блестящие.

36/37/. Верх обычно двуцветный; голова и переднеспинка ярво-зеленые или сине-зеленые, надкрылья медно-красные с зелеными краями; редко одноцветный, черно-бронзовый или черно-зеленый. Наибольшая ширина переднеспинки близ середины. Дорсальных пор 6-7 /иногда 4-5 или 8/. Крупнее: 7,6 - 10 мм. - Кроме тундры и сухих степей; Кавказ. На открытых влажных местах, б.ч. на лугах. Часто.

.....17. A. (s. str.) sexpunctatum L.

37/36/. Верх обычно одноцветный: бронзовый, зеленый, медно-красный, редко синий или черно-бронзовый. Иногда двуцветный, но не столь контрастно окрашенный, как предыдущий. Переднеспинка сильнее сужена кзади; ее наибольшая ширина впереди середины. Дорсальных прр обычно 4-5 /реже 6-7/. Меньше: 6,5 - 8 мм. - Север, ср. полоса. На сфагновых болотах; нередко.

.....18. A. (s. str.) miceti (Panz)

38/33/. Верх черный или смоляно-бурый, надкрылья иногда бурые, основание усиков и ноги буро-желтые или смоляно-бурые.

39/40/. Переднеспинка с очень резкими, тупоугольными, на вершине заостренными задними углами, ее ширина едва больше длины. Верх черный, слабо блестящий, иногда с синеватым отливом; усики, ноги и эпиплевры надкрылий смоляно-бурые. 8,5 - 9,5 мм. - Восточн. Кавказ /Ср. Азия/. Преимущественно в тугаях.

.....19. A. (s. str.) punctifera Ret.

40/39/. Задние углы переднеспинки на вершине округлены; ее ширина заметно больше длины. Надкрылья обычно бурые или хотя бы с бурыми краями.

41/42/. Голова и переднеспинка черные со свинцовым блеском; узкий боковой край переднеспинки просвечивает желтым; надкрылья, основание усиков и ноги буро-желтые. Надкрылья коротко-овальные, на 3 промежутке с 3 порами. 8 - 9 мм. - Южн. берег Крыма. Редко.

.....20. *A. (S. str.) sordidum Dej.*

42/41/. Голова и переднеспинка черные без металлического блеска; надкрылья темно-бурые, на вершине часто немного светлее, основание усиков и ноги буро-желтые. Надкрылья удлинено-овальные, на 3 промежутке с 3-5 порами. 8-9мм. - Закавказье/Пер.Азия

.....21. *A. (S. str.) bodemeyeri Rtt.*

43/30/. Основные вдавления переднеспинки гладкие или в неясственных нежных морщинках, обычно более плоские. Боковые край переднеспинки обычно узко отогнуты. Дорсальных пор на 3 промежутке 3 /редко 4-6/.

44/45/. Коготковый членик задних лапок /без коготков/ явственно короче 3 и 4 вместе взятых. 3й промежуток надкрылий с 6 /реже 3/5/ порами. Верх бронзовый, голова и переднеспинка иногда зеленоватые; усики, голени и лапки красно-бурые. Надкрылья удлинено-овальные, слабо-выпуклые, бороздки резкие, без точек, реже с единичными точками, промежутки плоские. Задние углы переднеспинки резко намечены, выступающие, ее основные ямки нежно морщинистые. Ноги, особенно задние, очень длинные и тонкие. 6,5 - 9 мм. - Лесная и лесостепная зоны; вдоль рек заходит в степную зону. У воды, нередко. Летит на свет.

.....22. *A. (S. str.) gracilipes Duft.*

45/44/. Коготковый членик задних лапок /без коготков/ не короче или длиннее, чем 3 и 4 вместе. 3й промежуток с 3 /реже с 4/ порами.

46/57/. Перед вершиной 5 бороздки надкрылий соседние промежутки вдавлены, образуя неглубокую продольную ямку.

47/52/. Верх с явственным, иногда слабым металлическим блеском

48/51/. Задние углы переднеспинки полностью округлены. Верх обычно ярко-металлический.

49/50/. Верх обычно двуцветный: голова и переднеспинка зеленые, надкрылья бронзовые, редко синие. Иногда верх сплошь зеленый или темно-бронзовый. Микроскульптура надкрылий поперечно сетчатая. Усики и ноги черно-бурые. 1й членик усиков и ноги обычно светлее. 6,9-9,5 мм. - Кроме крайнего севера и сухих степей; Кавказ. На открытых, часто глинистых, умеренно-сухих местах, в т.ч. на полях. Обычен.

.....23. *A. (S. str.) murelleri Hbst.*

50/49/. Верх обычно одноцветный, бронзовый или зеленый, иногда бронзово-черный. Микроскульптура надкрылий правильно-изодиаметрическая. 1й членик усиков и голени темно-бурые. 7,5 - 8,5 мм. - Побережье Белого моря/ Сибирь, Горы Казахстана и Ср. Азии/ по берегам водоемов.

.....24. *A. (S. str.) sahlbergi Chd. (archangolicum Sachl.)*

51/48/. Задние углы переднесп. тупые, но явственные. Верх темно-бронзовый или бронзово-черный, слабо металлически-блестящий ноги черные с едва более светлыми голеними, редко красно-бурые 6,5-7,5 мм. - Тайга и смешан. леса на юг до Киевской и Куйбышевской областей. У воды. Довольно редко /см. также тезу 74/

.....25. *A. (S. str.) dollens C. Sachl.*

52/47/. Верх черный без явственного металлического блеска.

53/56/. Переднеспинка заметно шире своей длины.

54/55/. Отношение ширины переднеспинки к длине 1,30 - 1,35.

Надкрылья умеренно выпуклые. Верх и ноги одноцветно черные.

7,2 - 9,0 мм. - Кавказ. В горах. *(var. niger Rtt.)*  
..... 26. *(1. str.) hexacolum Chd.*

55/54/. Отношение ширины переднеспинки к длине 1,15 - 1,25.

Надкрылья уплощенные. Голова более длинная, глаза слабо выпуклые, виски длинные. Верх черный, голени и эпиплевры надкрылий часто рыжеватые. Надкрылья умеренно блестящие. У самца вершина эдеагуса длиннее загнута. 6,5 - 8,8 мм. - Молдавия, Крым; Кавказ /Копет-даг/. Б.ч. на солончаках, реже по берегам рек и на болотах.

..... 27. *(1. str.) atratum Dej*

56/53/. Переднеспинка едва шире своей длины. Голова шире, глаза сильнее выпуклые, виски короче. Переднеспинка и надкрылья более выпуклые; надкрылья блестящие; усики и ноги смоляно-черные.

У самца вершина эдеагуса короче загнута. - Закарпатье /ЧССР, Венгрия/. Отличия от *A. atratum Dej* требуют проверки.

..... 28. *(1. str.) makolekii Kovbal.*

57/46/. 5 бороздка в вершинной части не углублена.

58/59/. Задние углы переднеспинки резко намечены, выступающие. Верх черный, матовый, особенно у самок, без металлического блеска. Основание 1 членика усиков, основание бедер и эпиплевры надкрылий иногда рыжеватые. 4-5 членики лапок сверху с явственным килем. 8,5 - 10 мм. - Юг; Кавказ. Берега водоемов, в т.ч. солончатых; летит на свет. Нередко.

..... 29. *(1. str.) lugens Duft.*

59/58/. Задние углы переднеспинки округлены или едва намечены.

60/65/. Верх ярко-металлический. Бороздки надкрылий к вершине не углублены. Усики и ноги обычно сплошь черные.

61/62/. Переднеспинка едва шире своей длины, кзади сужена едва сильнее чем кпереди; ее задние углы совершенно округлены; окантовка переднего края обычно цельная. Верх металлически-зеленый или бронзовый, эпиплевры надкрылий часто бурые. 7,0 - 9,5 мм. - Крайний юг от Молдавии до Нижнего Поволжья. Кавказ /Ср. Азия/.

Б.ч. в поймах рек, плавнях и т.п., летит на УФ-свет. *(Stenoderum Chd.)*  
..... 30. *(1. str.) extensum Men*

62/61/. Переднеспинка заметно шире своей длины; кзади сужена значительно сильнее, чем кпереди; ее задние углы тупые или округленные, но всегда явственные; окантовка переднего края обычно прерванная. Тело сверху уплощено; надкрылья короткие, параллельные.

63/64/. Надкрылья с умеренно тонкими, равномерными по всей длине резкими бороздками, их промежутки слабо выпуклые. Скульптура переднеспинки мелкоморщинистая, без точек. Верх медный, бронзовый, зеленый, редко синий. 8,5 - 10,0 мм. - Кавказ /среднегорье и высокогорье/, б.ч. на лугах.

..... 31. *(1. str.) magicolle Chd.*

К этому виду очень близок и возможно является его синонимом недостаточно изученный *(1. str.) impressostriatum Motsch*

64/63/. Надкрылья с очень тонкими, слабо углубленными бороздками, 7я кпереди почти исчезает. Бронзовый, зеленый или синий. 8-9 мм. - Армения, зап. Азербайджан; горы. В коллекциях редок.

..... 32. *(1. str.) brachiderum Chd.*

65/60/. Верх черный или черно-бурый, самое большое надкрылья и края переднеспинки с легким бронзовым или зеленым отливом. Бороздки надкрылий в верх. части обычно углублены, а промежутки выпуклые.

66/69/. Основной кант надкрылий сильно изогнут, образует более или менее прямой угол с прищитковой бороздкой.

67/68/. Черный, усики и ноги заметно светлее. 1й членик усиков бурый. Задние углы переднеспинки слегка угловатые, но без зубчика. Переднеспинка едва шире своей длины, ее боковые края окантованы очень узко, просвечивают рыжим. 7 - 8 мм. - Юго-запад до юга БССР /Вост. Средиземноморье/; Кавказ. *(Longicorne Cha)*

..... 33. *A. (s. str.) boldhausi spf.*

68/67/. Черный, усики и ноги черные; надкрылья обычно со слабым металлическим блеском. Задние углы округлены /см. тезу 77/.

..... /36. *A. (s. str.) viduum Panz* /

69/66/. Основной кант надкрылий самое большое слабо изогнут, образует тупой угол с прищитковой бороздкой.

70/71/. Глаза очень большие, длина висков составляет не больше 1/4 длины глаза. Переднеспинка лишь на 1/4 шире головы. Основные вдавления переднеспинки с углубленной продольной черточкой; ее отогнутый боковой край очень узкий, впереди сходит почти на нет. Верх черный, жирно-блестящий, 1й членик усиков, эпиплевры надкрылий, голени и часто бедра буроватые. 7 - 8 мм. - Юг, Кавказ. Б.ч. у соленых водоемов; не часто. *(dahl. Pseudh)*

..... 34. *A. (s. str.) nigrum Dej*

71/70/. Глаза меньше, менее выпуклые, длина висков составляет не менее 1/3 длины глаза. Переднеспинка по крайней мере на 1/3 шире головы, ее основные вдавления без углубленной продольной черточки.

72/73/. Баковая окантовка переднеспинки до середины узкая, гораздо уже толщины 2 членика усиков, лишь в основной трети расширена. Бороздки надкрылий тонкие, но /кроме основания/ слегка углублены. Надкрылья обычно со слабым бронзовым блеском, их промежутки с тонкой поперечно-ячеистой микроскульптурой; 1й членик усиков, голени и лапки обычно буроватые, реже черные. 7,5 - 8,5 мм. - Крым, Нижнее Поволжье, Кавказ.

..... 35. *A. (s. str.) versutum Gyll.*

73/72/. Боковая окантовка переднеспинки шире, посредине такой же ширины, что и 2й членик усиков. 1й членик усиков обычно не светлее остальных. Надкрылья с изодиаметрической микроскульпт.

74/75/. Надкрылья со слабым, но явственным бронзовым блеском, 2я бороздка надкрылий у вершины слегка изогнута кноружи, 2й промежуток здесь расширен. Переднеспинка с тупоугольными задними углами. Ноги обычно бурые /см. также тезу 51/.

..... /25. *A. (s. str.) dolens C. Sachlb.* -1

75/74/. Надкрылья лишь редко с металлическим блеском, 2я бороздка надкрылий у вершины прямая, т.ч. 3й промежуток не расширен. Усики и ноги обычно черные, редко голени и вершинные членники усиков немного светлее. Задние углы переднесп. округлены.

76/79/. Передний край переднеспинки слабо выемчатый, ее передние углы едва выступающие.

77/78/. Бока переднеспинки сильнее округлены, впереди сильнее дуговидно сужены; ее передний край едва шире головы; окантовка бокового края широкая. Надкрыл. более выпуклые, их основной кант наружи от щитка явственно изогнут, бороздки обычно углублены по всей длине. Средняя пора 3 промежутка обычно приближена ко 2й бороздке, реже находится на его середине. Верх обычно с зеленоватым, бронзовым, редко синим блеском, иногда чисто черный. Микроскульптура диска переднеспинки сглажена. Дорсальный киль задних лапок резкий только на основаниях члеников. - От серера тайги до степей, Кавказ. Берега пресных водоемов с богатой растительностью; часто.

..... 36. *st. (3. st.) viduum Panz.*

78/77/. Бока переднеспинки слабее округлены, слабее сужены впереди. Расстояние между передними углами больше чем ширина головы с глазами; окантовка бокового края переднеспинки узкая. Средняя пора третьего промежутка обычно приближена к 3й бороздке; окантовка основания надкрылий почти прямая. Черный, редко со слабым металлическим блеском. 7 - 8,5 мм. - Вероятно нахождение на юго-западе /СССР, ВНР, Средиземноморье/.  
..... 37. *st. (3. st.) angustatum Dej.*

79/76/. Передний край переднеспинки сильнее выемчатый, ее передние углы слегка угловато выступают вперед.

80/81/. Надкрылья выпуклые, с глубокими, но в основной части не углубленными бороздками; бороздки явственно пунктированы; основной кант надкрылий внутри прямой; средняя пора 3 промежутка обычно приближена к 3й бороздке, реже находится на его середине. Микроскульптура диска переднеспинки явственно сетчатая. Нередко плечи сильно выпуклые, а шов между ними вдавлен /...../. Дорсальный киль на члениках задних лапок длиннее. Черный без металлического блеска, эпиплевры иногда светлее. 8 - 9,5 мм. - От юга тайги до степей; Кавказ. Берега пресных водоемов, на глинистой почве. Часто.

..... 38. *st. (3. st.) moesum Dej.*

81/80/. Надкрылья более плоские, с неглубокими, слегка углубленными к вершине, слабо пунктированными бороздками; средняя пора 3 промежутка расположена на его середине или приближена ко 2й бороздке. Черный, обычно с бронзовым отливом, голени б.ч. красно-бурые. 7,0 - 8,5 мм. - Закарпатье; вероятен в других районах юго-запада /ВНР, Балканский п-ов/. Влажные участки по берегам рек. Нерит на свер.

..... 39. *st. (3. st.) hirsuta Apt.*

82/3/. 3й членик усиков, помимо обычных щетинок на вершине, густо опушен по крайней мере в вершинной трети.

83/84/. 3й членик усиков опушен лишь в вершинной части. Бороздки надкрылий явственно пунктированы. Переднеспинка с пунктировкой в основных ямках. Черный, надкрылья с сильным зеленым или синим блеском; голени бурые. 6,0 - 7,5 мм. - Закарпатье /горы Ср. Европы/.

..... 40. *st. (3. st.) anteciazum Dej.*

84/83/. 3й членик усиков опушен по меньшей мере на половину своей длины. Бороздки надкрылий и основные ямки переднеспинки без явственной пунктировки.

85/86/. Все лапки сверху с тонкой срединной бороздкой. Микроскульптура надкрылий изодиаметрическая. Переднеспинка уже, чем у остальных видов подрода. Верх смоляно-черный или смоляно-бурый, надкрылья от смоляно-бурых до желтых, 1й членик усиков и ноги буро-желтые. 6,0 - 8,5 мм. - Кроме севера; Кавказ /Ср. Азия, на глинистой почве по берегам стоячих и медленно текщих водоемов. Нередко.

..... 41. *st. (3. st.) thorey Dej.*

85/. Лапки без срединной бороздки. Микроскульптура обычно поперечно-сетчатая, если изодиаметрическая, то ячейки образуют поперечные ряды.

87/88/. Прднсп. не шире или едва шире, чем одно надкр. в самом широком месте, ее задняя краевая щетинка заметно удалена от заднего угла. Черный без металлического блеска, надкр. иногда бурые, основание усиков и хотя бы голени рыже-бурые. 5,5-7,8 мм. - Кроме тундры и сухих степей. В затененных влажных местах; Нередко

..... .42. A. (Eucorophylus) fuliginosus Panz

88/87/. Прднсп. шире, чем одно надкр.;, ее задняя краевая пора расположена близ заднего угла.

89/92/. Боковые края прднсп. сильно расширены близ явственно намеченных задних углов. Надкр. широкие, короткие, выпуклые.

90/91/. 1й членик усиков и эпиплевры надкрылий бурые. Наибольшая ширина прднсп. близ середины. Верх черный, обычно с бронзовым блеском; надкр. иногда черно-бурые. 6,2 - 7,4 мм. - Лесная и лесостепная зоны. У воды; нередко.

..... .43. A. (Eucorophylus) micans Nic.

91/90/. Усики смоляно-бурные, их 1й членик едва светлее остальных. Прднсп. сужена кзади, ее наибольшая ширина перед серединой. Черный, верх обычно с зеленым или синим блеском; ноги бурые с более темными бедрами. 5,5 - 7,0 мм. - Калининградская обл.?, Закарпатье?; /Западная Европа/.

..... .44. A. (Eucorophylus) seitzei Dej

92/89/. Боковой край переднеспинки едва расширен близ задних углов. Надкрылья более узкие, в средней части параллельные.

93/94/. Надкр. желтые или бурые, голова и прднсп, черные или темно-бурные, верх с бронзовым блеском; 1й членик усиков и ноги буро-желтые. 5,5-7,3 мм. - Лесная и лесостепная зоны. Илпстые берега рек и стоячих водоемов. В лесной зоне часто, в лесостепи более редок.

..... .45. A. (Eucorophylus) picum L.

94/93/. Верх и эпиплевры надкр. черные, часто с металлич. блеск.

95/96/. Микроскульптура надкр. состоит из слабо поперечных ячеек, Черный без металлического блеска; 1й членик усиков и голени иногда буроватые, а остальные части усиков и ног черные. 6-7,3 мм. - Север, ср.полова; Предкавказье. По берегам и на болотах. Часто.

..... .46. A. (Eucorophylus) gracile Gyll.

96/95/. Микроскульптура надкрылий состоит из сильно поперечных ячеек, ячейки узкие. Верх с металлическим блеском.

97/98/. Верх с очень слабым бронзовым блеском. Задние углы прднс вполне округлены. Надкрылья заметно выпуклые. 5,5 - 7,0 мм. - Запад лесной зоны; б.ч. на торфяниках; редко.

..... .47. A. (Eucorophylus) munsteri Hellen

98/97/. Верх обычно с сильным металлическим блеском, Задние углы переднеспинки хотя бы намечены, надкрылья уплощены.

99/100/. Задние углы прднсп. намечены, боковые края перед ними округлены. Усики тоньше, их 9й и 10й членики почти втрое длиннее своей ширины. Промежутки надкрылий почти плоские. 5,3 - 7,0 мм. - Северная тайга, лесотундра. По берегам.

..... .48. A. (Eucorophylus) conzime Gyll.

100/99/. Задние углы переднеспинки явственно, боковые края перед ними прямые или слегка выемчатые. Усики толще, 9-10 членики примерно вдвое длиннее своей ширины. Промежутки надкрылий слабо-выпуклые. 5,2 - 6,5 мм. - Лесотундра, тундра. Заболоченные берега водоемов.

..... .49. A. (Eucorophylus) exaratum Kiz. by (coll. in Kiz. by)