

**Распространение *Calathus cinctus* Motschulsky, 1850
(Coleoptera, Carabidae) в Восточной Европе**
О.Р. Александрович

[Aleksandrowicz O.R. Distribution of *Calathus cinctus* Motschulsky, 1850
(Coleoptera, Carabidae) in East Europe]

*Институт биологии и охраны окружающей среды, Слупск, Польша.
E-mail: oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl*

Окема (Aukema, 1990) на основании ревизии видов группы *Calathus melanocephalus* Linnaeus, 1758 установил самостоятельность *C. cinctus* Motschulsky, 1850. Долгое время этот вид смешивался с *C. mollis mollis* Marsham, 1802 или приводился под названием *C. erythroderus* Gemminger et Harold, 1868. В палеарктическом каталоге (Löbl, Smetana, 2003) *C. cinctus* указан для стран Западной и Центральной Европы, Закавказья и Турции, а из восточноевропейских стран – только для Латвии. В каталоге жужелиц бывшего СССР (Kryzhanovskij et al., 1995) *C. cinctus* приведен из Украинских Карпат и Закарпатья, с севера и юга Русской равнины, из горного Крыма, Предкавказья, с Большого Кавказа и Армянского нагорья. Ранее вид был на Кавказе известен для Предкавказья (Сигида, 1993). В детальном каталоге жуков Восточной Пруссии (Bercio, Folwaczny, 1979), охватывавшим период с конца XIX в. до 1944 г., *C. cinctus* не был указан. Не был он обнаружен в этом регионе и до настоящего времени (Алексеев, 2008). Вид отсутствует в моих и других доступных мне материалах 1974–2005 гг. из Белоруссии и северной Польши.

Впервые для северо-западной Польши *C. cinctus* был достоверно указан в 2001 г. (Stachowiak, Wilcz, 2001). В наших сборах 2006–2011 гг. на севере Польши от Щецина до Гданьска этот вид местами обычен, не так давно он был указан для Мазурского Поозерья (Kosewska et al., 2007) и западной Белоруссии (Соловьевников, 2008). Вероятно, в последнее время вид быстро расселился по северу Польши на восток.

Таким образом, распространение *C. cinctus* в Восточной Европе изучено недостаточно. Старые указания должны быть проверены и дополнены новыми. Вероятно тогда можно будет установить, расселяется ли действительно *C. cinctus* с запада в Восточной Европе или же он просто ранее не был правильно диагностирован.