

Систематический список жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Удмуртии

Checklist of beetles (Insecta, Coleoptera) of Udmurtia

С.В. Дедюхин*, Н.Б. Никитский**, В.Б. Семёнов***
S.V. Dedyukhin*, N.B. Nikitsky**, V.B. Semenov***

* Кафедра экологии животных, Удмуртский государственный университет, ул. Университетская 1, Ижевск 426034 Россия. E-mail: ded@uni.udm.ru.

* Department of animal ecology, Udmurt State University, Universitetskaya str. 1, Izhevsk 426034 Russia.

** Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова, ул. Большая Никитская 6, Москва 125009 Россия. E-mail: Nikitsky_NB@mtu-net.ru.

** Zoological Museum of Moscow Lomonosov State University, Bolshaya Nikitskaya 6, Moscow 125009 Russia.

*** Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, ул. Малая Пироговская 20, Москва 119435 Россия.

*** Martsinovskiy Institute of Medical Parasitology and Tropical Medicine, Malaya Pirogovskaya 20, Moscow 119435 Russia.

Ключевые слова: Coleoptera, фауна, Удмуртия.

Key words: Coleoptera, fauna, Udmurtia.

Резюме. Приводится полный список жесткокрылых насекомых (Coleoptera) Удмуртии, где отмечено немногим более 2400 видов жуков из 91 семейства. Впервые для региона приведено 1482 вида (помечены в списке звездочкой — *, с правой стороны от названия вида).

Abstract. A complete checklist (2400 species in 91 families) of the beetles (Coleoptera) of Udmurtia is provided. 1482 species are reported from Udmurtia for the first time, as indicated by an asterisk (*) in the list.

Расположение Удмуртии в пределах Вятско-Камского междуречья на границе Русской Равнины и Среднего Предуралья (55° 12' – 58° 10' с.ш., 51° 10' – 54° 26' в.д.), вблизи ряда меридиональных и на стыке нескольких широтных рубежей (от южной тайги до северной границы лесостепи) определяет своеобразие данного региона в колеоптерологическом отношении. Хотя исследования жесткокрылых в Удмуртии имеют достаточно долгую историю, крупные монографические сводки, посвящённые данной группе насекомых, единичны и очень неполны. Первые сведения о находках жуков на территории республики приводятся в работах А. Лебедева [1906, 1913], А.И. Шернина [1927], Л.К. Эстенберга [1935], проводивших исследования, в основном, в соседних регионах [Рощиненко, Козлова, 1970]. В период с конца 1950-х по 1980-е годы прошлого столетия осуществлялось многолетнее систематическое изучение местной колеоптерофауны под руководством В.И. Рощиненко [Рощиненко, 1965, 1969, 1970, 1971, 1973, 1977, 1978, 1979, 1981, 1988; Рощиненко, Козлова, 1963, 1970; Козлова, 1965]. В 1972 году был опубликован список беспозвоночных, включающий 522 вида жесткокрылых из 15 семейств [Рощиненко, 1972]. Более полный список жуков Удмуртии, состоящий из 675 видов, относящихся к 35 семействам, приводится в приложении к кандидатской диссертации В.И. Рощиненко [1975]. Причём некоторые виды,

указанные в первом списке, здесь отсутствуют, что, по-видимому, говорит об их ошибочном определении. С наибольшей (пропорционально общему потенциальному числу видов) полнотой были изучены семейства: Carabidae (139 видов), Cerambycidae (58), Scarabaeidae (s. l.) (57 видов), Elateridae (50 видов), а также Curculionidae (s. l.) (76), Vuprestidae (20), Coccinellidae (17), для остальных приведены лишь отдельные представители.

В целом трудно переоценить значение для познания региональной колеоптерофауны 25-летних исследований В.И. Рощиненко, выведших изученность данной группы насекомых в республике на качественно новый уровень. Однако, к сожалению, большинство её коллекционных материалов к настоящему времени утеряно. Сохранились лишь справочные коллекции по некоторым семействам, экземпляры в которых большей частью без этикеток, а определение их не всегда верно. Поэтому обитание в республике ряда видов жуков, указываемых в её работах, но не отмеченных нами, требует подтверждения. Исключение составляют виды, правильность определения которых достоверно подтверждена специалистами (например, факт обнаружения *Crepidophorus rufiventris* подтверждён В.Г. Долиным) или которые сохранились в коллекциях (*Miltotrogus aequinoctialis*, *Onthophagus vacca*, *Coccinella trifasciata* и некоторые др.).

Новый подъём колеоптерологических исследований в Удмуртии начался с 90-х годов прошлого века и связан, в частности, с активизацией природоохранной деятельности [Борисовский, Адаховский, 1998, 1999; Дедюхин, 2001; Дедюхин, Борисовский, 2001]. Конечным результатом данных исследований стал выход Красной Книги УР, в которую включены 14 видов жесткокрылых [Адаховский и др., 2001]. В приложении [Тревожный список], указываются ещё 18 видов жуков. Несколько видов приводятся в работах, посвящённых

изучению экологии насекомых-фитофагов [Ермолаев, 2002; Ермолаев, Сидорова, 2002], в том числе *Acanthocinus carinulatus* (Cerambycidae) и *Polydrusus inustus* (Curculionidae), нами не зарегистрированные.

Среди колеоптерологических работ, основанных на наших данных, имеются публикации, посвящённые отдельным группам жесткокрылых Удмуртии — мертвоедам (Silphidae) [Ермолаев, Дедюхин, 2000; Дедюхин, Ермолаев, 2001], рогачам (Lucanidae) и троксам (Trogidae) [Дедюхин, Борисовский, 2001], в целом надсемейству Scarabaeoidea [Дедюхин, 2003а], а также жесткокрылым, обитающим в норах сурков [Дедюхин, Капитонов, 2004]. Вышла обобщающая статья, посвящённая особенностям региональной колеоптерофауны (с рассмотрением вероятных путей её формирования) и закономерностям пространственного распределения жесткокрылых в республике [Дедюхин, 2003б], в которой указаны около 160 видов жуков (свыше 90 видов впервые для республики). На основе данной статьи с некоторыми дополнениями в интернет-варианте опубликованы тезисы к телеконференции «Современная биогеография» [Дедюхин, 2003в]. Отдельные виды листоедов приводятся для Удмуртии также в определителе А.О. Беньковского [Bieńkowski, 2004] на основании наших материалов и работы В.И. Рощиненко [1973].

В основу данного списка (который в перспективе проводимых работ, конечно же, будет изрядно дополнен) положены материалы, полученные в результате многолетних исследований жесткокрылых Удмуртии (1989-2004) С.В. Дедюхина. Кроме того, в работе использованы сборы жуков, предоставленные В.И. Рощиненко, А.Г. Борисовским, Д.А. Адаховским, К.А. Капитоновым (УдГУ), Н.Ю. Поповой (Удмуртский национальный краеведческий музей).

Исследованиями удалось охватить весь спектр зонально-ландшафтных условий республики: подзону южной тайги (север Удмуртии); полосу подтаёжных хвойно-широколиственных лесов с массивами сосновых боров на надпойменных террасах рек и материковых песчаных дюнах (в центральной части); полосу широколиственно-хвойных лесов с присутствием дуба и наличием участков остепнённых лугов на склонах и в долинах крупных рек (Кама и Вятка) (в южной трети Удмуртии).

Предварительное определение жесткокрылых проведено С.В. Дедюхиным. Проверка определения жуков по большинству семейств и идентификация ряда особо сложных для диагностирования таксонов (Leiodidae, Scirtidae, Scaphidiinae, большинство Hydrophilidae и Nitidulidae, Monotomidae, Latridiidae, Cerylonidae, Ciidae, Anthicidae, Mordellidae (отчасти), Melandryidae и некоторых др.) осуществлена Н.Б. Никитским. В.Б. Семёновым определены Staphylinidae, а также Clambidae.

Номенклатура и таксономия в работе даётся в основном по Н. Silfverberg [1992, 2004] и С.А. Александровичу и др. [1996], О.Л. Kryzhanovskij et al. [1995], Catalogue of Palaearctic Coleoptera [2003, 2004], частично по J. Lawrence, A. Newton [1995], Н.Б. Никитскому и др. [1996], а также с учётом советов ряда отечественных

специалистов-колеоптерологов (А.О. Беньковского, А.А. Гусакова, А.А. Легалова и некоторых др.). В списке приводятся названия подотрядов, надсемейств, семейств, подсемейств, родов, видов (иногда и подвигов) жесткокрылых. Для каждого таксона приведены современные названия, для части — также синонимы. В представленных ниже списках надвидовые таксоны даны более или менее в систематическом порядке, виды — в алфавитном.

Всего на территории Удмуртии, на сегодняшний день, отмечено немногим более 2400 видов жуков из 91 семейства. Все они приведены в данной работе. 16 видов, в точном определении которых по тем или иным причинам нет уверенности, отмечены знаком ?. Впервые для региона приведено 1482 вида (помечены в списке звездочкой (*), с правой стороны от названия вида). Двумя звездочками (**), обозначены виды (всего 63), приводимые в официально опубликованных литературных источниках и в рукописи диссертации В.И. Рощиненко [1975] (в данной работе указаны с её личного согласия), однако не найденные авторами и не сохранившиеся в коллекциях, поэтому обитание их в республике требует подтверждения.

Следующие 19 видов указаны в литературе для Удмуртии на основании ошибочных определений, что подтверждается наличием экземпляров с определительными этикетками (хотя это не исключает возможность нахождения по крайней мере некоторых из них на анализируемой территории): *Pterostichus magus* Mannerheim, 1825, *P. ovoideus* Sturm, 1824, *Harpalus solitarius* Dejean, 1829 (*fuliginosus* (Duftschmid, 1812), nec (Panzer, 1809)), *Stenolophus proximus* Dejean, 1829 (Carabidae), *Saprinus cribellatus* Marseul, 1862, *S. immundus* (Gyllenhal, 1827), *Hypocaccus metallicus* (Herbst, 1792) (Histeridae), *Aphodius merdarius* (Fabricius, 1775), *A. paykulli* Bedel, 1908 (*tessulatus* (Paykull, 1798), nec (Moll, 1782)), *Omaloplia nigromarginata* (Herbst, 1785) (*ruricola* auct. nec (Fabricius, 1775)), *Amphimallon assimile* (Herbst, 1790), *Anisoplia agricola* (Poda, 1761), *A. segetum* (Herbst, 1783) (Scarabaeidae), *Melanotus villosus* (Geoffroy, 1785) (*rufipes* (Herbst, 1784), nec (Goeze, 1777)) (Elateridae), *Cryptocephalus quatuordecimmaculatus* Schneider, 1792, *Chrysolina hyperici* (Forster, 1771) (Chrysomelidae), *Anastrangalia dubia* (Scopoli, 1763) (Cerambycidae), *Dorytomus dejeani* Faust, 1882, *Phyllobius jacobsoni* Smirnov, 1913, *Acalles lemur* (Germar, 1824) (Curculionidae).

В работе не приводятся данных о распространении жесткокрылых в республике¹. Однако, следует отметить, что многие виды жуков распространены в Удмуртии неравномерно, а у нескольких сотен видов здесь проходят границы ареалов. Так, большинство лесостепных и неморальных видов жесткокрылых встречаются лишь на юге Удмуртии, напротив, некоторые таёжные представители ограничены в распространении северными, либо центральными районами республики.

Почти весь коллекционный материал, положенный в основу данной публикации, хранится в коллекциях кафедры экологии Удмуртского гос. университета (Ижевск) и только отдельные виды — в Зоологическом музее МГУ (Москва).

¹ Закономерности распространения многих жесткокрылых в Удмуртии рассмотрены в работах С.В. Дедюхина [2003а, б, в].

MYXOPHAGA

- Sphaeriidae** Erichson, 1845
(**Microsporidae** Crotch, 1873)
Sphaerius Waltl, 1838
Microsporus Kolenati, 1846
acaroides Waltl, 1838
obsidianus (Kolenati, 1846)

ADEPHAGA

- Carabidae** Latreille, 1802
Cicindelinae Latreille, 1802
Cicindela Linnaeus, 1758
campestris Linnaeus, 1758
hybrida Linnaeus, 1758
maritima Dejean, 1822
sylvatica Linnaeus, 1758
Cylindera Westwood, 1831
germanica (Linnaeus, 1758)

Omophroninae Bonelli, 1810

- Omophron** Latreille, 1802
limbatum (Fabricius, 1777)*

- Nebriinae** Laporte de Castelnau, 1834
Leistus Frölich, 1799
ferrugineus (Linnaeus, 1758)
terminatus (Panzer, 1793)
rufescens (Fabricius, 1775) nec (Ström, 1768)

- Nebria** Latreille, 1802
livida (Linnaeus, 1758)*
rufescens (Ström, 1768)
gyllenhalii (Schönherr, 1806)

- Notiophilus** Duméril, 1806
aquaticus (Linnaeus, 1758)
biguttatus (Fabricius, 1779)
germyi Fauvel, 1863*
hypocrita Putzeys, 1866
palustris (Duftschmid, 1812)

Loricarinae Bonelli, 1810

- Loricera** Latreille, 1802
pilicornis (Fabricius, 1775)

Carabinae Latreille, 1802

- Calosoma** Weber, 1801
auropunctatum (Herbst, 1784)
denticolle Gebler, 1833
inquisitor (Linnaeus, 1758)
investigator (Illiger, 1798)
sycophanta (Linnaeus, 1758)
Carabus Linnaeus, 1758
aeruginosus ssp. *herrmanni* Mannerheim, 1827
arcensis ssp. *baschkiricus* Breuning, 1932
cancellatus Illiger, 1798
clathratus Linnaeus, 1761
convexus Fabricius, 1775
estreicheri Fischer von Waldheim, 1820
glabratus Paykull, 1790
granulatus Linnaeus, 1758
henningi Fischer von Waldheim, 1817
hortensis Linnaeus, 1758
menetriesi Hummel, 1827
nemoralis Müller, 1764
nitens Linnaeus, 1758
regalis Fischer von Waldheim, 1820
schoenherrii Fischer von Waldheim, 1820
stscheglowi Mannerheim, 1827

- Cychrus** Fabricius, 1794
caraboides (Linnaeus, 1758)

Elaphrinae Erichson, 1837

- Blethisa** Bonelli, 1810
multipunctata (Linnaeus, 1758)

- Elaphrus** Fabricius, 1775
cupreus Duftschmid, 1812
riparius (Linnaeus, 1758)
uliginosus Fabricius, 1792

Scaritinae Bonelli, 1810

- Clivina** Latreille, 1802
fossor (Linnaeus, 1758)
Dyschirius Bonelli, 1810
aeneus (Dejean, 1825)*
arenosus Stephens, 1827*
thoracicus (Rossi, 1790)
globosus (Herbst, 1784)*
gracilis (Heer, 1837)*
lafertei Putzeys, 1846
nitidus (Dejean, 1825)*
obscurus (Gyllenhal, 1827)*
substriatus ssp. *priscus* Müller, 1922*

Broscinae Hope, 1838

- Broscus** Panzer, 1813
cephalotes (Linnaeus, 1758)
Miscodera Eschscholtz, 1830
arctica (Paykull, 1798)

Trechinae Bonelli, 1810

- Perileptus** Schauf, 1860
areolatus (Creutzer, 1799)*
Trechoblemus Ganglbauer, 1891
micros (Herbst, 1784)*

- Blemus** Dejean, 1821
Lasiotrechus Ganglbauer, 1891
discus (Fabricius, 1792)*

- Trechus** Clairville, 1806
quadristriatus (Schrank, 1781)
rivularis (Gyllenhal, 1810)
rubens (Fabricius, 1792)
secalis (Paykull, 1790)

- Tachys** Dejean, 1821
micros (Fischer von Waldheim, 1828)*

- Tachyta** Kirby, 1837
nana (Gyllenhal, 1810)*

- Asaphidion** Des Gozis, 1886
flavipes (Linnaeus, 1761)*
pallipes (Duftschmid, 1812)*

- Bembidion** Latreille, 1802
***andreae* ssp. *polonicum* J.Müller, 1830
argenteolum Ahrens, 1812
assimile Gyllenhal, 1810*
articulatum (Panzer, 1796)*
?azurescens (Dalla Torre, 1877)*
biguttatum (Fabricius, 1779)*
***bipunctatum* (Linnaeus, 1761)
dentellum (Thunberg, 1787)
doris (Panzer, 1796)*
femoratum Sturm, 1825
gilvipes Sturm, 1825*
grapii Gyllenhal, 1827*
guttula (Fabricius, 1792)
hirmocaelum Chaudoir, 1850
lampros (Herbst, 1784)
laticolle (Duftschmid, 1812)
litorale (Olivier, 1790)
lunatum (Duftschmid, 1812)*
mannerheimii Sahlberg, 1827*
unicolor Chaudoir, 1850
?minimum (Fabricius, 1792)*
obliquum Sturm, 1825
octomaculatum (Goeze, 1777)*
properans (Stephens, 1828)
punctulatum Drapiez, 1820*
quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)
ruficolle (Panzer, 1796)*
schuëppelii Dejean, 1831*

- semipunctatum* (Donovan, 1806)*
striatum (Fabricius, 1792)*
tetracolum Say, 1823
ustulatum auct. (nec. Linnaeus, 1767)
varium (Olivier, 1795)*
velox (Linnaeus, 1761)*

- Patrobus** Dejean, 1821
assimilis Chaudoir, 1844
atrorufus (Ström, 1768)*
excavatus (Paykull, 1790)
septentrionis Dejean, 1828*
australis J. Sahlberg, 1875

Harpalinae Bonelli, 1810

- Stomis** Clairville, 1806
pumicatus (Panzer, 1796)*

- Poecilus** Bonelli, 1810
crenuliger Chaudoir, 1876
cupreus (Linnaeus, 1758)
lepidus (Leske, 1785)
punctulatus (Schaller, 1783)
subcoeruleus (Queensel, 1806)
versicolor (Sturm, 1824)

- Pterostichus** Bonelli, 1810
aethiops (Panzer, 1796)
anthracinus (Illiger, 1798)
aterrimus (Herbst, 1784)
diligens (Sturm, 1824)
gracilis (Dejean, 1828)
macer (Marsham, 1802)
mannerheimi (Dejean, 1831)
melanarius (Illiger, 1798)
minor (Gyllenhal, 1827)
niger (Schaller, 1783)
nigrita (Paykull, 1790)
oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
rhaeticus Heer, 1837*
strenuus (Panzer, 1796)
uralensis ssp. *krasnobaevi* O.Berlov et Tilly, 1998
urengaicus Jureček, 1924*
vernalis (Panzer, 1796)

- Calathus** Bonelli, 1810
ambiguus (Paykull, 1790)
erratus (C. Sahlberg, 1827)
melanocephalus (Linnaeus, 1758)
micropterus (Duftschmid, 1812)

- Dolichus** Bonelli, 1810
halensis (Schaller, 1783)

- Laemostenus** Bonelli, 1810
terricola (Herbst, 1784)

- Sericoda** Kirby, 1837
quadripunctata (DeGeer, 1774)*

- Agonum** Bonelli, 1810
duftschmidi Schmidt, 1994
moestum (Duftschmid, 1812) nec (Gmelin, 1790)
ericeti (Panzer, 1809)
fuliginosum (Panzer, 1809)
gracile Sturm, 1824*
gracilipes (Duftschmid, 1812)
impressum (Panzer, 1796)
lugens (Duftschmid, 1812)
marginatum (Linnaeus, 1758)*
micans Nicolai, 1822
muelleri (Herbst, 1784)
piceum (Linnaeus, 1758)
sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
thoreyi Dejean, 1828*
***versutum* Sturm, 1824
viduum (Panzer, 1796)
Platynus Bonelli, 1810
assimilis (Paykull, 1790)
krynckii (Sperk, 1835)

- livens* (Gyllenhal, 1810)
longiventris Mannerheim, 1825*
mannerheimii (Dejean, 1828)*
- Oxypselaphus** Chaudoir, 1843
obscurus (Herbst, 1784)*
- Anchomenus** Bonelli, 1810
dorsalis (Pontoppidan, 1763)
- Synuchus** Gyllenhal, 1810
vivalis (Illiger, 1798)
nivalis (Panzer, 1796) nec (Paykull, 1790)
- Amara** Bonelli, 1810
aenea (DeGeer, 1774)
apricaria (Paykull, 1790)
bifrons (Gyllenhal, 1810)
brunnea (Gyllenhal, 1810)
chaudoiri Schaum, 1858
communis (Panzer, 1797)
consularis (Duftschmid, 1812)
curta Dejean, 1828*
equestris (Duftschmid, 1812)*
eurynota (Panzer, 1796)
famelica Zimmermann, 1832
familiaris (Duftschmid, 1812)
fulva (Müller, 1776)
ingenua (Duftschmid, 1812)
***lunicollis* Schiödte, 1837
majuscula Chaudoir, 1850
montivaga Sturm, 1825*
municipalis (Duftschmid, 1812)
nitida Sturm, 1825
ovata (Fabricius, 1792)
plebeja (Gyllenhal, 1810)
praetermissa (C.Sahlberg, 1827)*
pulpani Kult, 1949*
pseudocommunis Burakowski, 1957
sabulosa Audinet - Serville, 1821*
similata (Gyllenhal, 1810)
***spreta* Dejean, 1831
tibialis (Paykull, 1798)*
***tricuspidata* Dejean, 1831
- Curtonotus** Stephens, 1828
aulicus (Panzer, 1796)
convexusculus (Marsham, 1802)
gebleri (Dejean, 1831)*
helleri (Gredler, 1868)
- Bradycellus** Erichson, 1837
caucasicus (Chaudoir, 1846)*
- Dicheirotichus** Jacquelin du Val, 1857
rufithorax (C. Sahlberg, 1827)*
- Stenolophus** Dejean, 1821
discophorus (Fischer von Waldheim, 1823)
mixtus (Herbst, 1784)
- Acupalpus** Latreille, 1829
exiguus Dejean, 1829*
flavicollis (Sturm, 1825)*
maculatus Schaum, 1860*
meridianus (Linnaeus, 1761)*
parvulus (Sturm, 1825)*
- Anthracus** Motschulsky, 1850
consputus (Duftschmid, 1812)*
- Anisodactylus** Dejean, 1829
binotatus (Fabricius, 1787)
signatus (Panzer, 1796)
- Harpalus** Latreille, 1802
affinis (Schrank, 1781)
***amplicolis* Ménétrés, 1848
anxious (Duftschmid, 1812)
autumnalis (Duftschmid, 1812)
calceatus (Duftschmid, 1812)
distinguendus (Duftschmid, 1812)
flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783)
froelichii Sturm, 1818*
- **griseus* (Panzer, 1796)
laevipes Zetterstedt, 1828
quadripunctatus Dejean, 1829
latus (Linnaeus, 1758)
***luteicornis* (Duftschmid, 1812)
picipennis (Duftschmid, 1812)*
progrediens Schauburger, 1922*
pumilus Sturm, 1818*
rubripes (Duftschmid, 1812)
rufipes (DeGeer, 1774)
***serripes* (Quensel, 1806)
servus (Duftschmid, 1812)
signaticornis (Duftschmid, 1812)*
smaragdinus (Duftschmid, 1812)
subcylindricus Dejean, 1829*
tardus (Panzer, 1796)
xanthopus ssp. *winkleri* Schauburger, 1923
zabroides Dejean, 1829
- Ophonus** Dejean, 1821
azureus (Fabricius, 1775)*
laticollis Mannerheim, 1825
nitidulus Stephens, 1828
punctatulus (Duftschmid, 1812) nec (Fabricius, 1792)
puncticollis (Paykull, 1798)
stictus Stephens, 1828
obscurus (Fabricius, 1792) nec (Herbst, 1784)
- Panagaeus** Latreille, 1802
cruxmajor (Linnaeus, 1758)
- Perigona** Laporte de Castelnau, 1835
nigriceps (Dejean, 1831)*
- Callistus** Bonelli, 1810
lunatus (Fabricius, 1775)*
- Chlaenius** Bonelli, 1810
nigricornis (Fabricius, 1787)
nitidulus (Schrank, 1781)
tibialis Dejean, 1826*
tristis (Schaller, 1783)
vestitus (Paykull, 1790)*
- Oodes** Bonelli, 1810
helopioides (Fabricius, 1792)
- Licinus** Latreille, 1802
depressus (Paykull, 1790)
- Badister** Clairville, 1806
bullatus (Schrank, 1798)
bipustulatus (Fabricius, 1792) nec (Fabricius, 1775)
dilatatus Chaudoir, 1837*
lacertosus Sturm, 1815*
peltatus (Panzer, 1796)*
sodalis (Duftschmid, 1812)*
unipustulatus Bonelli, 1813
- Masoreus** Dejean, 1821
wetterhallii (Gyllenhal, 1813)
- Odacantha** Paykull, 1798
melanura (Linnaeus, 1767)*
- Lebia** Latreille, 1802
chlorocephala (Hoffmann, 1803)
cruxminor (Linnaeus, 1758)
cyancephala (Linnaeus, 1758)
- Demetrias** Bonelli, 1810
monostigma Samouelle, 1819*
- Paradromius** Fowler, 1887
linearis (Olivier, 1795)*
- Dromius** Bonelli, 1810
agilis (Fabricius, 1787)
angusticollis J.Sahlberg, 1880
fenestratus (Fabricius, 1794)*
quadraticollis Morawitz, 1862*
schneideri Crotch, 1871*
marginellus (Fabricius, 1794) nec (Herbst, 1784)
- Philorhizus** Hope, 1838
notatus (Stephens, 1827)*
nigriventris (Thomson, 1857)
sigma (Rossi, 1790)*
- Microlestes** Schmidt-Goebel, 1846
minutulus (Goeze, 1777)
- Syntomus** Hope, 1838
truncatellus (Linnaeus, 1761)
- Cymindis** Latreille, 1806
angularis Gyllenhal, 1810*
vaporariorum (Linnaeus, 1758)*
- Brachininae** Bonelli, 1810
- Brachinus** Weber, 1801
crepitans (Linnaeus, 1758)
- Halipilidae** Kirby, 1837
- Haliplus** Latreille, 1802
apicalis Thomson, 1868*
fulvicollis Erichson, 1837*
furcatus Seidlitz, 1887*
lineolatus Mannerheim, 1844*
ruficollis (DeGeer, 1774)*
sibiricus Motschulsky, 1860*
wehneckei Gerhardt, 1877
- Noteridae** Thomson, 1860
- Noterus** Clairville, 1806
crassicornis (Müller, 1776)*
- Dytiscidae** Leach, 1815
- Hydroporinae** Aubé, 1836
- Hydroglyphus** Motschulsky, 1853
Guignotus Houlbert, 1934
geminus (Fabricius, 1792)*
pusillus (Fabricius, 1781) nec (Müller, 1776)
- Hyphydrus** Illiger, 1802
ovatus (Linnaeus, 1761)*
- Hygrotus** Stephens, 1828
(Coelambus Thomson, 1860 рассматривается в качестве подрода)
decoratus (Gyllenhal, 1810)*
impresopunctatus (Schaller, 1783)*
inaequalis (Fabricius, 1777)*
marklini (Gyllenhal, 1813)*
- Hydroporus** Clairville, 1806
erythrocephalus (Linnaeus, 1758)
fuscipennis Schaum, 1868*
incognitus Sharp, 1869*
melanarius Sturm, 1835*
obscurus Sturm, 1835*
palustris (Linnaeus, 1761)*
planus (Fabricius, 1782)*
striola (Gyllenhal, 1826)*
tristis (Paykull, 1798)*
umbrosus (Gyllenhal, 1808)*
- Porhydrus** Guignot, 1945
lineatus (Fabricius, 1775)*
- Graptodytes** Seidlitz, 1887
bilineatus (Sturm, 1835)*
granularis (Linnaeus, 1767)*
- Suphrodytes** Des Gozis, 1914
dorsalis (Fabricius, 1787)*
- Scarodytes** Des Gozis, 1914
halensis (Fabricius, 1787)*
- Copelatinae** Branden, 1885
- Copelatus** Erichson, 1832
haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)*
- Agabinae** Thomson, 1867
- Platambus** Thomson, 1859
maculatus (Linnaeus, 1758)

Agabus Leach, 1817
affinis (Paykull, 1798)*
biguttatus (Olivier, 1795)*
biguttulus (Thomson, 1867)*
bipustulatus (Linnaeus, 1767)
congener (Thunberg, 1794)*
fuscipennis (Paykull, 1798)*
guttatus (Paykull, 1798)*
melanarius Aubé, 1837*
paludosus (Fabricius, 1801)*
pseudoclypealis Scholtz, 1933*
haraldi Håkan Lindberg, 1933
sturmii (Gyllenhal in Schönherr, 1808)
***uliginosus* (Linnaeus, 1761)

Ilybius Erichson, 1832
aenescens Thomson, 1870*
ater (DeGeer, 1774)
crassus Thomson, 1856*
***guttiger* (Gyllenhal, 1808)
erichsoni (Gemminger et Harold, 1868)*
fenestratus (Fabricius, 1781)*
fuliginosus (Fabricius, 1792)
neglectus (Erichson, 1837)*
subtilis (Erichson, 1837)*

Colymbetinae Erichson, 1837

Rhantus Dejean, 1833
consputus (Sturm, 1834)*
exsoletus (Forster, 1771)
frontalis (Marsham, 1802)
notatus (Fabricius, 1781) nec (Bergsträsser, 1778)
notaticollis (Aubé, 1837)*
***suturalis* (MacLeay, 1825)
suturellus (Harris, 1828)

Colymbetes Clairville, 1806
paykulli Erichson, 1837*
striatus (Linnaeus, 1758)

Laccophilinae Gistel, 1856

Laccophilus Leach, 1815
hyalinus (DeGeer, 1774)*
minutus (Linnaeus, 1758)*
poecilus Klug, 1834*
ponticus Sharp, 1882
variegatus (Germar et Kaulfuss, 1816) nec (Geoffroy, 1785)

Dytiscinae Leach, 1815

Hydaticus Leach, 1817
?continentalis Balfour-Browne, 1944*
stagnalis (Fabricius, 1787) nec (Geoffroy, 1785)
seminiger (DeGeer, 1774)*
transversalis (Pontoppidan, 1763)

Graphoderus Dejean, 1833
bilineatus (DeGeer, 1774)*
cinereus (Linnaeus, 1758)
zonatus (Hoppe, 1795)*

Acilius Leach, 1817
canaliculatus (Nicolai, 1822)
sulcatus (Linnaeus, 1758)

Dytiscus Linnaeus, 1758
circumcinctus Ahrens, 1811*
?circumflexus Fabricius, 1801*
lapponicus Gyllenhal, 1808
latissimus Linnaeus, 1758
marginalis Linnaeus, 1758

Gyrinidae Latreille, 1810

Gyrininae Latreille, 1810

Gyrinus Müller, 1764
marinus Gyllenhal, 1808*
minutus Fabricius, 1798*
natator (Linnaeus, 1758)*
substriatus Stephens, 1828*

POLYPHAGA

HYDROPHILOIDEA

Hydrophilidae Latreille, 1802

Helophorinae Leach, 1815

Helophorus Fabricius, 1775
aquaticus (Linnaeus, 1758)*
brevipalpis Bedel, 1881*
?croaticus Kuwert, 1886*
granularis (Linnaeus, 1761)*
griseus Herbst, 1793*
lapponicus Thomson, 1853*
nanus Sturm, 1836*
nubilus Fabricius, 1777*
paraminutus Angus, 1986*
strigifrons Thomson, 1868*

Georissinae Laporte de Castelnau, 1840

Georissus Latreille, 1809
crenulatus (Rossi, 1794)*

Hydrochinae Thomson, 1859

Hydrochus Leach, 1817
brevis (Herbst, 1793)*
elongatus (Schaller, 1783)*

Spercheinae Erichson, 1837

Spercheus Kugelann, 1798
emarginatus (Schaller, 1783)*

Hydrophilinae Latreille, 1802

Berosus Leach, 1817
luridus (Linnaeus, 1761)*
signaticollis (Charpentier, 1825)*

Chaetarthria Stephens, 1835
seminulum (Herbst, 1797)

Anacaena Thomson, 1859
lutescens (Stephens, 1829)*

Laccobius Erichson, 1837
colon (Stephens, 1829)*
biguttatus Gerhardt, 1877
minutus (Linnaeus, 1758)*
sinuatus Motschulsky, 1849*
striatulus (Fabricius, 1801)*

Helochares Mulsant, 1844
obscurus (Müller, 1776)*
griseus auct. nec (Fabricius, 1787)

Enochrus Thomson, 1859
affinis (Thunberg, 1794)*
bicolor (Fabricius, 1792)*
fuscipennis (Thomson, 1884)*
melanocephalus (Olivier, 1792)*
quadripunctatus (Herbst, 1797)*

Cymbiodyta Bedel, 1881
marginella (Fabricius, 1792)*

Hydrobius Leach, 1815
fuscipes (Linnaeus, 1758)*

Hydrochara Berthold, 1827
caraboides (Linnaeus, 1758)

Hydrophilus Geoffroy, 1762
aterrimus Eschscholtz, 1822

Sphaeridiinae Latreille, 1802

Coelostoma Brullé, 1835
orbiculare (Fabricius, 1775)*

Cercyon Leach, 1817
analis (Paykull, 1798)*
bifenestratus Küster, 1851*
convexusculus Stephens, 1829*
haemorrhoidalis (Fabricius, 1775)
impressus (Sturm, 1807)*
laminatus Sharp, 1873*
lateralis (Marsham, 1802)*
melanocephalus (Linnaeus, 1758)*

nigriceps (Marsham, 1802)*
atricapillus (Marsham, 1802)
pygmaeus (Illiger, 1801)*
quisquilius (Linnaeus, 1761)
terminatus (Marsham, 1802)*
tristis (Illiger, 1801)*
unipunctatus (Linnaeus, 1758)*
ustulatus (Preyssler, 1790)*

Megasternum Mulsant, 1844
concinnum (Marsham, 1802)*
obscurum (Marsham, 1802)

Cryptopleurum Mulsant, 1844
minutum (Fabricius, 1775)
crenatum (Kugelann, 1794)*
subtile Sharp, 1884*

Sphaeridium Fabricius, 1775
bipustulatum Fabricius, 1781
marginatum Fabricius, 1787*
scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

HISTEROIDEA

Sphaeritidae Shuckard, 1839

Sphaerites Duftschmid, 1805
glabratus (Fabricius, 1792)*

Histeridae Gyllenhal, 1808

Abraecinae MacLeay, 1819

Chaetabraeus Portevin, 1929
globulus (Creutzer, 1799)

Plegaderus Erichson, 1834
vulneratus (Panzer, 1797)*

Acritus LeConte, 1853
minutus (Herbst, 1792)*
nigricornis (Hoffmann, 1803)*

Teretrius Erichson, 1834
fabricii Mazur, 1972*
picipes (Fabricius, 1792) nec (Olivier, 1789)

Saprininae Blanchard, 1845

Saprinus Erichson, 1834
aeneus (Fabricius, 1775)
lautus Erichson, 1839*
pharao Marseul, 1855
planusculus Motschulsky, 1849*
rugifer (Paykull, 1809)
semistriatus (Scriba, 1790)
subnitescens Bickhardt, 1909*
tenuistrius ssp. *sparsulus* Solsky, 1876
turcomanicus Ménétris, 1849
virescens (Paykull, 1798)*

Chalcionellus Reichardt, 1932
decemstriatus (Rossi, 1792)

Hypocaccus Thomson, 1867
rugiceps (Duftschmid, 1805)
rugifrons (Paykull, 1798)

Hypocacculus Bickhardt, 1914
rubripes (Erichson, 1834)
rufipes (Kugelann, 1792)

Gnathoncus Jacquelin du Val, 1858
buyssoni Auzat, 1917*
rotundatus (Kugelann, 1792)*
nanus (Scriba, 1790) nec (Piller et Mitterpacher, 1783)

Dendrophilinae Reitter, 1909

Dendrophilus Leach, 1817
punctatus (Herbst, 1792)
pygmaeus (Linnaeus, 1758)*

Carcinops Marseul, 1855
pumilio (Erichson, 1834)*

Paromalus Erichson, 1834
parallelepipedus (Herbst, 1792)*

Histerinae Gyllenhal, 1808

Margarinotus Marseul, 1854
bipustulatus (Schränk, 1781)
brunneus (Fabricius, 1775)
impressus (Fabricius, 1798)
cadaverinus (Hoffmann, 1803)
carbonarius (Hoffmann, 1803)*
 ***merdarius* (Hoffmann, 1803)
neglectus (Germar, 1813)*
obscurus (Kugelann, 1792)*
stercorarius (Hoffmann, 1803)
purpurascens (Herbst, 1792)
silantjevi (Schirjajev, 1903)
striola (Sahlberg, 1819)
terricola (Germar, 1824)
ventralis (Marseul, 1854)*

Hister Linnaeus, 1758
bissexstriatus Fabricius, 1801
funestus Erichson, 1834*
quadrinotatus Scriba, 1790
unicolor Linnaeus, 1758

Atholus Thomson, 1859
bimaculatus (Linnaeus, 1758)*
corvinus (Germar, 1817)*
duodecimstriatus ssp. *quatuordecimstriatus* (Gyllenhal, 1808)*

Platysoma Leach, 1817
angustatum (Hoffmann, 1803)*
deplanatum (Gyllenhal, 1808)*
elongatum (Thunberg, 1787)*
oblongum (Fabricius, 1792)
lineare Erichson, 1834*

Eblisia Lewis, 1889
minor (Rossi, 1790)
frontale (Paykull, 1798)

Hololepta Paykull, 1811
plana (Sulzer, 1776)*

STAPHYLINOIDEA**Hydraenidae** Mulsant, 1844**Ochthebiinae** Thomson, 1859

Ochthebius Leach, 1815
minimus (Fabricius, 1792)*

Hydraeninae Mulsant, 1844

Hydraena Kugelann, 1794
riparia Kugelann, 1794*

Limnebius Leach, 1815
truncatellus (Thunberg, 1794)*

Ptiliidae Erichson, 1845**Ptiliinae** Erichson, 1845

Ptenidium Erichson, 1845
formicetorum Kraatz, 1851*
 ?*fuscicornis* Erichson, 1845*
intermedium Wankowicz, 1869*
pusillum (Gyllenhal, 1808)*

Oligella Motschulsky, 1869
foveolata (Allibert, 1844)*

Ptiliola Haldeman, 1848
kunzei (Heer, 1841)*

Millidium Motschulsky, 1855
minutissimum (Ljunggh, 1804)*

Ptilium Gyllenhal, 1827
myrmecophilum (Allibert, 1844)*

Ptinella Motschulsky, 1844
aptera (Guérin-Méneville, 1839)*

Pteryx Matthews, 1858
 ?*splendens* Strand, 1960*
suturalis (Heer, 1841)*

Acrotichinae Reitter, 1909

Nephanes Thomson, 1859
titan (Newman, 1834)*

Smicrus Matthews, 1872
filicornis (Fairmaire et Laboulbène, 1855)*

Baeocrara Thomson, 1859
japonica (Matthews, 1884)*

Acrotichis Motschulsky, 1848
atomaria (DeGeer, 1774)*
fascicularis (Herbst, 1793)*
grandicollis (Mannerheim, 1844)*
montandonii (Allibert, 1844)*
sericans (Heer, 1841)*
silvatica Rosskothén, 1935*
thoracica (Waltl, 1838)*

Leioididae Fleming, 1821**Leioidinae** Fleming, 1821

Leiodes Latreille, 1796
bicolor (Schmidt, 1841)*
ferruginea (Fabricius, 1787)*
ovalis (Schmidt, 1841)
fracta (Seidlitz, 1875)*
obesa (Schmidt, 1841)*
pallens (Sturm, 1807)*
sparreschneideri Strand, 1943*

Liocyrtusa Daffner, 1982
vittata (Curtis, 1840)

Colenis Erichson, 1845
immunda (Sturm, 1807)*

Anisotoma Panzer, 1797
axillaris Gyllenhal, 1810*
castanea (Herbst, 1792)*
glabra (Fabricius, 1787)*
humeralis (Fabricius, 1792)*
orbicularis (Herbst, 1792)*

Amphicyllis Erichson, 1845
globiformis (Sahlberg, 1833)*
globus (Fabricius, 1792)*

Agathidium Panzer, 1797
atrum (Paykull, 1798)*
badium Erichson, 1845*
confusum Brisout de Barneville, 1863*
discoideum Erichson, 1845*

?*jurecekianum* Hlisenkovský, 1964* —
 наши экземпляры очень близки к этому
 виду, но немного отличаются строени-
 ем эдеагуса и, возможно, заслуживают
 выделения в самостоятельный подвид.

laevigatum Erichson, 1845*
marginatum Sturm, 1807*
nigripenne (Fabricius, 1792)*
pisanum Brisout de Barneville, 1872*
rotundatum (Gyllenhal, 1827)*
seminulum (Linnaeus, 1758)*
varians Beck, 1817*

Cholevinae Kirby, 1837

Ptomaphagus Hellwig, 1795
varicornis (Rosenhauer, 1847)*

Sciodrepopides Hatch, 1933
watsoni (Spence, 1815)*

Catops Paykull, 1798
fuliginosus Erichson, 1837
fuscus (Panzer, 1794)*
nigricans (Spence, 1815)*
nigrita Erichson, 1837*
subfuscus Kellner, 1846*

Coloninae Horn, 1880

Colon Herbst, 1797
bidentatum (Sahlberg, 1822)*
latum Kraatz, 1850*

Silphidae Latreille, 1807**Nicrophorinae** Kirby, 1837

Nicrophorus Fabricius, 1775
humator (Gleditsch, 1767)

interruptus Stephens, 1830
fossor Erichson, 1837
investigator Zetterstedt, 1824
sepultor Charpentier, 1825
vespillo (Linnaeus, 1758)
vespilloides Herbst, 1783

Silphinae Latreille, 1807

Necrodes Leach, 1815
littoralis (Linnaeus, 1758)

Thanatophilus Leach, 1815
dispar (Herbst, 1793)
rugosus (Linnaeus, 1758)
sinuatus (Fabricius, 1775)
 ?*uralensis* Kozminykh, 1994*

Oiceoptoma Leach, 1815
thoracicum (Linnaeus, 1758)

Aclypea Reitter, 1885
opaca (Linnaeus, 1758)
undata (Müller, 1776)

Dendroxena Motschulsky, 1858
Xylodrepa Thomson, 1859
quadrimaculata (Scopoli, 1772)

Silpha Linnaeus, 1758
carinata Herbst, 1783
obscura Linnaeus, 1758
tristis Illiger, 1798

Phosphuga Leach, 1817
atrata (Linnaeus, 1758)

Agyrtidae Thomson, 1859**Agyrtinae** Thomson, 1859

Ecanus Stephens, 1839
 ***glaber* (Fabricius, 1787)

Scydmaenidae Leach, 1815**Scydmaeninae** Leach, 1815

Eutheia Stephens, 1830
scydmaenoides Stephens, 1830*

Neuraphes Thomson, 1859
angulatus (Müller et Kunze, 1822)*

Stenichnus Thomson, 1859
pusillus (Müller et Kunze, 1822)*

Scydmaenus Latreille, 1802
hellwigii (Herbst, 1792)*
tarsatus Müller et Kunze, 1822*

Staphylinidae Latreille, 1802**Proteininae** Erichson, 1839

Megarthus Stephens, 1829
denticollis (Beck, 1817)*
depressus (Paykull, 1789)*
sinuato-collis auct. nec (Lacordaire, 1835)
hemipterus (Illiger, 1794)*

Proteinus Latreille, 1797
atomarius Erichson, 1840*
brachypterus (Fabricius, 1792)*
laevigatus Hochhuth, 1872*
macropterus (Gyllenhal, 1810) nec (Gra-
 venhorst, 1806)

Scaphidiinae Latreille, 1807

Scaphidium Olivier, 1790
quadrimaculatum Olivier, 1790*

Scaphisoma Leach, 1815
agaricinum (Linnaeus, 1758)*
boleti (Panzer, 1793)*
boreale Lundblad, 1952*
subalpinum Reitter, 1880*

Caryoscapha Ganglbauer, 1899
limbata (Erichson, 1845)*

- Omaliniinae** MacLeay, 1825
Eusphalerum Kraatz, 1857
luteum (Marsham, 1802)*
minutum (Fabricius, 1792)*
primulae (Stephens, 1834)*
Acrulia Thomson, 1858
inflata (Gyllenhal, 1813)*
Phyllodrepa Thomson, 1859
floralis (Paykull, 1789)*
nigra (Gravenhorst, 1806)*
Omalium Gravenhorst, 1802
caesum Gravenhorst, 1806
rivulare (Paykull, 1789)*
Phloeostiba Thomson, 1858
lapponica (Zetterstedt, 1838)*
plana (Paykull, 1792)*
Phloeonomus Heer, 1839
pusillus (Gravenhorst, 1806)*
Deliphrum Erichson, 1839
tectum (Paykull, 1789)*
Anthobium Leach, 1819
atrocephalum (Gyllenhal, 1827)*
Olophrum Erichson, 1839
consimile (Gyllenhal, 1810)*
Arpedium Erichson, 1839
quadrum (Gravenhorst, 1806)*
Acidota Stephens, 1829
crenata (Fabricius, 1792)*
Anthophagus Gravenhorst, 1802
angusticollis (Mannerheim, 1830)*
caraboides (Linnaeus, 1758)
omalinus Zetterstedt, 1828*
- Oxytelinae** Fleming, 1821
Deleaster Erichson, 1839
dichrous (Gravenhorst, 1802)*
Coprophilus Latreille, 1829
schubertii (Motschulsky, 1860)
Manda Blackwelder, 1952
mandibularis (Gyllenhal, 1827)*
Ochthephilus Mulsant et Rey, 1856
omalinus (Erichson, 1840)*
Carpelimus Leach, 1819
bilineatus Stephens, 1834*
corticinus (Gravenhorst, 1806)*
elongatulus (Erichson, 1839)*
gracilis (Mannerheim, 1830)*
heidenreichi (L. Benick, 1934)*
lindrothi (Palm, 1943)*
obesus (Kiesenwetter, 1844)*
pusillus (Gravenhorst, 1802)*
rivularis (Motschulsky, 1860)*
subtilicornis (Roubal, 1946)*
Oxytelus Gravenhorst, 1802
laqueatus (Marsham, 1802)*
migrator Fauvel, 1904*
piceus (Linnaeus, 1767)
sculptus Gravenhorst, 1806*
Anotylus Thomson, 1859
bernhaueri (Ganglbauer, 1898)
insecatus (Gravenhorst, 1806)*
nitidulus (Gravenhorst, 1802)*
rugifrons (Hochhuth, 1849)*
rugosus (Fabricius, 1775)*
sculpturatus (Gravenhorst, 1806)*
tetracarيناتus (Block, 1799)*
Platystethus Mannerheim, 1830
arenarius (Geoffroy, 1785)*
cornutus (Gravenhorst, 1802)*
nitens (Sahlberg, 1832)*
nodifrons Mannerheim, 1830*
Bledius Leach, 1819
debilis Erichson, 1840*
defensus Fauvel, 1872*
dissimilis Erichson, 1840*
gallicus (Gravenhorst, 1806)
fracticornis (Paykull, 1790) nec (Müller, 1776)
littoralis Heer, 1839*
occidentalis Bondroit, 1907*
crassicolis auct. nec Lacordaire, 1835
opacus (Block, 1799)*
pallipes (Gravenhorst, 1806)*
procerulus Erichson, 1840*
subterraneus Erichson, 1839*
talpa (Gyllenhal, 1810)*
tricornis (Herbst, 1784)*
vilis Mäklin, 1878*
- Tachyporinae** MacLeay, 1825
Mycetoporus Mannerheim, 1830
glaber (Sperk, 1835)*
lepidus (Gravenhorst, 1806)*
Ischnosoma Stephens, 1829
longicorne (Mäklin, 1847)*
splendidum (Gravenhorst, 1806)
Bryoporos Kraatz, 1857
cernuus (Gravenhorst, 1806)*
Carphacis Des Gozis, 1886
striatus (Olivier, 1795)*
Lordithon Thomson, 1859
lunulatus (Linnaeus, 1761)*
pulchellus (Mannerheim, 1830)*
speciosus (Erichson, 1839)*
thoracicus (Fabricius, 1777)*
trimaculatus (Fabricius, 1792)*
Bolitobius Leach, 1819
castaneus (Stephens, 1832)*
cingulatus Mannerheim, 1830*
formosus (Gravenhorst, 1806)*
Sepedophilus Gistel, 1856
bipunctatus (Gravenhorst, 1802)*
constans (Fowler, 1888)*
littoreus (Linnaeus, 1758)*
pedicularius (Gravenhorst, 1802)*
testaceus (Fabricius, 1792)*
Tachyporus Gravenhorst, 1802
chrysomelinus (Linnaeus, 1758)*
hypnorum (Fabricius, 1775)*
nitidulus (Fabricius, 1781)*
obtusus (Linnaeus, 1767)*
pallidus Sharp, 1871*
pulchellus Mannerheim, 1843*
scitulus Erichson, 1839
transversalis Gravenhorst, 1806*
Tachinus Gravenhorst, 1802
bipustulatus (Fabricius, 1792)*
corticinus Gravenhorst, 1802*
laticollis Gravenhorst, 1802*
lignorum (Linnaeus, 1758)*
marginellus (Fabricius, 1781)*
rufipes (Linnaeus, 1758)
subterraneus (Linnaeus, 1758)*
- Aleocharinae** Fleming, 1821
Aleochara Gravenhorst, 1802
bilineata Gyllenhal, 1810
binotata Kraatz, 1856*
bipustulata (Linnaeus, 1761)*
brevipennis Gravenhorst, 1806*
cuniculorum Kraatz, 1858
curtula (Goeze, 1777)
fumata Gravenhorst, 1802*
intricata Mannerheim, 1830*
laevigata Gyllenhal, 1810*
lanuginosa Gravenhorst, 1802*
moerens Gyllenhal, 1827*
moesta Gravenhorst, 1802*
sanguinea (Linnaeus, 1758)*
sparsa Heer, 1839*
tristis Gravenhorst, 1806*
Tinotus Sharp, 1883
morion (Gravenhorst, 1802)*
Oxypoda Mannerheim, 1830
abdominalis (Mannerheim, 1830)*
acuminata (Stephens, 1832)*
alternans (Gravenhorst, 1802)*
annularis (Mannerheim, 1830)*
brevicornis (Stephens, 1832)*
elongatula Aubé, 1850*
opaca (Gravenhorst, 1802)*
procerula Mannerheim, 1830*
togata Erichson, 1837
vicina Kraatz, 1856
Devia Blackwelder, 1952
prospera (Erichson, 1839)*
Ocyusa Kraatz, 1856
maura (Erichson, 1837)*
picina (Aubé, 1850)*
Calodera Mannerheim, 1830
aethiops (Gravenhorst, 1802)*
Parocysa Bernhauer, 1902
rubicunda (Erichson, 1837)*
Dexiogygia Thomson, 1858
corticina (Erichson, 1837)*
Thiasophila Kraatz, 1856
lohsei Zerche, 1987*
Haploglossa Kraatz, 1856
nidicola (Fairmaire, 1852)*
villosula (Stephens, 1832)*
Ocalea Erichson, 1837
badia Erichson, 1837*
Ilyobates Kraatz, 1856
bennetti Donisthorpe, 1914*
subopacus Palm, 1935
Pentanota Bernhauer, 1905
meuseli Bernhauer, 1905*
Phloeopora Erichson, 1837
corticalis (Gravenhorst, 1802)*
testacea (Mannerheim, 1830)*
Dinarda Samouelle, 1819
maerkelii Kiesenwetter, 1843*
Meotica Mulsant et Rey, 1873
filiformis (Motschulsky, 1860)*
apicalis G. Benick, 1953
Dasygnypeta Lohse, 1974
velata (Erichson, 1837)*
Gnypeta Thomson, 1858
rubrior Tottenham, 1939*
Ischnopoda Stephens, 1835
constricta (Erichson, 1837)*
leucopus (Marsham, 1802)*
umbratica (Erichson, 1837)*
Brachyusa Mulsant et Rey, 1874
concolor (Erichson, 1839)*
Dochmonota Thomson, 1859
clancula (Erichson, 1837)*
Dilacra Thomson, 1858
luteipes (Erichson, 1837)*

- Schistoglossa* Kraatz, 1856
curtipennis (Sharp, 1869)*
gemina (Erichson, 1837)*
- Aloconota* Thomson, 1858
gregaria (Erichson, 1839)*
insecta (Thomson, 1856)*
- Liogluta* Thomson, 1858
microptera Thomson, 1867*
- Geostiba* Thomson, 1858
circellaris (Gravenhorst, 1806)*
- Atheta* Thomson, 1858
aeneipennis (Thomson, 1856)*
amicula (Stephens, 1832)*
amplicollis (Mulsant et Rey, 1873)*
autumnalis (Erichson, 1839)*
balcanicola Scheerpeltz, 1968
balcanica Brundin, 1943 nec Bernhauer, 1936
boreella Brundin, 1948*
britteni (Joy, 1913)*
cinnamoptera (Thomson, 1856)*
corvina (Thomson, 1856)*
crassicornis (Fabricius, 1792)*
dadopora Thomson, 1867*
elongatula (Gravenhorst, 1802)
euryptera (Stephens, 1832)*
flavipes (Gravenhorst, 1806)*
fungi (Gravenhorst, 1806)*
gagatina (Baudi, 1848)*
graminicola (Gravenhorst, 1806)*
grisea (Thomson, 1852)*
gyllenhalii (Thomson, 1856)*
incognita (Sharp, 1869)
inquinula (Gravenhorst, 1802)*
laevana (Mulsant et Rey, 1852)*
laticollis (Stephens, 1832)*
liturata (Stephens, 1832)*
longicornis (Gravenhorst, 1802)*
malleus (Joy, 1913)*
melanocera (Thomson, 1856)*
myrmecobia (Kraatz, 1856)*
nigra (Kraatz, 1856)*
nigricornis (Thomson, 1852)*
nigritula (Gravenhorst, 1802)*
picipes (Thomson, 1856)*
orbata (Erichson, 1837)*
palleola (Erichson, 1837)*
pallidicornis (Thomson, 1856)*
palustris (Kiesenwetter, 1844)*
paracrassicornis Brundin, 1954*
pilicornis (Thomson, 1852)*
pittionii Scheerpeltz, 1950*
sodalis (Erichson, 1837)*
subtilis (Scriba, 1866)*
talpa (Heer, 1841)*
trinotata (Kraatz, 1856)*
- Dinaraea* Thomson, 1858
aequata (Erichson, 1837)*
angustula (Gyllenhal, 1810)*
linearis (Gravenhorst, 1802)*
- Nehemitropia* Lohse, 1971
lividipennis (Mannerheim, 1830)*
- Lyprocorrhe* Thomson, 1859
anceps (Erichson, 1837)*
- Acrotone* Thomson, 1859
aterrima (Gravenhorst, 1802)*
convergans (Strand, 1958)*
obfuscata (Gravenhorst, 1802)*
parvula (Mannerheim, 1830)*
pseudotenera (Cameron, 1933)*
pygmaea (Gravenhorst, 1802)*
sylvicola (Kraatz, 1856)*
- Pycnota* Mulsant et Rey, 1874
paradoxa (Mulsant et Rey, 1861)
- Pachyatheta* Munster, 1930
cribrata (Kraatz, 1856)*
- Thamiaraea* Thomson, 1858
cinnamomea (Gravenhorst, 1802)*
- Falagria* Leach, 1819
caesa Erichson, 1837*
- Cordalia* Jacobs, 1925
obscura (Gravenhorst, 1802)*
- Falagrioma* Casey, 1906
thoracica (Stephens, 1832)*
- Drusilla* Leach, 1819
canaliculata (Fabricius, 1787)
- Zyras* Stephens, 1835
cognatus (Märkel, 1842)*
collaris (Paykull, 1800)*
humeralis (Gravenhorst, 1802)*
limbatus (Paykull, 1789)*
- Lomechusa* Gravenhorst, 1806
emarginata (Paykull, 1789)*
pubicollis Brisout de Barneville, 1860*
- Gyrophaena* Mannerheim, 1830
affinis Mannerheim, 1830*
bihamata Thomson, 1867*
boleti (Linnaeus, 1758)*
congrua Erichson, 1837*
fasciata (Marsham, 1802)*
gentilis Erichson, 1839*
joyi Wendeler, 1924*
joyioides Wüsthoff, 1937*
manca Erichson, 1839*
angustata (Stephens, 1832) nec (Sahlberg, 1831)
minima Erichson, 1837*
obsoleta Ganglbauer, 1895*
poweri Crotch, 1866*
pulchella Heer, 1839*
strictula Erichson, 1839*
- Bolitochara* Mannerheim, 1830
bella Märkel, 1844*
obliqua Erichson, 1837*
pulchra (Gravenhorst, 1806)*
- Phymatura* J. Sahlberg, 1876
brevicollis (Kraatz, 1856)*
- Leptusa* Kraatz, 1856
pulchella (Mannerheim, 1830)*
- Anomognathus* Solier, 1849
cuspidatus (Erichson, 1839)*
- Homalota* Mannerheim, 1830
plana (Gyllenhal, 1810)*
- Cyphea* Fauvel, 1863
curtula (Erichson, 1837)*
- Placusa* Erichson, 1837
atrata (Mannerheim, 1830)*
depressa Mäklin, 1845*
tachyporoides (Walzl, 1838)*
- Autalia* Leach, 1819
longicornis Scheerpeltz, 1947*
- Hygronoma* Erichson, 1837
dimidiata (Gravenhorst, 1806)*
- Holobus* Solier, 1849
apicatus (Erichson, 1837)*
flavicornis (Boisduval et Lacordaire, 1835)*
- Oligota* Mannerheim, 1830
granaria Erichson, 1837*
inflata (Mannerheim, 1830)*
parva Kraatz, 1862*
pusillima (Gravenhorst, 1806)*
- Cypha* Leach, 1819
pulicaria (Erichson, 1839)*
tarsalis (Luze, 1902)*
- Myllaena* Erichson, 1837
dubia (Gravenhorst, 1806)*
intermedia Erichson, 1837*
minuta (Gravenhorst, 1806)*
- Gymnusa* Gravenhorst, 1806
brevicollis (Paykull, 1800)*
- Deinopsis* Matthews, 1838
erosa (Stephens, 1832)*
- Pselaphinae** Latreille, 1802
- Bibloporus* Thomson, 1859
minutus Raffray, 1914*
- Euplectus* Leach, 1817
karstenii (Reichenbach, 1816)*
signatus (Reichenbach, 1816)*
- Trimum* Aubé, 1833
brevicorne (Reichenbach, 1816)*
- Rybaxis* Sauly, 1876
longicornis (Leach, 1817)*
- Brachygluta* Thomson, 1859
fossulata (Reichenbach, 1816)*
- Pselaphaulax* Reitter, 1909
dresdensis (Herbst, 1792)*
- Pselaphus* Herbst, 1792
heisei Herbst, 1792*
- Tyrus* Aubé, 1833
mucronatus (Panzer, 1805)*
- Claviger* Preyssl, 1790
testaceus Preyssl, 1790*
- Euaesthetinae** Thomson, 1859
- Euaesthetus* Gravenhorst, 1806
bipunctatus (Ljungh, 1804)*
- Steninae** MacLeay, 1825
- Stenus* Latreille, 1797
argus Gravenhorst, 1806*
ater Mannerheim, 1830
biguttatus (Linnaeus, 1758)
bifoveolatus Gyllenhal, 1827*
bimaculatus Gyllenhal, 1810*
binotatus Ljungh, 1804*
boops Ljungh, 1810*
cicindeloides (Schaller, 1783)*
circularis Gravenhorst, 1802*
clavicornis (Scopoli, 1763)*
comma LeConte, 1863*
crassus Stephens, 1833*
eumerus Kiesenwetter, 1850*
europaeus Puthz, 1966*
excubitor Erichson, 1839*
geniculatus Gravenhorst, 1806*
humilis Erichson, 1839*
incrassatus Erichson, 1839*
juno (Paykull, 1789)
lustrator Erichson, 1839*
melanarius Stephens, 1833*
morio Gravenhorst, 1806*
nanus Stephens, 1833*
nigritulus Gyllenhal, 1827*
pallipes Gravenhorst, 1802*
palposus Zetterstedt, 1838*
providus Erichson, 1839*
pumilio Erichson, 1839*
ruralis Erichson, 1840*
tarsalis Ljungh, 1810
- Oxyporinae** Fleming, 1821
- Oxyporus* Fabricius, 1775
mannerheimii Gyllenhal, 1827*

maxillosus Fabricius, 1792
rufus (Linnaeus, 1758)

Paederinae Fleming, 1821

Paederus Fabricius, 1775
fuscipes Curtis, 1826
limnophilus Erichson, 1840*
littoralis Gravenhorst, 1802
riparius (Linnaeus, 1758)

Astenus Dejean, 1833
gracilis (Paykull, 1789)*
pulchellus (Heer, 1839)*

Rugilus Leach, 1819
angustatus (Geoffroy, 1785)
fragilis (Gravenhorst, 1806)*
scutellatus Motschulsky, 1858
erichsonii (Fauvel, 1867)*
orbiculatus (Paykull, 1789)*
rufipes Germar, 1836*
similis (Erichson, 1839)

Sunius Stephens, 1829
melanocephalus (Fabricius, 1792)

Lithocharis Dejean, 1833
nigriceps Kraatz, 1859*

Scopaes Erichson, 1839
laevigatus (Gyllenhal, 1827)*

Lathrobium Gravenhorst, 1802
brunnipes (Fabricius, 1792)*
fovulum Stephens, 1833*
fulvipenne Gravenhorst, 1806*
geminum Kraatz, 1857
boreale Hochhuth, 1851
volgense Hochhuth, 1851
longulum Gravenhorst, 1802*
quadratum (Paykull, 1789)*
pallidipenne Hochhuth, 1851*
ripicola Czwalińska, 1888
pallidum Nordmann, 1837*
rufipenne Gyllenhal, 1813*
terminatum Gravenhorst, 1802*

Achenium Leach, 1819
humile (Nicolai, 1822)*

Ochthephilum Stephens, 1829
fracticorne (Paykull, 1800)*

Staphylininae Latreille, 1802

Leptacinus Erichson, 1839
formicetorum Märkel, 1841*
sulcifrons (Stephens, 1833)
othioides auct. nec Baudi, 1869

Gyrophynus Leach, 1819
angustatus Stephens, 1833
fracticornis (Müller, 1776)*
punctulatus (Paykull, 1789)*

Nudobius Thomson, 1860
lentus (Gravenhorst, 1806)*

Xantholinus Dejean, 1821
dvoraki Coiffait, 1956*
roubali Coiffait, 1956
laevigatus Jacobsen, 1849
linearis (Olivier, 1795)*
longiventris Heer, 1839*
tricolor (Fabricius, 1787)

Othius Stephens, 1829
punctulatus (Goeze, 1777)*

Gabrius Stephens, 1829
breviventer (Sperk, 1835)*
coxalus (Hochhuth, 1872)
pennatus Sharp, 1910
splendidulus (Gravenhorst, 1802)*
osseticus (Kolenati, 1846)
trossulus (Nordmann, 1837)*

Rabigus Mulsant et Rey, 1876
tenuis (Fabricius, 1792)

Philonthus Stephens, 1829

addendus Sharp, 1867
***aerosus* Kiesenwetter, 1851
alpinus Eppelsheim, 1875*
atratus (Gravenhorst, 1802)
carbonarius (Gravenhorst, 1802)
caucasicus Nordmann, 1837*
cognatus Stephens, 1832
fuscipennis (Mannerheim, 1830) nec (Block, 1799)

concinus (Gravenhorst, 1802)
coprophilus Jarrige, 1949*
corruscus (Gravenhorst, 1802)
cruentatus (Gmelin, 1790)*
cyanipennis (Fabricius, 1792)
debilis (Gravenhorst, 1802)
decorus (Gravenhorst, 1802)
discoideus (Gravenhorst, 1802)*
ebeninus (Gravenhorst, 1802)*
fimetarius (Gravenhorst, 1802)
fumarius (Gravenhorst, 1806)*
***intermedius* (Lacordaire, 1835)
***laevicollis* (Lacordaire, 1835)
laminatus (Creutzer, 1799)
lepidus (Gravenhorst, 1802)*
marginatus (Müller, 1764)
micans (Gravenhorst, 1802)*
nigrita (Gravenhorst, 1806)*
nitidulus (Gravenhorst, 1802)
nitidus (Fabricius, 1787)
parvus Sharp, 1874*
politus (Linnaeus, 1758)

aeneus (Rossi, 1790)
puella Nordmann, 1837*
punctus (Gravenhorst, 1802)*
quisquiliarius (Gyllenhal, 1810)*
rectangulus Sharp, 1874*
rotundicollis (Ménétriés, 1832)
rubripennis Stephens, 1832*
fulvipes (Fabricius, 1792) nec (Scopoli, 1763)
sanguinolentus (Gravenhorst, 1802)*
sordidus (Gravenhorst, 1802)*
spermophili Ganglbauer, 1897
splendens (Fabricius, 1792)
subvirescens Thomson, 1884*
subuliformis (Gravenhorst, 1802)*
succicola Thomson, 1860
chaleus Ganglbauer, 1895 nec Stephens, 1832

tenuicornis Mulsant et Rey, 1853*
umbratilis (Gravenhorst, 1802)
varians (Paykull, 1789)*

Neobisnius Ganglbauer, 1895
procerulus (Gravenhorst, 1806)*
prolixus (Erichson, 1840)*
villosulus (Stephens, 1833)*

Dinothenarus Thomson, 1858
***fossor* (Scopoli, 1772)
pubescens (DeGeer, 1774)

Ontholestes Ganglbauer, 1895
murinus (Linnaeus, 1758)
tessellatus (Geoffroy, 1785)

Emus Leach, 1819
hirtus (Linnaeus, 1758)

Platydracus Thomson, 1858
***chalcocephalus* (Fabricius, 1801)
fulvipes (Scopoli, 1763)
latebricola (Gravenhorst, 1806)*

Staphylinus Linnaeus, 1758
caesareus Cederhjelms, 1798
dimidiaticornis Gemminger, 1851
erythropterus Linnaeus, 1758*

Ocypus Leach, 1819
fulvipennis Erichson, 1840*
fuscatus (Gravenhorst, 1802)
melanarius (Heer, 1839)*
nitens (Schrank, 1781)
nero (Faldermann, 1835)
similis (Fabricius, 1792) nec (Herbst, 1784)
picipennis (Fabricius, 1792)

Creophilus Leach, 1819
maxillosus (Linnaeus, 1758)

Heterothops Stephens, 1829
dissimilis (Gravenhorst, 1802)*
quadripunctulus (Gravenhorst, 1806)*
stiglundbergi Israelson, 1979

Velleius Leach, 1819
dilatatus (Fabricius, 1787)*

Quedius Stephens, 1829
boops (Gravenhorst, 1802)*
brevis Erichson, 1840*
cinctus (Paykull, 1790)*
cruentus (Olivier, 1795)*
fulgidus (Fabricius, 1792)*
assimilis (Nordmann, 1837)
fuliginosus (Gravenhorst, 1802)
limbatus (Heer, 1839)*
longicornis Kraatz, 1857*
maurus (Sahlberg, 1830)*
mesomelinus (Marshall, 1802)*
microps Gravenhorst, 1847*
molochinus (Gravenhorst, 1806)*
plagiatus Mannerheim, 1843*
puncticollis (Thomson, 1867)
scitus (Gravenhorst, 1806)*
umbrinus Erichson, 1839*
vexans Eppelsheim, 1881*
xanthopus Erichson, 1839*

SCARABAEOIDEA

Trogidae MacLeay, 1819

Trox Fabricius, 1775
cadaverinus Illiger, 1801
sabulosus (Linnaeus, 1758)
scaber (Linnaeus, 1767)

Geotrupidae Latreille, 1806

Bolboceratinae Mulsant, 1842
Bolboceras Kirby, 1819
Odonteus Samouelle, 1819
armiger (Scopoli, 1772)

Geotrupinae Latreille, 1806

Geotrupes Latreille, 1796
stercorarius (Linnaeus, 1758)
stercorosus (Scriba, 1791)
vernalis (Linnaeus, 1758)

Scarabaeidae Latreille, 1802

Scarabaeinae Latreille, 1802
Copris Geoffroy, 1762
lunaris (Linnaeus, 1758)

Oniticellus Dejean, 1821
fulvus (Goeze, 1777)

Caccobius Thomson, 1859
schreberi (Linnaeus, 1767)

Onthophagus Latreille, 1802
fracticornis (Preyßler, 1790)
gibbulus (Pallas, 1781)
illyricus (Scopoli, 1763)
nuchicornis (Linnaeus, 1758)
ovatus (Linnaeus, 1767)
semicornis (Panzer, 1798)
vacca (Linnaeus, 1767)
vitulus (Fabricius, 1776)
camelus (Fabricius, 1787)

Aegialiinae Lacordaire, 1856
Aegialia Latreille, 1807
sabuleti (Panzer, 1797)

Aphodiinae Leach, 1815
Aphodius Illiger, 1798
ater (DeGeer, 1774)
biguttatus Germar, 1824
brevis Erichson, 1848
caspius Ménétré, 1832
depressus (Kugelann, 1792)
distinctus (Müller, 1776)
equestris (Panzer, 1798)
sticticus (Panzer, 1798) nec (Linnaeus, 1767)
erraticus (Linnaeus, 1758)
fimetarius (Linnaeus, 1758)
foetens (Fabricius, 1787)
aestivalis Stephens, 1839
fossor (Linnaeus, 1758)
granarius (Linnaeus, 1767)
haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)
ictericus (Laicharting, 1781)
nitidulus (Fabricius, 1792)
immundus Creutzer, 1799
ivanovi Lebedev, 1912
linearis Reiche et Saulcy, 1856
lugens Creutzer, 1799
luridus (Fabricius, 1775)
melanostictus Schmidt, 1840
nemoralis Erichson, 1848
niger Illiger, 1798
plagiatus (Linnaeus, 1767)
prodromus (Brahm, 1790)
punctatosulcatus Sturm, 1805
sabulicola Thomson, 1868
pusillus (Herbst, 1789)
putridus (Geoffroy, 1785)
arenarius (Olivier, 1789) nec (Fabricius, 1787)
rectus (Motschulsky, 1866)
rufipes (Linnaeus, 1758)
rufus (Moll, 1782)
sordidus (Fabricius, 1775)
subterraneus (Linnaeus, 1758)
uliginosus Hardy, 1847
tenellus auct. nec Say, 1823
putridus (Herbst, 1789) nec (Geoffroy, 1785)
varians Duftschmid, 1805
zangi A. Schmidt, 1906

Heptaulacus Mulsant, 1842
sus (Herbst, 1783)

Oxyomus Dejean, 1833
sylvestris (Scopoli, 1763)

Psammodius Fallén, 1807
sulcicollis (Illiger, 1802)

Rhyssemus Mulsant, 1842
germanus (Linnaeus, 1767)

Sericinae Hope, 1837
Serica MacLeay, 1819
brunnea (Linnaeus, 1758)

Maladera Mulsant, 1871
holosericea (Scopoli, 1772)

Omalopia Schönherr, 1817
hirta Gebler, 1829
spireae (Pallas, 1773)

Melolonthinae Samouelle, 1819
Miltotrogus Reitter, 1902
aequinotialis (Herbst, 1790)

Amphimallon Berthold, 1827
altaicus (Mannerheim, 1825)
solstitiale (Linnaeus, 1758)

Melolontha Fabricius, 1775
hippocastani Fabricius, 1801

Polyphylla Harris, 1842
fullo (Linnaeus, 1758)

Rutelinae MacLeay, 1819
Rhombonyx Hope, 1837
holosericea (Fabricius, 1787)

Anomala Leach, 1819
dubia (Scopoli, 1763)

Anisoplia Dejean, 1821
***austriaca* (Herbst, 1783)
brenskei Reitter, 1889

Phyllopertha Stephens, 1830
horticola (Linnaeus, 1758)

Hopliinae Latreille, 1829
Hoplia Illiger, 1803
parvula Krynicki, 1832
zaitzevi Jacobson, 1914

Dynastinae MacLeay, 1819
Oryctes Illiger, 1798
nasicornis (Linnaeus, 1758)

Cetoniinae Leach, 1815
Oxythyrea Mulsant, 1842
funesta (Poda, 1761)

Cetonia Fabricius, 1775
aurata (Linnaeus, 1758)

Liocola Thomson, 1859
marmorata (Fabricius, 1792)
lugubris (Herbst, 1786) nec (Fabricius, 1775)

Potosia Mulsant et Rey, 1871
aeruginosa (Drury, 1770)
fieberi (Kraatz, 1880)
metallica (Herbst, 1786)

Trichiinae Fleming, 1821
Osmoderma LePeletier et Audinet-Serville, 1828
eremita Scopoli (1763)

Gnorimus LePeletier et Audinet-Serville, 1828
variabilis (Linnaeus, 1758)
octopunctatus (Fabricius, 1775)

Trichius Fabricius, 1787
fasciatus (Linnaeus, 1758)

Lucanidae Latreille, 1806
Lucaninae Latreille, 1806

Lucanus Scopoli, 1763
cervus (Linnaeus, 1758)

Dorcus MacLeay, 1819
parallepipededus (Linnaeus, 1758)

Platycerus Geoffroy, 1762
caprea (DeGeer, 1774)
caraboides (Linnaeus, 1758)

Syndesinae MacLeay, 1819
Ceruchus MacLeay, 1819
chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)

Sinodendron Schneider, 1791
cylindricum (Linnaeus, 1758)

SCIRTOIDEA

Clambidae Fischer von Waldheim, 1821
Clambus Fischer von Waldheim, 1821
gibbulus (LeConte, 1850)*
pubescens Redtenbacher, 1849*

Eucinetidae Lacordaire, 1857
Eucinetus Germar, 1818
haemorrhoidalis (Germar, 1818)*

Scirtidae Fleming, 1821
Microcara Thomson, 1859
testacea (Linnaeus, 1767)*

Elodes Latreille, 1796
minuta (Linnaeus, 1767)*
pseudominuta Klausnitzer, 1971

Cyphon Paykull, 1799
coarctatus Paykull, 1799*
laevipennis Tournier, 1868*
phragmiticola Nyholm, 1955
ochraceus Stephens, 1830*
padi (Linnaeus, 1758)*
punctipennis Sharp, 1873*
variabilis (Thunberg, 1787)*

Scirtes Illiger, 1807
hemisphaericus (Linnaeus, 1758)*
orbicularis (Panzer, 1793)*

DASCILLOIDEA

Dascillidae Guérin – Ménéville 1843
 (1836)
Dascillus Latreille, 1796
cervinus (Linnaeus, 1758)

ELATEROIDEA

Elateridae Leach, 1815
Agrypninae Lacordaire, 1857
Agrypnus Eschscholtz, 1829
murinus (Linnaeus, 1758)

Lacon Laporte de Castelnau, 1838
conspersus (Gyllenhal, 1808)
fasciatus (Linnaeus, 1758)
lepidopterus (Panzer, 1801)

Negastrinae Nakane, 1953
Negastris Thomson, 1859
pulchellus (Linnaeus, 1761)

Oedostethus LeConte, 1853
quadripustulatus (Fabricius, 1792)*
tenuicornis (Germar, 1824)

Denticollinae Stein et Weise, 1877 (1856)
Athous Eschscholtz, 1829
haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
subfuscus (Müller, 1764)
vittatus (Fabricius, 1792)*

Hemicrepidius Germar, 1839
Pseudathous Méquignon, 1930
hirtus (Herbst, 1784)
niger (Linnaeus, 1758)

Crepidophorus Mulsant et Guillebeau, 1853
mutilatus (Rosenhauer, 1847)
rufiventris (Eschscholtz, 1822)

Harminius Fairmaire, 1851
Diacanthous Reitter, 1905
undulatus (DeGeer, 1774)

Denticollis Piller et Mitterpacher, 1783
borealis (Paykull, 1800)
linearis (Linnaeus, 1758)

Cidnopus Thomson, 1859
Limonius Eschscholtz, 1829 (part)
aeruginosus (Olivier, 1790)
minutus (Linnaeus, 1758)

Hypnoidus Dillwyn, 1829
riparius (Fabricius, 1792)
rivularius (Gyllenhal, 1808)

Ctenicera Latreille, 1829
Corymbites Latreille, 1834
pectinicornis (Linnaeus, 1758)

Actenicerus Kiesenwetter, 1858
sjaelandicus (Müller, 1764)

- Prosternon** Latreille, 1834
tessellatum (Linnaeus, 1758)
- Anostirus** Thomson, 1859
castaneus (Linnaeus, 1758)
- Aplotarsus** Stephens, 1830
incanus (Gyllenhal, 1827)
- Selatosomus** Stephens, 1830
aeneus (Linnaeus, 1758)
*cruciatu*s (Linnaeus, 1758)
gravidus (Germar, 1843)
latus (Fabricius, 1801) nec (Fuessly, 1775)
impressus (Fabricius, 1792)
melancholicus (Fabricius, 1792)
nigricornis (Panzer, 1799)
- Eanus** LeConte, 1761
Paranomus Kiesenwetter, 1758 nec Chaudoir, 1842
costalis (Paykull, 1800)
- Elaterinae** Leach, 1815
- Ischnodes** Germar, 1844
?sibiricus Tscherepanov, 1966
- Ampedus** Dejean, 1833
balteatus (Linnaeus, 1758)
cinnabarinus (Eschscholtz, 1829)
erythrogonus (Müller, 1821)
nigrinus (Herbst, 1784)
nigroflavus (Goeze, 1777)
*pomona*e (Stephens, 1830)
pomorum (Herbst, 1784)
praeustus (Fabricius, 1792)
****sanguineus** (Linnaeus, 1758)
sanguinolentus (Schrank, 1776)
tristis (Linnaeus, 1758)
- Elater** Linnaeus, 1758
Ludius Berthold, 1827
ferrugineus Linnaeus, 1758
- Sericus** Eschscholtz, 1829
brunneus (Linnaeus, 1758)
- Melanotus** Eschscholtz, 1829
castanipes (Paykull, 1800)
- Agriotes** Eschscholtz, 1829
lineatus (Linnaeus, 1767)
obscurus (Linnaeus, 1758)
sputator (Linnaeus, 1758)
ustulatus (Schaller, 1783)
- Ectinus** Eschscholtz, 1829
aterrimus (Linnaeus, 1761)
- Dalopius** Eschscholtz, 1829
marginatus (Linnaeus, 1758)
- Adrastus** Eschscholtz, 1829
pallens (Fabricius, 1792)*
nitidulus (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1787)
- Synaptus** Eschscholtz, 1829
filiformis (Fabricius, 1781)
- Cardiophorinae** Candeze, 1859
- Cardiophorus** Eschscholtz, 1829
atramentarius Erichson, 1840*
asellus Erichson, 1840
ruficollis (Linnaeus, 1758)
rufipes (Goeze, 1777)*
vestigialis Erichson, 1840
erichsoni Bysson, 1901
- Dicronychus** Brullé, 1832
cinereus (Herbst, 1784)*
equiseti (Herbst, 1784)
- Lissominae** Laporte de Castelnau, 1840
- Drapetes** Dejean, 1821
ordelloides (Host, 1789)*
biguttatus (Piller et Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)
- Eucnemidae** Eschscholtz, 1829
- Melasinae** Fleming, 1821
- Hylochaeres** Latreille, 1834
cruentatus (Gyllenhal, 1808)*
- Otho** Lacordaire, 1857
sphondyloides (Germar, 1818)*
- Microrhagus** Dejean, 1833
Dirhagus Latreille, 1834
emyi (Rouget, 1855)*
pygmaeus (Fabricius, 1792)*
- Rhacopus** Hampe, 1855
sahlbergi (Mannerheim, 1823)*
- Eucneminae** Eschscholtz, 1829
- Eucnemis** Ahrens, 1812
capucina Ahrens, 1812*
- Throscidae** Laporte de Castelnau, 1840
- Aulonothroscus** Horn, 1890
brevicollis (Bonvouloir, 1859)*
laticollis (Rybinski, 1897)*
- Trixagus** Kugelann, 1794
Throscus Latreille, 1796
dermestoides (Linnaeus, 1767)*
- BUPRESTOIDEA**
- Buprestidae** Leach, 1815
- Buprestinae** Leach, 1815
- Chalcophora** Dejean, 1833
mariana (Linnaeus, 1758)
- Buprestis** Linnaeus, 1758
haemorrhoidalis Herbst, 1780
novemmaculata Linnaeus, 1767
octoguttata Linnaeus, 1758
rustica Linnaeus, 1758
- Dicerca** Eschscholtz, 1829
aenea (Linnaeus, 1761)
alni (Fischer von Waldheim, 1823)
amphibia Marseul, 1865*
furcata (Thunberg, 1787)
acuminata (Pallas, 1782) nec (DeGeer, 1774)
moesta (Fabricius, 1792)
- Poecilonota** Eschscholtz, 1829
Descarpentriolina Leraut, 1983
variolosa (Paykull, 1799)*
- Palmar** Shaefer, 1949
Scintillatrix Obenberger, 1956
Lampra Lacordaire, 1835 nec Hübner, 1821
mirifica (Mulsant, 1855)
rutilans (Fabricius, 1777)
- Melanophila** Eschscholtz, 1829
Oxypterus Kirby, 1837
acuminata (DeGeer, 1774)
- Phaenops** Dejean, 1833
cyanea (Fabricius, 1775)
- Anthaxia** Eschscholtz, 1829
funerula (Illiger, 1803)
quadripunctata (Linnaeus, 1758)
- Chrysobothris** Eschscholtz, 1829
affinis (Fabricius, 1794)
chrysostigma (Linnaeus, 1758)*
- Agrilinae** Laporte de Castelnau, 1835
- Agrilus** Curtis, 1825
angustulus (Illiger, 1803)*
ater (Linnaeus, 1767)
****betuleti** (Ratzeburg, 1837)
biguttatus (Fabricius, 1777)
cuprescens Ménétériés, 1832
aurichalceus Redtenbacher, 1849
cyanescens (Ratzeburg, 1837)
coeruleus (Rossi, 1790) nec (Thunberg, 1789)
integerrimus (Ratzeburg, 1837)*
- ribesii* Shaefer, 1946*
pratensis (Ratzeburg, 1837)*
robertii Chevrolat, 1838
salicis Frivaldszky, 1877*
subauratus (Gebler, 1833)*
sulcicollis Lacordaire, 1835*
viridis (Linnaeus, 1758)
ziczag Marseul, 1866
- Cylindromorphus** Kiesenwetter, 1857
pyrethri Stierlin, 1863
- Coraeus** Laporte de Castelnau et Gory, 1839
elatus (Fabricius, 1787)*
- Trachys** Fabricius, 1801
minutus (Linnaeus, 1758)
- Habroloma** Thomson, 1864
nana (Paykull, 1799)*
geranii (Silfverberg, 1977)
- CANTHAROIDEA**
- Lycidae** Laporte de Castelnau, 1836
- Erotinae** LeConte, 1881
- Dictyoptera** Latreille, 1829
aurora (Herbst, 1784)*
- Pyropterus** Mulsant, 1838
nigroruber (DeGeer, 1774)*
affinis (Paykull, 1799)
- Platycis** Thomson, 1859
minuta (Fabricius, 1787)*
nasuta (Kiesenwetter, 1874)*
- Lopheros** LeConte, 1884
rubens (Gyllenhal, 1817)*
- Calochrominae** Lacordaire, 1857
- Lygisteropterus** Dejean, 1833
sanguineus (Linnaeus, 1758)
- Lampyridae** Latreille, 1817
- Lampyrus** Geoffroy, 1762
noctiluca (Linnaeus, 1758)
- Cantharidae** Imhoff, 1856(1815)
- Cantharinae** Imhoff, 1856(1815)
- Podabrus** Westwood, 1838
alpinus (Paykull, 1798)
lapponicus (Gyllenhal, 1810)*
- Cantharis** Linnaeus, 1758
****annularis** Ménétériés, 1836
oculata Gebler, 1827 nec Thunberg, 1784
flavilabris Fallén, 1807*
fulvicollis Fabricius, 1792 nec Scopoli, 1763
fusca Linnaeus, 1758
lateralis Linnaeus, 1758*
livida Linnaeus, 1758
nigricans (Müller, 1776)*
obscura Linnaeus, 1758
pallida Goeze, 1777*
paludosa Fallén, 1807*
pellucida Fabricius, 1792
quadripunctata (Müller, 1776)*
rufa Linnaeus, 1758
rustica Fallén, 1807
?sudetica Letzner, 1847*
- Rhagonycha** Eschscholtz, 1830
atra (Linnaeus, 1767)*
elongata (Fallén, 1807)*
?femorialis (Brulle, 1832)*
fulva (Scopoli, 1763)
lignosa (Müller, 1764)*
limbata Thomson, 1864
testacea (Linnaeus, 1758)
- Silinae** Mulsant, 1862
- Silis** Charpentier, 1825
ruficollis (Fabricius, 1775)*

Malthininae Kiesenwetter, 1852
Malthinus Latreille, 1806
biguttatus (Linnaeus, 1758)*
biguttulus (Paykull, 1800)
punctatus (Geoffroy, 1785)*
flaveolus (Herbst, 1786)
Malthodes Kiesenwetter, 1852
fuscus (Waltl, 1838)*

DRYOPOIDEA

Elmidae Curtis, 1830
Potamophilus Germar, 1811
acuminatus (Fabricius, 1792)*

Dryopidae Billberg, 1820
Dryops Olivier, 1791
auriculatus (Geoffroy, 1785)*
ernesti Des Gozis, 1886*

Limnichidae Erichson, 1846
Limnichus Dejean, 1821
sericeus (Duftschmid, 1825)*

Heteroceridae MacLeay, 1825
Heterocerus Fabricius, 1792
fenestratus (Thunberg, 1784)*
fuscus Kiesenwetter, 1843*
marginatus (Fabricius, 1787)*
parallelus Gebler, 1830

BYRRHOIDEA

Byrrhidae Latreille, 1804
Byrrhinae Latreille, 1804
Morychus Erichson, 1846
aeneus (Fabricius, 1775)*

Lamprobyrrhulus Ganglbauer, 1902
nitidus (Schaller, 1783)
nitens (Panzer, 1794)

Cytilus Erichson, 1846
sericeus (Forster, 1771)*

Byrrhus Linnaeus, 1767
fasciatus (Forster, 1771)
pilula (Linnaeus, 1758)
pustulatus (Forster, 1771)

Porcinolus Mulsant et Rey, 1869
murinus (Fabricius, 1794)

Syncaliptinae Mulsant et Rey, 1869
Chaetophora Kirby et Spence, 1823
spinosa (Rossi, 1794)*

Curimopsis Ganglbauer, 1902
?setigera (Illiger, 1798)*

BOSTRICHOIDEA

Dermestidae Latreille, 1804
Dermestinae Latreille, 1804
Dermestes Linnaeus, 1758
bicolor Fabricius, 1781*
frischii Kugelann, 1792*
gyllenhalii Laporte de Castelnau, 1840*
lanarius Illiger, 1801
lardarius Linnaeus, 1758*
murinus Linnaeus, 1758*
palmi Sjöberg, 1950*
sibiricus Erichson, 1846
undulatus Brahm, 1790*

Attageninae
Laporte de Castelnau, 1840
Attagenus Latreille, 1802
schaeferi (Herbst, 1792)*
smirnovi Zhantiev, 1973*
unicolor (Brahm, 1791)

Magatominae Leach, 1815
Trogoderma Dejean, 1821
glabrum (Herbst, 1783)*

Phradonoma Jacquelin du Val, 1859
villosulum (Duftschmid, 1825)*

Reesa Beal, 1967
vespulae (Milliron, 1939)*

Globicornis Latreille, 1829
emarginata (Gyllenhal, 1808)*

Megatoma Herbst, 1792
undata (Linnaeus, 1758)*

Anthrenus Geoffroy, 1762
museorum (Linnaeus, 1761)*
picturatus Solsky, 1876*
sophulariae (Linnaeus, 1758)*

Orphilinae LeConte, 1861
Orphilus Erichson, 1846
niger (Rossi, 1790)*

Bostrichidae Latreille, 1802
Lycetinae Billberg, 1820

Lycus Fabricius, 1792
?brunneus (Stephens, 1830)* — экземп-
ляр плохой сохранности (без головы и
переднепинки)

Bostrichinae Latreille, 1802
Bostrichus Geoffroy, 1762
capucinus (Linnaeus, 1758)

Anobiidae Fleming, 1821
Anobiinae Fleming, 1821
Stegobium Motschulsky, 1860
paniceum (Linnaeus, 1758)*

Anobium Fabricius, 1775
punctatum (DeGeer, 1774)*

Cacotemnus LeConte, 1861
rufipes (Fabricius, 1792)*

Hadrobregmus Thomson, 1859
pertinax (Linnaeus, 1758)*

Priobium Motschulsky, 1845
carpini (Herbst, 1793)*

Ptilininae Shuckard, 1840
Ptilinus Geoffroy, 1762
fuscus Geoffroy, 1785*

Xyletininae Gistel, 1856
Xyletinus Latreille, 1809
ater (Creutzer, 1796)*
laticollis (Duftschmid, 1825)*
pectinatus (Fabricius, 1792)*

Dorcatominae Thomson, 1859
Dorcatoma Herbst, 1792
chrysolina Sturm, 1837*
dresdensis Herbst, 1792*
lomnickii Reitter, 1903*
minor Zahradnik, 1993*
punctulata Mulsant et Rey, 1864*
robusta Strand, 1938*
Stagetus Wollaston, 1861
Theca Mulsant et Rey, 1860 nec Morris,
1845
?borealis Israelson, 1971* (экземпляр ут-
рян)
pilulus auct. nec (Aubé, 1861)

Ptininae Latreille, 1802
Ptinus Linnaeus, 1767
raptor Sturm, 1837*
villiger Reitter, 1884*

LYMEXYLOIDEA

Lymexylidae Fleming, 1821
Hylecoetinae Gistel, 1856
Hylecoetus Latreille, 1806
Elateroides Houlbert et Bétis, 1905
dermestoides (Linnaeus, 1761)*

CLEROIDEA

Trogossitidae Latreille, 1802
Peltinae Kirby, 1837
Peltis Kugelann, 1792
Zimonia Des Gozis, 1886
grossa (Linnaeus, 1758)

Ostoma Laicharting, 1781
ferruginea (Linnaeus, 1758)

Thymalus Latreille, 1802
oblongus Reitter, 1889*

Grynocharis Thomson, 1859
oblonga (Linnaeus, 1758)*

Trogossitinae Latreille, 1802
Tenebroides Piller et Mitterpacher, 1783
mauritanicus (Linnaeus, 1758)*

Cleridae Latreille, 1802
Tillinae Leach, 1815
Tillus Olivier, 1790
elongatus (Linnaeus, 1758)*

Clerinae Latreille, 1802
Thanasimus Latreille, 1806
femorialis (Zetterstedt, 1828)*
rufipes (Brahm, 1797) nec (DeGeer, 1775)
formicarius (Linnaeus, 1758)

Trichodes Herbst, 1792
apiarius (Linnaeus, 1758)

Korynetinae Laporte de Castelnau, 1836
Necrobia Olivier, 1795
ruficollis (Fabricius, 1775)*
rufipes (DeGeer, 1775)*
violacea (Linnaeus, 1758)*

Dasytidae Laporte de Castelnau, 1840
Rhadalinae LeConte, 1861
Aplocnemus Stephens, 1830
nigricornis (Fabricius, 1792)*
tarsalis (Sahlberg, 1822)*
Semijulistus Schilsky, 1894
callosus (Solsky, 1867)*

Dasytinae Laporte de Castelnau, 1840
Dasytes Paykull, 1799
fuscus (Illiger, 1801)*
niger (Linnaeus, 1761)
obscurus Gyllenhal, 1813*

Dolichosoma Stephens, 1830
lineare (Rossi, 1792)

Malachiidae Fleming, 1821
Charopus Erichson, 1840
flavipes (Paykull, 1798)*
graminicola (Andersch in Dejean, 1833)

Ebaeus Erichson, 1840
flavicornis Erichson, 1840*
lapplandicus Evers, 1993*
pedicularius auct. nec (Linnaeus, 1758)

Nepachys Thomson, 1859
cordiacae (Linnaeus, 1761)*

Malachius Fabricius, 1775
aeneus (Linnaeus, 1758)
bipustulatus (Linnaeus, 1758)

Cordylepherus Evers, 1985
viridis (Fabricius, 1787)

Anthocomus Erichson, 1840
equestris (Fabricius, 1781)*
bipunctatus (Harrer, 1784)

Apalochrus Erichson, 1840
Paratinus Abeille de Perrin, 1891
femoralis Erichson, 1840*

CUCUJOIDEA

Brachypteridae Erichson, 1845
(**Kateretidae** Erichson, 1846)

Kateretes Herbst, 1793
pedicularius (Linnaeus, 1758)*
pusillus (Thunberg, 1794)*

Heterhelus Jacquelin du Val, 1858
scutellaris (Heer, 1841)*
solani (Heer, 1841)*

Brachypterus Kugelann, 1794
fulvipes Erichson, 1843*

Nitidulidae Latreille, 1802

Carpophilinae Erichson, 1843

Carpophilus Stephens, 1830
marginellus Motschulsky, 1858*
pilosellus Motschulsky, 1858*

Epuraea Erichson, 1843
aestiva (Linnaeus, 1758)*
depressa (Illiger, 1798)
biguttata (Thunberg, 1784)*
boreella (Zetterstedt, 1828)*
contractula J. Sahlberg, 1889*
distincta (Grimmer, 1841)*
guttata (Olivier, 1811)*
limbata (Fabricius, 1787)*
marseuli Reitter, 1872*
melina Erichson, 1843*
neglecta (Heer, 1841)*
pallescens (Stephens, 1832)*
florea Erichson, 1845
silacea (Herbst, 1784)*
deleta Erichson, 1843
terminalis (Mannerheim, 1843)*
adumbrata Mannerheim, 1852
tenenbaumi Sjöberg, 1839
unicolor (Olivier, 1790)*
variegata (Herbst, 1793)*

Meligethinae Thomson, 1859

Meligethes Stephens, 1830
aeneus (Fabricius, 1775)*
denticulatus (Heer, 1841)*
flavimanus Stephens, 1830*
pedicularius (Gyllenhal, 1808)*
subrugosus (Gyllenhal, 1808)*

Nitidulinae Latreille, 1802

Omosita Erichson, 1843
colon (Linnaeus, 1758)*
depressa (Linnaeus, 1758)*

Nitidula Fabricius, 1775
bipunctata (Linnaeus, 1758)*
carnaria (Schaller, 1783)*
rufipes (Linnaeus, 1767)*

Soronia Erichson, 1843
grisea (Linnaeus, 1758)*
punctatissima (Illiger, 1794)*

Ipidia Erichson, 1843
binotata Reitter, 1875*

Pocadius Erichson, 1843
ferrugineus (Fabricius, 1775)*

Cyllodes Erichson, 1843
ater (Herbst, 1792)*

Cychramus Kugelann, 1794
luteus (Fabricius, 1787)*
variegatus (Herbst, 1792)*

Cryptarchinae Thomson, 1859

Cryptarcha Shuckard, 1839
strigata (Fabricius, 1787)*
undata (Olivier, 1790)*
imperialis (Fabricius, 1794)

Glischrochilus Reitter, 1873
grandis (Tournier, 1872)*
latefasciatus (Reitter, 1883)
hortensis (Geoffroy, 1785)*
quadriguttatus (Fabricius, 1777)*
quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

Cybocephalinae

Jacquelin du Val, 1858

Cybocephalus Erichson, 1844
politus (Gyllenhal, 1813)*

Sphindidae Jacquelin du Val, 1860

Sphindus Megerle, 1821
dubius (Gyllenhal, 1808)*

Aspidiphorus Ziegler, 1821
orbiculatus (Gyllenhal, 1808)*

Monotomidae

Laporte de Castelnau, 1840

Rhizophaginae Redtenbacher, 1845

Rhizophagus Herbst, 1793
bipustulatus (Fabricius, 1792)*
depressus (Fabricius, 1792)*
dispar (Paykull, 1800)*
parvulus (Paykull, 1800)*
picipes (Olivier, 1790)*

Monotominae

Laporte de Castelnau, 1840

Monotoma Herbst, 1793
angusticollis (Gyllenhal, 1827)*
brevicollis Aubé, 1837*
conicicollis Aubé, 1837*
longicollis (Gyllenhal, 1827)*
picipes Herbst, 1793*

Silvanidae Kirby, 1837

Silvaninae Kirby, 1837

Ahasverus Des Gozis, 1881
advena (Waltl, 1834)*

Oryzaephilus Ganglbauer, 1899
surinamensis (Linnaeus, 1758)*

Silvanus Latreille, 1807
bidentatus (Fabricius, 1792)*
unidentatus (Olivier, 1790)*

Brontinae Erichson, 1845

Psammoeocus Latreille, 1829
bipunctatus (Fabricius, 1792)*

Uleiota Latreille, 1796
planata (Linnaeus, 1761)*

Dendrophagus Schönherr, 1809
crenatus (Paykull, 1799)*

Cucujidae Latreille, 1802

Cucujinae Latreille, 1802

Cucujus Fabricius, 1775
cinnaberinus (Scopoli, 1763)*
haematodes Erichson, 1845*

Laemophloeidae Ganglbauer, 1899

Laemophloeus Dejean, 1835
monilis (Fabricius, 1787)
muticus (Fabricius, 1781)*

Cryptolestes Ganglbauer, 1899
ferrugineus (Stephens, 1831)*

Leptophloeus Casey, 1916
alternans (Erichson, 1846)*

Phalacridae Leach, 1815

Phalacrinae Leach, 1815

Phalacrus Paykull, 1800
coruscus (Panzer, 1797)*
fimetiarius auct. nec (Fabricius, 1775)
dieckmanni Vogt, 1967*
grossus auct. nec Erichson, 1845
nigrinus (Marsham, 1802)*
caricis Sturm, 1807
substriatus Gyllenhal, 1813*

Olibrus Erichson, 1845
aeneus (Fabricius, 1792)*
affinis (Sturm, 1807)*
bimaculatus Küster, 1848*
millefolii (Paykull, 1800)*
pygmaeus (Sturm, 1807)*
Stilbus Seidlitz, 1872
?testaceus (Panzer, 1797)*

Cryptophagidae Kirby, 1837

Cryptophaginae Kirby, 1837

Telmatophilus Heer, 1841
caricis (Olivier, 1790)*
typhae (Fallén, 1802)*

Paramecosoma Curtis, 1833
melanocephalum (Herbst, 1793)*

Henoticus Thomson, 1868
serratus (Gyllenhal, 1808)*

Pteryngium Reitter, 1887
crenatum (Fabricius, 1798)*

Micrambe Thomson, 1863
abietis (Paykull, 1798)*

Cryptophagus Herbst, 1792
acutangulus Gyllenhal, 1827*
cellaris (Scopoli, 1763)*
confusus Bruce, 1934*
dorsalis Sahlberg, 1819*
pilosus Gyllenhal, 1827*
pseudodentatus Bruce, 1934*
sagrinatus Sturm, 1845*
setulosus Sturm, 1845*

Antherophagus Dejean, 1821
canescens Grouvelle, 1916*
nigricornis (Fabricius, 1787)*
pallens (Linnaeus, 1758)*

Atomariinae LeConte, 1861

Atomaria Stephens, 1830
analisis Erichson, 1846*
apicalis Erichson, 1846*
atra (Herbst, 1793)*
atrata Reitter, 1875*
barani Brisout de Barneville, 1863*
basalis Erichson, 1846*
fuscata (Schönherr, 1808)*
lewisi Reitter, 1877*
linearis Stephens, 1830*
mongolica Johnson, 1970*
nigrirostris Stephens, 1830*
fuscicollis Mannerheim, 1852
pulchra Erichson, 1846*
pusilla (Paykull, 1798)*
testacea Stephens, 1830*
zetterstedti (Zetterstedt, 1838)*
wollastoni Sharp, 1867*

Erotylidae Latreille, 1802

Xenoscelinae Ganglbauer, 1899

Zavaljus Reitter, 1880
Eicolycus J. Sahlberg, 1919
brunneus (Gyllenhal, 1808)*
fausti Reitter, 1880

Erotylinae Latreille, 1802

Tritoma Fabricius, 1775
bipustulata Fabricius, 1775*
subbasalis (Reitter, 1896)*

Triplax Herbst, 1793
aenea (Schaller, 1783)*
collaris (Schaller, 1783)*
rufipes (Fabricius, 1781)*
russica (Linnaeus, 1758)*
scutellaris Charpentier, 1825*
Dacne Latreille, 1796
bipustulata (Thunberg, 1781)*

Biphylidae Sharp, 1900
Diplocoelus Guérin-Ménéville, 1844
fagi Guérin-Ménéville, 1844

Byturidae Jacquelin du Val, 1858
Byturus Latreille, 1796
ochraceus (Scriba, 1791)*
aestivus auct. nec (Linnaeus, 1758)
tomentosus (DeGeer, 1774)

Cerylonidae Billberg, 1820
Cerylon Latreille, 1802
fagi Brisout de Barneville, 1867*
ferrugineum Stephens, 1830*
histeroides (Fabricius, 1792)*

Bothrideridae Erichson, 1845
Bothriderinae Erichson, 1845
Bothrideres Dejean, 1835
contractus (Geoffroy, 1785)*

Endomychidae Leach, 1815
Leiestinae Thomson, 1863
Leiestes Chevrolat, 1837
seminigra (Gyllenhal, 1808)

Endomychinae Leach, 1815
Endomychus Panzer, 1795
coccineus (Linnaeus, 1758)

Lycoperdininae Redtenbacher, 1844
Mycetina Mulsant, 1846
cruciata (Schaller, 1783)

Lycoperdina Latreille, 1807
succincta (Linnaeus, 1767)

Dapsa Latreille, 1829
horvathi Csiki, 1901*

Coccinellidae Latreille, 1807
Epilachninae Mulsant, 1846
Subcoccinella Agassiz, 1846
vigintiquatuor punctata (Linnaeus, 1758)

Coccidulinae Mulsant, 1846
Coccidula Kugelann, 1798
rufa (Herbst, 1783)*
scutellata (Herbst, 1783)*

Scymninae Mulsant, 1846
Scymnus Kugelann, 1794
abietis (Paykull, 1798)*
auritus Thunberg, 1795*
femorialis (Gyllenhal, 1827)*
ferrugatus (Moll, 1785)*
frontalis (Fabricius, 1787)*
haemorrhoidalis Herbst, 1797
suturalis Thunberg, 1795*

Nephus Mulsant, 1846
bipunctatus (Kugelann, 1794)*
redtenbacheri (Mulsant, 1846)*

Stethorus Weise, 1885
punctillum (Weise, 1891)*

Hyperaspis Chevrolat, 1837
pseudopustulata Mulsant, 1853*
reppensis auct. nec (Herbst, 1783)

Chilocorinae Mulsant, 1846
Platynaspis Redtenbacher, 1843
luteorubra (Goeze, 1777)*
Chilocorus Leach, 1815
bipustulatus (Linnaeus, 1758)*
renipustulatus (Scriba, 1790)*
Exochomus Redtenbacher, 1843
quadripustulatus (Linnaeus, 1758)

Coccinellinae Latreille, 1807
Coccinula Dobzhansky, 1925
quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)
Anisosticta Chevrolat, 1837
novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Bulaea Mulsant, 1850
lichatschovii (Hummel, 1827)

Sospita Mulsant, 1846
vigintiguttata (Linnaeus, 1758)

Myzia Mulsant, 1846
oblongoguttata (Linnaeus, 1758)

Myrrha Mulsant, 1846
octodecimguttata (Linnaeus, 1758)*

Propylea Mulsant, 1846
quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Calvia Mulsant, 1846
decemguttata (Linnaeus, 1767)
quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
quindecimguttata (Fabricius, 1777)*

Anatis Mulsant, 1846
ocellata (Linnaeus, 1758)

Hippodamia Chevrolat, 1837
Adonia Mulsant, 1846
Semiadalia Crotch, 1874
notata (Laicharting, 1781)
septemmaculata (DeGeer, 1775)*
tredecimpunctata (Linnaeus, 1758)
undecimnotata (Schneider, 1792)*
variegata (Goeze, 1777)

Coccinella Linnaeus, 1758
hieroglyphica Linnaeus, 1758*
quinquepunctata Linnaeus, 1758
septempunctata Linnaeus, 1758
trifasciata Linnaeus, 1758

Oenopia Mulsant, 1850
Synharmonia Ganglbauer, 1899
conglobata Linnaeus, 1758

Adalia Mulsant, 1850
bipunctata (Linnaeus, 1758)
conglomerata (Linnaeus, 1758)
decempunctata (Linnaeus, 1758)

Harmonia Mulsant, 1846
quadripunctata (Pontoppidan, 1763)*

Halyzia Mulsant, 1846
sedecimguttata (Linnaeus, 1758)*

Psyllobora Chevrolat, 1837
Thea Mulsant, 1846
vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)

Tythaspis Crotch, 1874
lineola (Gebler, 1843)
sedecimpunctata (Linnaeus, 1761)*

Corylophidae LeConte, 1852
Parmulinae Poey, 1854

Arthrolips Wollaston, 1854
obscura (Sahlberg, 1833)*

Sericoderinae Matthews, 1888
Sericoderus Stephens, 1829
lateralis (Gyllenhal, 1827)*

Orthoperinae Jacquelin du Val, 1859
Orthoperus Stephens, 1829
brunnipes (Gyllenhal, 1808)*
corticalis (Redtenbacher, 1849)*
improvisus Bruce, 1946
rogeri Kraatz, 1874*
punctulatus Reitter, 1876

Latridiidae Erichson, 1842
Latridiinae Erichson, 1842

Latridius Herbst, 1793
brevicollis (Thomson, 1868)*
consimilis Mannerheim, 1844*
minutus (Linnaeus, 1767)*

Enicmus Thomson, 1859
alutaceus Reitter, 1885*
histrion Joy et Tomlin, 1903*
rugosus (Herbst, 1793)*
transversus (Olivier, 1790)*

Stephostethus LeConte, 1878
Latridius auct. nec Herbst, 1793
lardarius (DeGeer, 1775)*
pandellei (Brisout de Barneville, 1863)*
variolosus (Mannerheim, 1844)*

Cartodere Thomson, 1859
constricta (Gyllenhal, 1827)*

Corticaria Marsham, 1802
ferruginea Marsham, 1802*
impressa (Olivier, 1790)*
lapponica (Zetterstedt, 1838)*
longicollis (Zetterstedt, 1838)*
pubescens (Gyllenhal, 1827)*
serrata (Paykull, 1798)*

Corticicaria Johnson, 1975
gibbosa (Herbst, 1793)*

Corticarina Reitter, 1880
fuscata (Gyllenhal, 1827)*
latipennis (J. Sahlberg, 1871)*
truncatella (Mannerheim, 1844)*

Melanophthalma Motschulsky, 1866
curticollis (Mannerheim, 1844)*
distinguenda (Comolli, 1837)*

TENEBRIONOIDEA

Ciidae Leach, 1819
Ciinae Leach, 1819

Cis Latreille, 1796
boleti (Scopoli, 1763)*
comptus Gyllenhal, 1827*
fissicornis Mellié, 1848*
glabratus Mellié, 1848*
hispidus (Paykull, 1798)*
jacquemartii Mellié, 1848*

Orthocis Casey, 1898
alni (Gyllenhal, 1813)*

Sulcaxis Dury, 1917
affinis (Gyllenhal, 1827)*
bidentulus (Rosenhauer, 1847)*
fronticornis (Panzer, 1809)*

Ropalodontus Mellié, 1847
strandi Lohse, 1969*

Xylographus Mellié, 1847
tomicooides Reitter, 1902*

Ocotemnus Mellié, 1847
glabriculus (Gyllenhal, 1827)*

Mycetophagidae Leach, 1815
Litargus Erichson, 1846
connexus (Geoffroy, 1785)*

Mycetophagus Fabricius, 1792
ater (Reitter, 1879)*

- decempunctatus* Fabricius, 1801*
fulvicollis Fabricius, 1792*
multipunctatus Fabricius, 1792*
piceus (Fabricius, 1777)*
quadriguttatus Müller, 1821*
quadripustulatus (Linnaeus, 1761)*
salicis Brisout de Barneville, 1862*
tschitscherini (Reitter, 1897)
Typhaea Stephens, 1829
haagi Reitter, 1874*
decipiens Lohse, 1989
stercorea (Linnaeus, 1758)*
- Tetratomidae** Billberg, 1820
Tetratominae Billberg, 1820
Tetratoma Fabricius, 1790
ancora Fabricius, 1790*
- Hallomeninae** Mulsant, 1856
Hallomenus Panzer, 1794
axillaris (Illiger, 1807)*
binotatus (Quensel, 1790)*
- Melandryidae** Leach, 1815
Melandryinae Leach, 1815
Orchesia Latreille, 1807
fasciata (Illiger, 1798)*
fusiformis Solsky, 1871*
minor Walker, 1837*
- Abdera** Stephens, 1832
affinis (Paykull, 1799)*
- Dicraea** Fabricius, 1798
quadiguttata (Paykull, 1798)
- Phloiotrya** Stephens, 1832
subtilis (Reitter, 1897)*
- Xylita** Paykull, 1798
laevigata (Hellenius, 1786)*
- Serropalpus** Hellenius, 1786
barbatus (Schaller, 1783)
- Melandrya** Fabricius, 1801
dubia (Schaller, 1783)*
- Anaspididae** Mulsant, 1856
Cyrtanaspis Emery, 1876
phalerata (Germar, 1831)*
- Anaspis** Geoffroy, 1762
arctica Zetterstedt, 1828*
frontalis (Linnaeus, 1758)*
labiata (Costa, 1854)*
marginicollis Lindberg, 1925*
schilskyana Čsiki, 1915 — infrasubsp.
- Scraptiidae** Mulsant, 1856
Scraptia Latreille, 1807
fuscula Müller, 1821*
innata (Kangas, 1959)
- Mordellidae** Latreille, 1802
Mordellinae Latreille, 1802
Tomoxia Costa, 1854
bucephala Costa, 1854*
biguttata (Gyllenhal, 1827) nec (Rossi, 1794)
Variimorda Méquignon, 1946
villosa (Schrank, 1781)
fasciata (Fabricius, 1775) nec (Forster, 1771)
- Mordella** Linnaeus, 1758
aculeata Linnaeus, 1758*
brachyura Mulsant, 1856*
- Hoshihananomia** Kôno, 1935
perlata (Sulzer, 1776)*
- Curtimorda** Méquignon, 1946
maculosa (Naezen, 1794)*
- Mordellaria** Ermisch, 1950
aurofasciata (Comolli, 1837)*
- Mordellistena** Costa, 1854
acuticollis Schilsky, 1895*
bicoloripilosa Ermisch, 1967*
brevicauda (Boheman, 1849)*
humeralis (Linnaeus, 1758)*
parvula (Gyllenhal, 1827)*
pumila (Gyllenhal, 1810)
variegata (Fabricius, 1798)*
- Mordellochroa** Emery, 1876
abdominalis (Fabricius, 1775)*
- Rhipiphoridae**
Laporte de Castelnau, 1840
Pelecotominae Seidlitz, 1875
Pelecotoma Fischer von Waldheim, 1809
fennica (Paykull, 1799)*
- Colydiidae** Erichson, 1842
Colydiinae Erichson, 1842
Synchita Hellwig, 1792
humeralis (Fabricius, 1792)*
- Bitoma** Herbst, 1793
crenata (Fabricius, 1775)*
- Orthocerus** Latreille, 1796
clavicornis (Linnaeus, 1758)*
- Tenebrionidae** Latreille, 1802
Diaperinae Latreille, 1802
Corticeus Piller et Mitterpacher, 1783
bicolor (Olivier, 1790)*
fraxini (Kugelann, 1794)*
linearis (Fabricius, 1790)*
suturalis (Paykull, 1800)*
- Bolitophagus** Illiger, 1798
reticulatus (Linnaeus, 1767)*
- Eledona** Latreille, 1796
agricola (Herbst, 1783)*
- Crypticus** Latreille, 1816
quisquilius (Linnaeus, 1761)*
- Neomida** Dahl, 1823
Oplocephala Laporte de Castelnau et Brullé, 1831
haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)*
- Scaphidema** Redtenbacher, 1849
metallicum (Fabricius, 1792)*
- Platydemia** Laporte de Castelnau et Brullé, 1831
dejeanii Laporte de Castelnau et Brullé, 1831*
- Alphitophagus** Stephens, 1832
bifasciatus (Say, 1823)*
- Pentaphyllus** Dejean, 1821
testaceus (Hellwig, 1792)*
- Diaperis** Geoffroy, 1762
boleti (Linnaeus, 1758)
- Tenebrioninae** Latreille, 1802
Oodescelis Motschulsky, 1845
polita (Sturm, 1807)
- Opatrum** Fabricius, 1775
***riparium* Scriba, 1865
sabulosum (Linnaeus, 1761)
- Melanimon** Steven, 1829
tibialis (Fabricius, 1781)
- Palorus** Mulsant, 1854
depressus (Fabricius, 1790)*
- Tribolium** MacLeay, 1825
confusum Jacquelin du Val, 1863*
- destructor* Uyttenboogart, 1934*
***madens* (Charpentier, 1825)
- Alphitobius** Stephens, 1829
diaperinus (Panzer, 1797)*
- Uloma** Dejean, 1821
culinaris (Linnaeus, 1758)*
rufa (Piller et Mitterpacher, 1783)*
perroudii Mulsant et Guillebeau, 1855
- Bius** Dejean, 1834
thoracicus (Fabricius, 1792)*
- Tenebrio** Linnaeus, 1758
molitor Linnaeus, 1758
obscurus Fabricius, 1792*
- Neatus** LeConte, 1862
picipes (Herbst, 1797)
- Nalassus** Mulsant, 1854
brevicollis (Krynicky, 1832)
gilvipes (Ménétriés, 1849)
- Coelometopinae** Lacordaire, 1859
Upis Fabricius, 1792
ceramboides (Linnaeus, 1758)
- Myrmexichxeninae**
Jacquelin du Val, 1858
Myrmexichxenus Chevrolat, 1835
subterraneus Chevrolat, 1835*
- Alleculinae** Laporte de Castelnau, 1840
Hymenophorus Mulsant, 1851
doublieri Mulsant, 1851*
- Prionychus** Solier, 1835
ater (Fabricius, 1775)
- Pseudocistela** Crotch, 1873
ceramboides (Linnaeus, 1758)
- Isomira** Mulsant, 1856
murina (Linnaeus, 1758)*
- Mycetochara** Berthold, 1827
axillaris (Paykull, 1799)*
flavipes (Fabricius, 1792)*
obscura (Zetterstedt, 1838)*
- Cteniopus** Solier, 1835
sulphureus (Linnaeus, 1758)*
flavus (Scopoli, 1763)
- Lagriinae** Latreille, 1825 (1820)
Lagria Fabricius, 1775
hirta (Linnaeus, 1758)
- Luprops** Hope, 1833
curticollis (Fairmaire, 1896)* (завоз)
- Oedemeridae** Latreille, 1810
Calopodinae Costa, 1852
Calopus Fabricius, 1775
serraticornis (Linnaeus, 1758)
- Oedemerinae** Latreille, 1810
Ditylus Fischer von Waldheim, 1817
laevis (Fabricius, 1787)*
- Chrysanthia** Schmidt, 1844
geniculata Heyden, 1877*
nigricornis (Westhoff, 1881)
viridis Schmidt, 1846 nec (DeGeer, 1775)
viridissima (Linnaeus, 1758)*
viridis (DeGeer, 1775)
- Anogcodes** Dejean, 1834
ustulatus (Scopoli, 1763)*
- Oedemera** Olivier, 1789
croceicollis (Gyllenhal, 1827)*
femorata (Scopoli, 1763)*
flavescens (Linnaeus, 1767)
flavipes (Fabricius, 1792)*

lurida (Marsham, 1802)
podagrariae (Linnaeus, 1767)*
virescens (Linnaeus, 1767)*

Stenotrachelidae Thomson, 1859
Scotodes Eschscholtz, 1818
annulatus Eschscholtz, 1818*

Meloidae Gyllenhal, 1810
Meloinae Gyllenhal, 1810

Mylabris Fabricius, 1775
pusilla Olivier, 1811
sibirica Fischer von Waldheim, 1824

Lytta Fabricius, 1775
vesicatoria (Linnaeus, 1758)

Cerocoma Geoffroy, 1762
schaefferi (Linnaeus, 1758)*

Alosimus Mulsant, 1857
syriacus (Linnaeus, 1758)

Meloe Linnaeus, 1758
brevicollis Panzer, 1793*
proscarabaeus Linnaeus, 1758
reitteri Escherich, 1889
violaceus Marsham, 1802

Pythidae Solier, 1834
Pytho Latreille, 1796
depressus (Linnaeus, 1767)

Pyrochroidae Latreille, 1807
Pyrochroa Geoffroy, 1762
coccinea (Linnaeus, 1761)*

Schizotus Newman, 1838
pectinicornis (Linnaeus, 1758)*

Boridae Thomson, 1859
Boros Herbst, 1797
schneideri (Panzer, 1795)*

Salpingidae Leach, 1815
Salpinginae Leach, 1815
Lissodema Curtis, 1833
cursor (Gyllenhal, 1813)*

Sphaeriestes Stephens, 1829
Salpingus auct. nec Illiger, 1801
bimaculatus (Gyllenhal, 1810)*

Salpingus Illiger, 1801
Rhinosimus Latreille, 1802
ruficollis (Linnaeus, 1761)*

Anthicidae Latreille, 1819
Steropinae Jacquelin du Val, 1863
Steropes Steven, 1806
caspius Steven, 1806*

Anthicinae Latreille, 1819
Notoxus Geoffroy, 1764
brachycerus (Faldermann, 1837)*
monoceros (Linnaeus, 1761)*
trifasciatus Rossi, 1792*

Anthicus Paykull, 1798
antherinus (Linnaeus, 1761)
ater (Panzer, 1797)*
axillaris Schmidt, 1842*
bimaculatus (Illiger, 1801)*
flavipes (Panzer, 1797)*

Omonadus Mulsant et Rey, 1866
floralis (Linnaeus, 1758)*
kolenatii (Kolenati, 1846)*
bifasciatus (Rossi, 1792) nec (Fabricius, 1792)

Cordicollis Marseul, 1879
Cordicomus Pic, 1894
medius (Pic, 1905)*
sellatus (Panzer, 1797)*

Hirticomus Pic, 1894
hispidus (Rossi, 1792)*

Stricticollis Marseul, 1879
Stricticomus Pic, 1894
longicollis (Schmidt, 1842)*

Aderidae Winkler, 1927
Phytobaenus F. Sahlberg, 1834
amabilis F. Sahlberg, 1834*
Aderus Stephens, 1829
Hylophilus Berthold, 1827 nec Temminck, 1822
populneus (Creutzer, 1796)*

Euglenes Westwood, 1830
pygmaeus (DeGeer, 1775)*

Anidorus Mulsant et Rey, 1866
nigrinus (Germar, 1831)*

CHRYSOMELOIDEA

Chrysolmelidae Latreille, 1802
Donaciinae Kirby, 1837

Donacia Fabricius, 1775
antiqua Kunze, 1818
aquatica (Linnaeus, 1758)
bicolor Zschach, 1788*
brevicornis Ahrens, 1810
brevitarsis Thomson, 1884
cinerea Herbst, 1784*
clavipes Fabricius, 1792*
crassipes Fabricius, 1775
dentata Hoppe, 1795*
impressa Paykull, 1799
marginata Hoppe, 1795
semicuprea Panzer, 1796*
simplex Fabricius, 1775*
thalassina Germar, 1811
tomentosa Ahrens, 1810*
vulgaris Zschach, 1788*

Plateumaris Thomson, 1859
affinis (Kunze, 1818)*
braccata (Scopoli, 1772)*
discolor (Herbst, 1795)
rustica (Kunze, 1818)*
sericea (Linnaeus, 1758)*
weisei (Duvivier, 1885)

Criocerinae Latreille, 1807
Criocerus Geoffroy, 1762
duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)*
quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763)*
quinquepunctata (Scopoli, 1763)

Liliocerus Reitter, 1912
lilii (Scopoli, 1763)*
merdigera (Linnaeus, 1758)*

Lema Fabricius, 1798
cyanella (Linnaeus, 1758)*

Oulema Des Gozis, 1886
erichsonii (Suffrian, 1841)
obscura (Stephens, 1831)*
gallaeciana (Heyden, 1870)
lichenis (Weise, 1881)
melanopus (Linnaeus, 1758)

Orsodacninae Thomson, 1859
Orsodacne Latreille, 1802
cerasi (Linnaeus, 1758)

Synetinae Edwards, 1953
Syneta Dejean, 1837
betulae (Fabricius, 1792)

Zeugophorinae
Böving et Craighead, 1931
Zeugophora Kunze, 1818
subspinosa (Fabricius, 1781)*

Clytrinae Kirby, 1837
Labidostomis Germar, 1817
humeralis (Schneider, 1792)*
lepida Lefèvre, 1872*
longimana (Linnaeus, 1761)
tridentata (Linnaeus, 1758)*

Clytra Laicharting, 1781
quadripunctata (Linnaeus, 1758)
laeviuscula Ratzeburg, 1837

Smaragdina Chevrolat, 1837
Gynandrophthalma Lacordaire, 1848
affinis (Illiger, 1794)*
salicina (Scopoli, 1763)*
cyanea (Fabricius, 1775)
flavicollis (Charpentier, 1825)*

Coptocephala Chevrolat, 1837
unifasciata (Scopoli, 1763)*

Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813
Pachybrachis Chevrolat, 1837
fimbriolatus (Suffrian, 1848)*
hieroglyphicus (Laicharting, 1781)

Cryptocephalus Geoffroy, 1762
aureolus Suffrian, 1847*
bameuli Duhaldeborde, 1999*
biguttatus (Scopoli, 1763)
bilineatus (Linnaeus, 1767)*
bipunctatus (Linnaeus, 1758)
caerulescens Sahlberg, 1839*
cordiger (Linnaeus, 1758)*
coryli (Linnaeus, 1758)*
cruciger Helén, 1922*
decemmaculatus (Linnaeus, 1758)*
distinguendus Schneider, 1792*
exiguus Schneider, 1792
***flavicollis* Fabricius, 1781
flavipes Fabricius, 1781
frontalis Marsham, 1802
fulvus (Goeze, 1777)*
labiatus (Linnaeus, 1761)*
laetus Fabricius, 1792*
moraie (Linnaeus, 1758)
nitidulus Fabricius, 1787*
nitidus (Linnaeus, 1758)
ocellatus Drapiez, 1819
anticus Suffrian, 1848
octacosmus Bedel, 1891
octopunctatus (Scopoli, 1763)
pallifrons Gyllenhal, 1813
parvulus Müller, 1776*
pini (Linnaeus, 1758)
punctiger Paykull, 1799*
pusillus Fabricius, 1777*
quadriguttatus Richter, 1820
querceti Suffrian, 1848
quinquepunctatus (Scopoli, 1763)
signatus Laicharting, 1781
sericeus (Linnaeus, 1758)
sexpunctatus (Linnaeus, 1758)
solivagus Leonardi et Sassi, 2001*
hypochoeridis auct. nec (Linnaeus, 1758)
***violaceus* Laicharting, 1781

Eumolpinae Hope, 1840
Pachnephorus Chevrolat, 1873
tessellatus (Duftschmid, 1825)*
Bromius Chevrolat, 1837
Adoxus Kirby, 1837
obscurus (Linnaeus, 1758)

Chrysolmelinae Latreille, 1802
Timarcha Latreille, 1829
***goettingensis* (Linnaeus, 1758)
coriaria (Laicharting, 1781)

Leptinotarsa Chevrolat, 1837
decemlineata (Say, 1824)

- Chrysolina** Motschulsky, 1860
Dlochrysa Motschulsky, 1860
analis (Linnaeus, 1767)*
aurichalcea (Mannerheim, 1825)*
fastuosa (Scopoli, 1763)
geminata (Paykull, 1799)*
graminis (Linnaeus, 1758)*
gypsophilae (Küster, 1845)
herbacea (Duftschmid, 1825)*
menthastri (Suffrian, 1851)
limbata (Fabricius, 1775)
marginata (Linnaeus, 1758)*
polita (Linnaeus, 1758)
reitteri (Weise, 1884)
lurida (Linnaeus, 1767) nec (Scopoli, 1763)
sanguinolenta (Linnaeus, 1758)
staphylaea (Linnaeus, 1758)
sturmi (Westhoff, 1882)
diversipes (Bedel, 1892)
violacea auct. nec (Müller, 1776)
susterae Bechyne, 1950*
morio (Krynicky, 1832) nec (Fabricius, 1787)
varians (Schaller, 1783)*
- Colaphellus** Weise, 1916
hoeftii (Ménétriés, 1832)
- Gastrophysa** Chevrolat, 1837
polygona (Linnaeus, 1758)
viridula (DeGeer, 1775)
- Entomoscelis** Chevrolat, 1837
adonidis (Pallas, 1771)
suturalis Weise, 1882
- Phaedon** Megerle, 1823
armoraciae (Linnaeus, 1758)*
cochleariae (Fabricius, 1792)
laevigatus (Duftschmid, 1825)
- Hydrothassa** Thomson, 1859
glabra (Herbst, 1783)*
hannoveriana (Fabricius, 1775)
marginella (Linnaeus, 1758)*
- Prasocuris** Latreille, 1802
phellandrii (Linnaeus, 1758)*
- Plagioderia** Chevrolat, 1837
versicolora (Laicharting, 1781)
- Chrysomela** Linnaeus, 1758
Melasoma Stephens, 1831 (part.)
collaris Linnaeus, 1758*
cuprea Fabricius, 1775
lapponica Linnaeus, 1758
populi Linnaeus, 1758
saliceti (Weise, 1884)
tremula Fabricius, 1787*
vigintipunctata (Scopoli, 1763)
- Plagiosterna** Motschulsky, 1860
Linacidea Motschulsky, 1860
aenea (Linnaeus, 1758)
- Gonioctena** Chevrolat, 1837
Phytodecta Kirby, 1837
decemnotata (Marsham, 1802)*
rufipes (Degeer, 1775) nec (Linnaeus, 1758)
linnaeana (Schrank, 1781)
pallida (Linnaeus, 1758)*
sibirica (Weise, 1893)
quinquepunctata (Fabricius, 1787)*
viminalis (Linnaeus, 1758)
- Phratora** Chevrolat, 1837
Phyllodecta Kirby, 1837
atrovirens (Cornelius, 1857)
vitellinae (Linnaeus, 1758)
vulgatissima (Linnaeus, 1758)
- Galerucinae** Latreille, 1802
Galerucella Crotch, 1837
calmariensis (Linnaeus, 1767)*
griseescens (Joannis, 1865)*
- lineola* (Fabricius, 1781)*
nymphaeae (Linnaeus, 1758)*
tenella (Linnaeus, 1761)*
sagittariae (Gyllenhal, 1813)*
- Pyrrhalta** Joannis, 1865
viburni (Paykull, 1799)*
- Lochmaea** Weise, 1883
caprea (Linnaeus, 1758)
- Galeruca** Geoffroy, 1762
dahlia (Joannis, 1866)
interrupta Illiger, 1802*
laticollis Sahlberg, 1838*
pomonae (Scopoli, 1763)
tanacetii (Linnaeus, 1758)
- Agelastica** Chevrolat, 1837
alni (Linnaeus, 1758)
- Phyllobrotica** Chevrolat, 1837
quadrinaculata (Linnaeus, 1758)*
- Calomicrus** Dillwyn, 1829
pinicola (Duftschmid, 1825)
- Luperus** Geoffroy, 1762
flavipes (Linnaeus, 1758)*
- Exosoma** Jacoby, 1903
collare (Hummel, 1825)*
- Alticinae** Newman, 1834
Phyllotreta Chevrolat, 1837
armoraciae (Koch, 1803)*
atra (Fabricius, 1775)*
diademata Foudras, 1860*
exclamationis (Thunberg, 1784)*
flexuosa (Illiger, 1794)*
nemorum (Linnaeus, 1758)
nigripes (Fabricius, 1775)
ochripes (Curtis, 1837)*
striolata (Fabricius, 1803)
vittata auct. nec (Fabricius, 1775)
tetrastigma (Comolli, 1837)*
undulata Kutschera, 1860
vittula (Redtenbacher, 1849)
- Aphthona** Chevrolat, 1837
czwalinae Weise, 1888*
erichsoni (Zetterstedt, 1838)
euphorbiae (Schrank, 1781)
flaviceps Allard, 1859
lutescens (Gyllenhal, 1813)*
nonstriata (Goeze, 1777)*
pallida (Bach, 1856)*
- Longitarsus** Berthold, 1827
alfierii ssp. *furthi* Gruев, 1982*
apicalis (Beck, 1817)*
brunneus (Duftschmid, 1825)*
flavicornis (Stephens, 1831)*
holsaticus (Linnaeus, 1758)*
longiseta Weise, 1889*
luridus (Scopoli, 1763)*
medvedevi Shapiro, 1956
melanocephalus (DeGeer, 1775)*
membranaceus (Foudras, 1860)*
nasturtii (Fabricius, 1792)*
parvulus (Paykull, 1799)
tabidus (Fabricius, 1775)*
- Altica** Geoffroy, 1762
aenescens Weise, 1888
engstroemi J. Sahlberg, 1893
brevicollis Foudras, 1860
helianthemii (Allard, 1859)*
pusilla Duftschmid, 1825 nec Gyllenhal, 1813
oleracea (Linnaeus, 1758)*
tamaricis Schrank, 1785*
- Batophila** Foudras, 1860
rubi (Paykull, 1799)*
- Lytharia** Bedel, 1897
salicariae (Paykull, 1800)*
- Neocrepidodera** Heikertinger, 1911
Asiolestia Jacobson, 1925
Crepidodera auct. nec Chevrolat, 1837
ferruginea (Scopoli, 1763)*
motschulskii Konstantinov, 1991
sublaevis auct. nec (Motschulsky, 1859)
- Derocrepis** Weise, 1886
rufipes (Linnaeus, 1758)
- Hippuriphila** Foudras, 1860
modeeri (Linnaeus, 1761)*
- Crepidodera** Chevrolat, 1837
Chalcoides Foudras, 1860
aurata (Marsham, 1802)
fulvicornis (Fabricius, 1792)
lamina (Bedel, 1901)
nitidula (Linnaeus, 1758)
- Epitrix** Foudras, 1860
pubescens (Koch, 1803)*
- Mantura** Stephens, 1831
chrysanthemii (Koch, 1803)*
rustica (Linnaeus, 1767)*
- Chaetocnema** Stephens, 1831
aerosa (Letzner, 1846)*
aridula (Gyllenhal, 1827)
breviuscula (Faldermann, 1837)*
compressa (Letzner, 1847)
concinna (Marsham, 1802)
hortensis (Geoffroy, 1785)
mannerheimii (Gyllenhal, 1827)*
obesa (Boieldieu, 1859)*
meridionalis Foudras, 1859
sahlbergii (Gyllenhal, 1827)*
semicoerulea (Koch, 1803)*
- Dibolia** Latreille, 1829
foersteri Bach, 1859
- Argopus** Fischer von Waldheim, 1824
nigritarsis (Gebler, 1823)
- Psylliodes** Berthold, 1827
affinis (Paykull, 1799)*
attenuata (Koch, 1803)*
brisouti Bedel, 1898*
chalcomera (Illiger, 1807)*
cuculata (Illiger, 1807)*
instabilis Foudras, 1860
napi (Fabricius, 1792)*
- Hispininae** Gyllenhal, 1813
Hispa Linnaeus, 1767
atra Linnaeus, 1767
- Cassidinae** Stephens, 1831
Pilemostoma Desbrochers des Loges, 1891
fastuosa (Schaller, 1783)
- Hypocassida** Weise, 1893
subferruginea (Schrank, 1776)
- Cassida** Linnaeus, 1758
azurea Fabricius, 1801*
denticollis Suffrian, 1844*
ferruginea Goeze, 1777
flaveola Thunberg, 1794*
lineola Creutzer, 1799
margaritacea Schaller, 1783
murræa Linnaeus, 1767
nebulosa Linnaeus, 1758
nobilis Linnaeus, 1758*
pannonica Suffrian, 1844
panzeri Weise, 1907*
prasina Illiger, 1798*
rubiginosa Müller, 1776*
sanguinolenta Müller, 1776*
sanguinosa Suffrian, 1844*

seladonia Gyllenhal, 1827*
stigmatica Suffrian, 1844
subreticulata Suffrian, 1844
vibex Linnaeus, 1767
viridis Linnaeus, 1758
vittata Villers, 1789*

Bruchinae Latreille, 1802

Bruchus Linnaeus, 1767
affinis Frölich, 1799*
atomarius (Linnaeus, 1761)*
loti Paykull, 1800*

Bruchidius Schilsky, 1905
marginalis (Fabricius, 1777)

Spermophagus Schönherr, 1833
sericeus (Geoffroy, 1785)*

Cerambycidae Latreille, 1802

Prioninae Latreille, 1802

Prionus Geoffroy, 1762
coriarius (Linnaeus, 1758)

Tragosoma Audinet-Serville, 1832
depsarium (Linnaeus, 1767)*

Lepturinae Latreille, 1802

Oxymirus Mulsant, 1863
cursor (Linnaeus, 1758)

Rhagium Fabricius, 1775
inquisitor (Linnaeus, 1758)
mordax (DeGeer, 1775)
sycophanta (Schrank, 1781)

Stenocorus Geoffroy, 1762
meridianus (Linnaeus, 1758)

Pachyta Dejean, 1821
lamed (Linnaeus, 1758)
quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Brachyta Fairmaire, 1864
interrogationis (Linnaeus, 1758)

Gaurotes LeConte, 1850
virginia (Linnaeus, 1758)

Acmaeops LeConte, 1850
marginatus (Fabricius, 1781)*
smaragdulus (Fabricius, 1792)

Gnathacmaeops Linsley et Chemsak, 1972
pratensis (Laicharting, 1784)

Dinoptera Mulsant, 1863
collaris (Linnaeus, 1758)

Cortodera Mulsant, 1863
femorata (Fabricius, 1787)*
 ***humeralis* (Schaller, 1783)

Alosterna Mulsant, 1863
ingrica (Baeckmann, 1902)*
tabacicolor (DeGeer, 1775)

Nivellia Mulsant, 1863
sanguinosa (Gyllenhal, 1827)

Anoplodera Mulsant, 1839
sexguttata (Fabricius, 1775)
 ***rufipes* (Schaller, 1783)

Stictoleptura Casey, 1924
maculicornis (DeGeer, 1775)
rubra (Linnaeus, 1758)
varicornis (Dalman, 1817)

Anastrangalia Casey, 1924
reyi (Heyden, 1889)*
sanguinolenta (Linnaeus, 1761)*

Lepturobosca Reitter, 1913
virens (Linnaeus, 1758)

Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky et
 Murzin, 1981
livida (Fabricius, 1777)

Judolia Mulsant, 1863
sexmaculata (Linnaeus, 1758)

Oedecnema Dejean, 1835
gebleri (Ganglbauer, 1889)
dubia (Fabricius, 1781) nec (Scopoli, 1763)

Macroleptura Nakane et Ohbayashi, 1957
thoracica (Creutzer, 1799)

Leptura Linnaeus, 1758
aethiops Poda, 1761
annularis Fabricius, 1801
arcuata Panzer, 1793 nec Linnaeus, 1758
mimica Bates, 1884
quadrifasciata Linnaeus, 1758

Lepturalia Reitter, 1913
nigripes (DeGeer, 1775)

Pedostrangalia Sokolow, 1897
pubescens (Fabricius, 1787)

Rutpela Nakane et Ohbayashi, 1957
maculata (Poda, 1761)

Stenurella Villiers, 1974
bifasciata (Müller, 1776)
melanura (Linnaeus, 1758)

Strangalia Audinet-Serville, 1835
attenuata (Linnaeus, 1758)*

Necydalinae Latreille, 1825

Necydalis Linnaeus, 1758
major Linnaeus, 1758

Spondylidinae Audinet-Serville, 1832

Arhopalus Audinet-Serville, 1834
rusticus (Linnaeus, 1758)
tristis (Fabricius, 1787)
 ***ferus* (Mulsant, 1839)

Asemum Eschscholtz, 1830
striatum (Linnaeus, 1758)

Nothorhina Redtenbacher, 1845
punctata (Fabricius, 1798)*

Tetropium Kirby, 1837
 ***aquilonium* Plavilstshikov, 1940
castaneum (Linnaeus, 1758)
gracilicorne Reitter, 1889
fuscum (Fabricius, 1787)*

Spondylis Fabricius, 1775
buprestoides (Linnaeus, 1758)*

Cerambycinae Latreille, 1802

Trichoferus Wollaston, 1854
campestris (Faldermann, 1835)*

Purpuricenus Dejean, 1821
kaehleri (Linnaeus, 1758)
tsherepanovae Tsherepanov, 1980

Aromia Audinet-Serville, 1833
moschata (Linnaeus, 1758)

Obrium Dejean, 1821
cantharium (Linnaeus, 1767)*

Molorchus Fabricius, 1792
minor (Linnaeus, 1758)

Deilus Audinet-Serville, 1834
fugax (Olivier, 1790)

Hylotrupes Audinet-Serville, 1834
 ***bajulus* (Linnaeus, 1758)

Callidium Fabricius, 1775
aeneum (DeGeer, 1775)*
 ?*chlorizans* (Solsky, 1872)* — таксон,
 статус которого, как самостоятельного
 вида, требует проведение специальных
 исследований
coriaceum Paykull, 1800*
violaceum (Linnaeus, 1758)

Phymatodes Mulsant, 1839
abietinus Plavilstshikov et Lurie, 1960
testaceus (Linnaeus, 1758)

Poecilium Fairmaire, 1864
alni (Linnaeus, 1767)

Plagionotus Mulsant, 1842
arcuatus (Linnaeus, 1758)
detritus (Linnaeus, 1758)

Chlorophorus Chevrolat, 1863
herbstii (Brahm, 1790)*

Rhaphuma Pascoe, 1858
gracilipes (Faldermann, 1835)

Xylotrechus Chevrolat, 1860
arvicola (Olivier, 1795)
pantherinus (Savenius, 1825)*
rusticus (Linnaeus, 1758)

Clytus Laicharting, 1784
arietoides Reitter, 1899

Cyrtoclytus Ganglbauer, 1881
capra (Germar, 1824)*

Lamiinae Latreille, 1825

Mesosa Latreille, 1829
myops (Dalman, 1817)

Monochamus Dejean, 1821
galloprovincialis (Olivier, 1795)
sutor (Linnaeus, 1758)
urussovi (Fischer von Waldheim, 1806)

Lamia Fabricius, 1775
textor (Linnaeus, 1758)

Anaesthetis Dejean, 1835
testacea (Fabricius, 1781)*

Pogonocherus Dejean, 1821
decoratus Fairmaire, 1855*
fasciculatus (DeGeer, 1775)*

Oplasia Mulsant, 1863
cinerea (Mulsant, 1839)*
fennica (Paykull, 1800) nec (Linnaeus, 1758)

Aegomorphus Haldeman, 1847
Acanthoderes auct. nec Audinet-Serville,
 1835
clavipes (Schrank, 1781)

Leiopis Audinet-Serville, 1835
nebulosus (Linnaeus, 1758)*
 ***punctulatus* (Paykull, 1800)

Acanthocinus Dejean, 1821
aedilis (Linnaeus, 1758)
carinulatus (Gebler, 1833)
griseus (Fabricius, 1792)

Exocentrus Dejean, 1835
lusitanus (Linnaeus, 1767)

Tetrops Stephens, 1829
praeustus (Linnaeus, 1758)

Menesia Mulsant, 1856
bipunctata (Zoubkoff, 1829)*

Saperda Fabricius, 1775
carcharias (Linnaeus, 1758)
perforata (Pallas, 1773)*
populnea (Linnaeus, 1758)
scalaris (Linnaeus, 1758)*
similis Laicharting, 1784

Oberea Dejean, 1835
oculata (Linnaeus, 1758)

Phytoecia Dejean, 1835
coerulescens (Scopoli, 1763)
cylindrica (Linnaeus, 1758)
icterica (Schaller, 1783)
nigricornis (Fabricius, 1781)

Agapanthia Audinet-Serville, 1835
intermedia Ganglbauer, 1883*
villosoviridescens (DeGeer, 1775)

CURCULIONOIDEA

Nemonychidae Bedel, 1882
Doydirhynchinae Pierce, 1916
Cimberis Des Gozis, 1881
Rhinomacer auct. nec Müller, 1764
attelaboides (Fabricius, 1787)*

Nemonychinae Bedel, 1882
Nemonyx Redtenbacher, 1845
lepturoides (Fabricius, 1801)

Anthribidae Billberg, 1820
Anthribinae Billberg, 1820
Tropideres Schönherr, 1823
albistrois (Herbst, 1783)

Platyrhinus Clairville et Schellenberg, 1798
resinosus (Scopoli, 1763)*

Dissoleucas Jordan, 1925
niveirostris (Fabricius, 1798)*

Rhaphitropis Reitter, 1916
marchicus (Herbst, 1797)*

Platystomos Schneider, 1791
albinus (Linnaeus, 1758)

Anthribus Geoffroy, 1762
nebulosus Forster, 1770*
scapularis (Gebler, 1833)*

Rhynchitidae Gistel, 1848
Auletobius Desbrochers des Loges, 1869
sanguisorbae (Schrank, 1798)

Deporaus Leach, 1819
betulae (Linnaeus, 1758)*

Caenorhinus Thomson, 1859
mannerheimi (Hummel, 1823)*

Temnocerus Thunberg, 1815
Pselaphorhynchites Schilsky, 1903
caeruleus (Fabricius, 1798)*
tomentosus (Gyllenhal, 1839)
longiceps (Thomson, 1888)*
nanus (Paykull, 1792)*

Neocoenorhinus Voss, 1952
germanicus (Herbst, 1797)*

Neocoenorhinidius Legalov, 2003
pauxillus (Germar, 1824)*

Tatianaerhynchites Legalov, 2002
aequatus (Linnaeus, 1767)*

Pseudomechoris Legalov, 2003
aethiops (Bach, 1854)*

Rhynchites Schneider, 1791
bacchus (Linnaeus, 1758)*

Epirhynchites Voss, 1953
auratus (Scopoli, 1763)

Teretriorhynchites Voss, 1938
pubescens (Fabricius, 1775)*

Involvulus Schrank, 1798
cupreus (Linnaeus, 1758)

Byctiscus Thomson, 1859
betulae (Linnaeus, 1758)
populi (Linnaeus, 1758)

Attelabidae Billberg, 1820
Attelabinae Billberg, 1820
Attelabus Linnaeus, 1758
nitens (Scopoli, 1763)*

Apoderinae Jekel, 1860
Compsapoderus Voss, 1927
erythropterus (Gmelin, 1790)*
Apoderus Olivier, 1807
coryli (Linnaeus, 1758)*

Brentidae Billberg, 1820
(**Apionidae** Schönherr, 1823)
Apioninae Schönherr, 1823
Taphrotopium Reitter, 1916
sulcifrons (Herbst, 1797)*

Omphalapion Schilsky, 1906
hookerorum (Kirby, 1808)*

Diplapion Reitter, 1916
stolidum (Germar, 1817)*

Ceratapion Schilsky, 1901
onopordi (Kirby, 1808)*
penetrans (Germar, 1817)*

Melanapion Wagner, 1930
minimum (Herbst, 1797)*

Taeniapion Schilsky, 1906
urticarium (Herbst, 1784)*

Aspidapion Schilsky, 1901
aeneum (Fabricius, 1775)*
radiolus (Marsham, 1802)*

Exapion Bedel, 1887
difficile (Herbst, 1797)

Pseudoprotapion Ehret, 1990
astragali (Paykull, 1800)*
elegantulum (Germar, 1818)*

Protapion Schilsky, 1908
apricans (Herbst, 1797)
filirostre (Kirby, 1808)*
fulvipes (Geoffroy, 1785)
flavipes (Paykull, 1792) nec (DeGeer, 1775)
nigritarse (Kirby, 1808)
ononidis (Gyllenhal, 1827)*
ononicola (Bach, 1854)
trifolii (Linnaeus, 1768)
aestivum (Germar, 1817)

Pseudostenapion Wagner, 1930
simum (Germar, 1817)*

Aizobius Alonso-Zarazaga, 1991
sedi (Germar, 1818)*

Perapion Wagner, 1907
connexum (Schilsky, 1902)*
curtirostre (Germar, 1817)
marchicum (Herbst, 1797)*
violaceum (Kirby, 1808)

Apion Herbst, 1797
frumentarium (Linnaeus, 1758)*
miniatum Schönherr, 1833
haematodes Kirby, 1808*
frumentarium (Paykull, 1792) nec (Linnaeus, 1758)
rubens Stephens, 1839

Catapion Schilsky, 1906
seniculus (Kirby, 1808)

Betulapion Ehret, 1994
simile (Kirby, 1811)*

Stenopterapion Bokor, 1923
tenue (Kirby, 1808)*

Ischnopterapion Bokor, 1923
loti (Kirby, 1808)*
virens (Herbst, 1797)*

Tatyanapion Legalov, 1997
laticeps (Desbrochers des Loges, 1870)*

Cyanapion Bokor, 1923
columbinum (Germar, 1817)*

Oxystoma Duméril, 1806
cerdo (Gerstaecker, 1854)*
ochropus (Germar, 1818)*
opeticum (Bach, 1854)
subulatum (Kirby, 1808)*

Eutrichapion Reitter, 1916
ervi (Kirby, 1808)*
facetum (Gyllenhal, 1839)*
viciae (Paykull, 1800)*

Nanophyinae Gistel, 1856
Nanomimus Alonso-Zarazaga, 1989
hemisphaericus (Olivier, 1807)

Nanophyes Schönherr, 1838
marmoratus (Goeze, 1777)*

Microon Alonso-Zarazaga, 1989
sahlbergi (Sahlberg, 1835)*

Dryophthoridae Schönherr, 1825
Dryophthorinae Schönherr, 1825
Dryophthorus Schönherr, 1824
corticalis (Paykull, 1792)*

Rhynchophorinae Schönherr, 1833
Sitophilus Schönherr, 1838
granarius (Linnaeus, 1758)
oryzae (Linnaeus, 1763)*

Curculionidae Latreille, 1802
Erihinae Schönherr, 1825
Tanysphyrus Germar, 1817
lemnae (Paykull, 1792)*

Tournotaris Alonso-Zarazaga et Lyal, 1999
bimaculatus (Fabricius, 1887)

Notaris Germar, 1817
acridulus (Linnaeus, 1758)
aethiops (Fabricius, 1792)
rhamni (Herbst, 1795)*
scirpi (Fabricius, 1792) nec (Rossi, 1790)

Thryogenes Bedel, 1884
nereis (Paykull, 1800)*
scirrhosus (Gyllenhal, 1836)*

Grypus Germar, 1817
equiseti (Fabricius, 1775)*

Bagoinae Thomson, 1859
Hydronomus Schönherr, 1825
alismaticus (Marsham, 1802)*

Bagous Germar, 1817
binodulus (Herbst, 1795)*
glabrirostris (Herbst, 1795)
lutulentus (Gyllenhal, 1813)
nodulosus Gyllenhal, 1836
robustus Brisout de Barneville, 1863*
subcarinatus Gyllenhal, 1836*
tempestivus (Herbst, 1795)*

Molytinae Schönherr, 1825
Magdalis Germar, 1817

armigera (Geoffroy, 1785)*
frontalis (Gyllenhal, 1827)
duplicata Germar, 1819*
linearis (Gyllenhal, 1827)*
nitida (Gyllenhal, 1827)*
ruficornis (Linnaeus, 1758)*
violacea (Linnaeus, 1758)*

Pissodes Germar, 1817
castaneus (DeGeer, 1775)
notatus (Fabricius, 1787) nec (Bonsdorff, 1785)
pini (Linnaeus, 1758)
piniphilus (Herbst, 1797)*

- Hylobius** Germar, 1817
excavatus (Laicharting, 1781)
piceus (DeGeer, 1775) nec (Pallas, 1781)
nec (Scopoli, 1763)
sibiricus Egorov, 1996
albosparsus auct. nec (Boheman, 1845)
- Callirus** Dejean, 1821
abietis (Linnaeus, 1758)
pinastri (Gyllenhal, 1813)
transversovittatus (Goeze, 1777)*
- Lepyris** Germar, 1817
palustris (Scopoli, 1763)
volgensis Faust, 1882
arcticus (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1780)
- Cossoninae** Schönherr, 1825
Cossonus Clairville, 1798
parallelepipedus (Herbst, 1795)*
- Rhyncolus** Germar, 1817
Eremotes Wollaston, 1861
ater (Linnaeus, 1758)*
chloropus auct. nec (Linnaeus, 1758)
- Phloeophagus** Schönherr, 1838
turbatus Schönherr, 1845*
- Cryptorhynchinae** Schönherr, 1825
Cryptorhynchus Illiger, 1807
lapathi (Linnaeus, 1758)
- Acalles** Schönherr, 1825
echinatus (Germar, 1824)*
- Lixinae** Schönherr, 1823
Rhinocyllus Germar, 1819
conicus (Flölich, 1792)
- Lachnaeus** Schönherr, 1826
crinitus (Boheman, 1836)
- Larinus** Dejean, 1821
brevis (Herbst, 1795)
jaceae (Fabricius, 1775)*
?lederi Faust, 1889*
obtusus Gyllenhal, 1836*
planus (Fabricius, 1792)*
sturnus (Schaller, 1783)*
turbatus Gyllenhal, 1836
- Lixus** Fabricius, 1801
***albomarginatus* Boheman, 1843
ascanii auct. nec Linnaeus, 1767
bardanae (Fabricius, 1787)
elongatus (Goeze, 1777)
iris Olivier, 1807*
myagri Olivier, 1807
paraplecticus (Linnaeus, 1758)*
rubicundus Zoubkoff, 1833*
- Cleonis** Dejean, 1821
pigra (Scopoli, 1763)
- Cyphocleonus** Motschulsky, 1860
adumbratus (Gebler, 1830)
altaicus (Gebler, 1830)
dealbatus (Gmelin, 1790)
tigrinus (Panzer, 1789) nec (Geoffroy, 1785)
triscalatus (Herbst, 1795)
- Coniocleonus** Motschulsky, 1860
hollbergi (Fähræus, 1842)*
glauca (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763)
- Bothynoderes** Schönherr, 1823
affinis (Schrank, 1781)
fasciatus (Müller, 1776) nec (Scopoli, 1763)
- Asproparthenis** Des Gozis, 1886
foveicollis (Gebler, 1834)
- Baridinae** Schönherr, 1836
Aulacobaris Desbrochers des Loges, 1892
coerulescens (Scopoli, 1763)*
- janthina* (Boheman, 1836)*
lepidii (Germar, 1824)*
- Baris** Germar, 1817
artemisiae (Herbst, 1795)*
- Limnobaris** Bedel, 1885
atriplicis (Fabricius, 1792)*
pusio (Boheman, 1844)
dolorosa (Goeze, 1777)*
pilistriata (Stephens, 1831)
t-album (Linnaeus, 1758)*
- Ceutorhynchinae** Gistel, 1856
Mononychus Germar, 1824
punctumalbum (Herbst, 1784)*
- Pelenomus** Thomson, 1859
comari (Herbst, 1795)*
quadrituberculatus (Fabricius, 1787)*
velaris (Gyllenhal, 1827)*
- Rhinoncus** Schönherr, 1825
bruchoides (Herbst, 1784)*
castor (Fabricius, 1792)*
pericarpus (Linnaeus, 1758)*
perpendicularis (Reich, 1797)*
- Auleutes** Dietz, 1896
epilobii (Paykull, 1800)*
- Amalus** Schönherr, 1825
scortillum (Herbst, 1795)*
haemorrhous (Herbst, 1795) nec (Gmelin, 1790)
- Poophagus** Schönherr, 1837
sisymbrii (Fabricius, 1777)*
hopffgarteni (Tourmier, 1873)*
- Tapeinotus** Schönherr, 1826
sellatus (Fabricius, 1794)*
- Coeliodes** Schönherr, 1837
transversealbofasciatus (Goeze, 1777)*
erythroleucos (Gmelin, 1790)
cinctus (Geoffroy, 1785) nec (Drury, 1782)
rubicundus (Herbst, 1795)*
- Ceutorhynchus** Germar, 1824
barbareae Suffrian, 1847*
canaliculatus Brisout de Barneville, 1869*
contractus (Marshall, 1802)*
erysimi (Fabricius, 1787)*
***napi* Gyllenhal, 1837
hampei Brisout de Barneville, 1869*
pleurostigma (Marshall, 1802)
assimilis (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1775)
puncticollis Boheman, 1845*
rapae Gyllenhal, 1837*
scapularis Gyllenhal, 1837*
sulcicollis (Paykull, 1800)*
typhae (Herbst, 1795)*
floralis (Paykull, 1792) nec (Olivier, 1790)
viridanus Gyllenhal, 1837*
- Prisistus** Reitter, 1916
kuntzei (Smreczynski, 1957)*
- Glocianus** Reitter, 1916
distinctus (Brisout de Barneville, 1870)*
marginatus (Paykull, 1792) nec (Olivier, 1790)
punctiger (Sahlberg, 1835)*
- Mogulones** Reitter, 1916
Boraginobius Wagner, 1944
asperifoliarum (Gyllenhal, 1813)*
cynoglossi (Frauenfeld, 1866)
pallidicornis (Brisout de Barneville, 1860)*
t-album (Gyllenhal, 1837)
- Parethelcus** Wagner, 1943
pollinarius (Forster, 1771)*
- Hadroplontus** Thomson, 1859
litura (Fabricius, 1775)*
- Datonychus** Wagner, 1944
arquatus (Herbst, 1795)*
- Microplontus** Wagner, 1944
millefolii (Schultze, 1897)
mirabilis (Korotyaev, 1980)*
rugulosus (Herbst, 1795)
figuratus (Gyllenhal, 1824)
chrysanthemi (Germar, 1837)
triangulum (Boheman, 1845)
- Thamiocolus** Thomson, 1859
sahlbergi (Sahlberg, 1845)*
viduatus (Gyllenhal, 1813)*
virgatus (Gyllenhal, 1837)
- Sirocalodes** Voss, 1958
quercicola (Paykull, 1792)*
- Nedys** Schönherr, 1825
Cidnorhinus Thomson, 1859
quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)*
- Trichosirocalus** Colonnelli, 1979
trogodytes (Fabricius, 1787)*
- Zacladus** Reitter, 1913
geranii (Paykull, 1800)*
affinis (Paykull, 1792) nec (Schrank, 1781)
- Orobitinae** Thomson, 1859
Orobitis Germar, 1817
cyaneus (Linnaeus, 1758)*
- Curculioninae** Latreille, 1802
Acalyptus Schönherr, 1833
carpini (Fabricius, 1792)*
sericeus Gyllenhal, 1836*
- Ellescus** Dejean, 1821
bipunctatus (Linnaeus, 1758)*
infirmus (Herbst, 1795)*
scanicus (Paykull, 1792)*
- Dorytomus** Germar, 1817
dorsalis (Linnaeus, 1758)
edoughensis Desbrochers des Loges, 1875*
affinis (Paykull, 1800) nec (Schrank, 1781)
***filirostris* (Gyllenhal, 1836)
ictor (Herbst, 1795)
validirostris (Gyllenhal, 1836)
longimanus (Forster, 1771)
melanophthalmus (Paykull, 1792)
rufatus (Bedel, 1886)*
rufulus (Bedel, 1884) nec (Mannerheim, 1853)
suratus (Gyllenhal, 1836)*
flavipes (Panzer, 1797) nec (DeGeer, 1775)
taeniatus (Fabricius, 1781)
- Pseudostyphlus** Tourmier, 1874
pillumus (Gyllenhal, 1836)*
- Cionus** Clairville, 1798
hortulanus (Geoffroy, 1785)*
olivieri Rosenschoeld, 1838*
scrophulariae (Linnaeus, 1758)*
thapsus (Fabricius, 1792)*
tuberculosis (Scopoli, 1763)*
- Rhynchaenus** Clairville, 1798
loniceræ (Herbst, 1785)*
- Tachyerges** Schönherr, 1825
decoratus (Germar, 1821)*
salicis (Linnaeus, 1758)*
stigma (Germar, 1821)*
- Isochnus** Thomson, 1859
populicola (Silfverberg, 1977)*
populi (Fabricius, 1792) nec (Linnaeus, 1758)
- Orchestes** Illiger, 1798
calceatus (Germar, 1821)*
quercus (Linnaeus, 1758)
signifer (Creutzer, 1799)*
avellanæ (Donovan, 1797) nec (Paykull, 1792)

- Pseudorchestes** Bedel, 1894
cinereus (Fähræus, 1843)*
- Mecinus** Germar, 1821
janthinus Germar, 1821*
- Gymnetron** Schönherr, 1825
beccabungae (Linnaeus, 1761)*
melanarium (Germar, 1821)*
- Rhinusa** Stephens, 1829
antirrhini (Paykull, 1800)*
linariae (Panzer, 1793)*
littoreum (Brisout de Barneville, 1862)*
- Miarus** Schönherr, 1826
campanulae (Linnaeus, 1767)
labilis (Herbst, 1795)*
pascuorum (Gyllenhal, 1813)*
- Cleopomiarus** Pierce, 1919
Miaromimus Solari, 1947
distinctus (Boheman, 1845)*
longirostris auct. nec Gyllenhal, 1813
graminis (Gyllenhal, 1813)*
- Tychius** Germar, 1817
aureolus Kiesenwetter, 1851*
breviusculus Desbrochers des Loges, 1873*
lineatulus Stephens, 1831*
medicaginis Brisout de Barneville, 1862*
parallelus (Panzer, 1794)
venustus (Fabricius, 1787) nec (Fabricius, 1781)
- picirostris* (Fabricius, 1787)
quinquepunctatus (Linnaeus, 1758)*
trivialis Boheman, 1843*
- Sibinia** Germar, 1817
pellucens (Scopoli, 1772)*
hopffgarteni Tournier, 1873 *
tenuirostris Desbrochers des Loges, 1875
viscaria (Linnaeus, 1761)*
- Anthonomus** Germar, 1817
humeralis (Panzer, 1795)
pedicularius (Linnaeus, 1758)*
phyllocola (Herbst, 1795)*
varians (Paykull, 1792) nec (Gmelin, 1790)
pomorum (Linnaeus, 1758)*
rubi (Herbst, 1795)*
sorbi Germar, 1821*
- Furcipes** Desbrochers des Loges, 1868
rectirostris (Linnaeus, 1758)
- Brachonyx** Schönherr, 1825
pineti (Paykull, 1792)*
- Curculio** Linnaeus, 1758
glandium Marsham, 1802
nucum Linnaeus, 1758
rubidus (Gyllenhal, 1836)*
venosus (Gravenhorst, 1807)
villosus Fabricius, 1781*
- Archarius** Gistel, 1848
crux (Fabricius, 1777)*
salicivorus (Paykull, 1792)*
- Hyperinae** Marseul, 1863
- Antidonus** Bedel, 1886
dauci (Olivier, 1807)*
fasciculata (Herbst, 1795) nec (DeGeer, 1775)
- Hypera** Germar, 1817
Phytonomus Schönherr, 1823
arator (Linnaeus, 1758)
diversipunctata (Schränk, 1789)*
elongata (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1775)
meles (Fabricius, 1792)
nigrirostris (Fabricius, 1775)*
pollux (Fabricius, 1796)*
adspersa (Fabricius, 1792) nec (Fabricius, 1775)
- postica** (Gyllenhal, 1813)
variabilis (Herbst, 1795) nec (Fabricius, 1777)
- rumicis* (Linnaeus, 1758)
suspiciosa (Herbst, 1795)*
pedestris (Paykull, 1792) nec (Poda, 1761)
transsylvanica (Petri, 1901) *
viciae (Gyllenhal, 1813)*
- Limobius** Schönherr, 1847
borealis (Paykull, 1792)*
- Entiminae** Schönherr, 1823
- Gronops** Schönherr, 1823
lunatus (Fabricius, 1775)*
- Asperogronops** Solari, 1940
inaequalis (Boheman, 1842)
- Graptus** Schönherr, 1823
Atophus Schönherr, 1826
triguttatus (Schränk, 1784)
- Sitona** Germar, 1817
cylindricollis (Fähræus, 1840)*
hispidulus (Fabricius, 1777)
inops Schönherr, 1832*
languidus Gyllenhal, 1834*
lepidus Gyllenhal, 1834
flavescens (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1787)
lineatus (Linnaeus, 1758)
longulus Gyllenhal, 1834*
macularius (Marsham, 1802)
erinitus (Herbst, 1795) nec (Gmelin, 1790)
puncticollis Stephens, 1831*
striatellus Gyllenhal, 1834
tibialis (Herbst, 1795) nec (Sparman, 1787)
sulcifrons (Thunberg, 1798)
suturalis Stephens, 1831
- Tanymecus** Germar, 1817
palliatius (Fabricius, 1887)
- Chlorophanus** Sahlberg, 1823
graminicola (Schönherr, 1832)
viridis (Linnaeus, 1785)
- Phyllobius** Germar, 1824
arborator (Herbst, 1797)
argentatus (Linnaeus, 1758)
betulinus (Bechstein et Scharfenberg, 1805)
betulae (Fabricius, 1801) nec (Linnaeus, 1758)
brevis Gyllenhal, 1834
glaucus (Scopoli, 1763)*
calcaratus (Fabricius, 1792)
crassipes Motschulsky, 1859
contemptus Steven, 1829
incanus Gyllenhal, 1834*
maculatus Tournier, 1880
maculicornis Germar, 1824
oblongus (Linnaeus, 1758)
pomaceus Gyllenhal, 1834
urticae (DeGeer, 1775) nec (Scopoli, 1763)
pyri (Linnaeus, 1758)
scutellaris Redtenbacher, 1849
vespertilio Faust, 1884
viridicollis (Fabricius, 1792)
- Polydrusus** Germar, 1817
cervinus (Linnaeus, 1758)*
confluens Stephens, 1831
corruscus Germar, 1824*
flavipes (DeGeer, 1775)*
inustus Germar, 1824
fulvicornis (Fabricius, 1792)*
ruficornis (Bonsdorff, 1785) nec (Linnaeus, 1758)
pterygomalis Boheman, 1840*
undatus (Fabricius, 1781)
- Eusomus** Germar, 1824
ovulum Germar, 1824
- Liophloeus** Germar, 1824
tessulatus (Müller, 1776)
- Otiorhynchus** Germar, 1822
ligustici (Linnaeus, 1758)*
ovatus (Linnaeus, 1758)
politus Gyllenhal, 1834*
raucus (Fabricius, 1777)
rugosus (Hummel, 1827)
scopularis Hochhut, 1847
sulcatus (Fabricius, 1775)
tristis (Scopoli, 1763)
- Eudipnus** Thomson, 1859
mollis (Strøm, 1763)
- Brachysomus** Schönherr, 1823
echinatus (Bonsdorff, 1785)*
- Parafoucartia** Solari, 1948
squamulata (Herbst, 1795)
- Strophosoma** Billberg, 1820
capitatum (DeGeer, 1775)
- Barypeithes** Jacquelin du Val, 1854
lebedevi Roubal, 1926 *
- Brachyderes** Schönherr, 1823
incanus (Linnaeus, 1758)
- Sciaphilus** Schönherr, 1823
asperatus (Bonsdorff, 1785)*
- Barynotus** Germar, 1817
obscurus (Fabricius, 1775)
- Omius** Germar, 1817
rotundatus (Fabricius, 1792)
- Omiamima** Silfverberg, 1977
mollina (Boheman, 1834)*
- Trachyphloeus** Germar, 1817
aristatus (Gyllenhal, 1827)*
bifoveolatus (Beck, 1817)*
- Scolytidae** Latreille, 1807
- Hylesininae** Erichson, 1836
- Hylurgops** LeConte, 1876
glabratus (Zetterstedt, 1828)
palliatius (Gyllenhal, 1813)
- Hylastes** Erichson, 1836
ater (Paykull, 1800)
brunneus Erichson, 1836*
aterrimus Eggers, 1933
cunicularius Erichson, 1836*
starki (Eggers, 1933)
opacus Erichson, 1836*
- Xylechinus** Chapuis, 1869
pilosus (Ratzeburg, 1837)*
- Tomicus** Latreille, 1802
Blastophagus Eichhoff, 1864
minor (Hartig, 1834)
piniperda (Linnaeus, 1758)
- Dendroctonus** Erichson, 1836
micans (Kugelann, 1794)*
- Phloeotribius** Latreille, 1796
spinulosus (Rey, 1883)*
- Thamnurgus** Eichhoff, 1864
caucasicus Reitter, 1887*
- Polygraphus** Erichson, 1836
poligraphus (Linnaeus, 1758)
punctifrons Thomson, 1886*
subopacus Thomsom, 1871
- Carphoborus** Eichhoff, 1864
rossicus Semenov, 1902
teplouchovi Spessivtsev, 1916*
- Scolytinae** Latreille, 1807
- Scolytus** Geoffroy, 1762
intricatus (Ratzeburg, 1837)
laevis Chapuis, 1873

morawitzi Semenov, 1902
multistriatus (Marshall, 1802)*
ratzeburgi Janson, 1856
rugulosus (Ratzeburg, 1837)*
scolytus (Fabricius, 1775)

Pityogenes Bedel, 1888
 ***bidentatus* (Herbst, 1783)
chalcographus (Linnaeus, 1761)
 ***quadridens* (Hartig, 1834)
irkutensis Eggers, 1910*
 ***trepanatus* (Nördlinger, 1848)

Orthotomicus Ferrari, 1867
laricis (Fabricius, 1792)
 ***longicollis* (Gyllenhal, 1827)
proximus (Eichhoff, 1868)
suturalis (Gyllenhal, 1827)

Ips DeGeer, 1775
acuminatus (Gyllenhal, 1827)
duplicatus (Sahlberg, 1836)
sexdentatus (Börner, 1776)
typographus (Linnaeus, 1758)

Dryocoetes Eichhoff, 1864
alni (Georg, 1856)*
autographus (Ratzeburg, 1837)
baikalicus Reitter, 1900
hectographus Reitter, 1913*

Cryphalus Erichson, 1836
 ***saltuarius* Weise, 1891

Crypturgus Erichson, 1836
cinereus (Herbst, 1793)
pusillus (Gyllenhal, 1813)*

Trypodendron Stephens, 1830
lineatum (Olivier, 1795)*
signatum (Fabricius, 1792)*

Xyleborus Eichhoff, 1864
cryptographus (Ratzeburg, 1837)*
dispar (Fabricius, 1792)

Trypophloeus Fairmaire, 1868
alni (Lindemann, 1875)
 ***bispinulus* Eggers, 1927

Ernoporus Thomson, 1859
tiliae (Panzer, 1793)

Pityophthorus Eichhoff, 1864
micrographus (Linnaeus, 1758)*
glabratus Eichhoff, 1878*

Благодарности

Авторы выражают благодарность В.И. Рошиненко, А.Г. Борисовскому, Д.А. Адаховскому, К.А. Капитонову (УдГУ), Н.Ю. Поповой (Удмуртский национальный краеведческий музей), за предоставленные сборы жуков.

Помощь в проверке определения и определении некоторых жесткокрылых оказали: А.В. Алексеев (Орехово-Зуевский педагогический университет) (Vuprestidae), А.О. Беньковский (Институт проблем экологии и эволюции РАН) (Chrysomelidae), А.А. Гусаков (Scarabaeoidea) и Г.Ю. Любарский (Зоологический музей МГУ) (Cryptophagidae, Phalacridae), В.Г. Грачёв (Палеонтологический институт РАН), Б.А. Коротяев (Зоологический институт РАН) и А.А. Легалов (Институт систематики и экологии животных СО РАН) (Curculionidae), А.В. Компанцев (ИПЭЭ РАН) (некоторые особо сложные для диагностики Ciidae), С.А. Курбатов (НИИХЗР) (Scydmaenidae, Pselaphinae), К.В. Макаров и А.В. Маталин (Московский государственный педагогический университет, Москва) и С.Ю. Грюнталь (Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы) (Carabidae), П.Н. Петров (МГУ им. Ломоносова) (Dytiscidae, Halpiliidae, Gyridae), А.А. Полилов (кафедра энтомологии МГУ) (Ptiliidae), В.К. Односум (ЗИН, Киев) (часть Mordellidae), И.Н. Тоскина (Москва) (Anobiidae), С.Э. Чернышёв (Институт систематики и экологии животных СО РАН) (Dasytidae, Malachiidae), O. Merkl (Natural History Museum, Budapest) (Lagriidae), за что авторы им искренне благодарны.

Литература

- Адаховский Д.А., Басов В.М., Борисовский А.Г., Дедюхин С.В., Попова Н.Ю., Рошиненко В.И. 2001. Насекомые // Красная книга Удмуртской Республики. Животные. Ижевск: «Удмуртия». С.13–50, 140–143.
- Александрович О.Р., Лопатин И.К., Писаненко А.Д., Цинкевич В.А., Снитко С.М. 1996. Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси. Минск. 103 с.
- Борисовский А.Г., Адаховский Д.А. 1998. Материалы по редким насекомым Удмуртии // Удмуртия накануне 3-его тысячелетия. Тезисы докладов научно-практической конференции. Ижевск. С.12–14.
- Борисовский А.Г., Адаховский Д.А. 1999. Материалы по экологии и распространению жука-олени (*Lucanus cervus*) и восковица-отшельника (*Osmoderma eremita*) в Удмуртии // Тезисы докладов 4-й Российской университетско-академической научно-практической конференции. Т.39. Ч.2. Ижевск: УдГУ. С.60–61.

- Дедюхин С.В. 2001. Особенности фауны жесткокрылых долины р. Вятки на крайнем юго-западе Удмуртии // Тезисы докладов 5-й Российской университетско-академической научно-практической конференции. Ч.6. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та. С.75–76.
- Дедюхин С.В. 2003а. Пластинчатоусые жесткокрылые (Coleoptera, Scarabaeoidea: Trogidae, Scarabaeidae, Lucanidae) Удмуртской Республики // Бюллетень МОИП. Отделение биологическое. Т.108. Вып.6. С.3–13.
- Дедюхин С.В. 2003б. Особенности фауны и сообществ жесткокрылых (Coleoptera) Удмуртии // Вестник Удмуртского университета. Ижевск: УдГУ. С.93–104.
- Дедюхин С.В. 2003в. Зональные и зоогеографические особенности фауны жесткокрылых (Coleoptera) Удмуртии. Ставрополь // <http://www.conf.stavsu.ru/conf.asp?Report/Id=65>.
- Дедюхин С.В., Борисовский А.Г. 2001. Материалы по некоторым видам жесткокрылых, кандидатам в Красную книгу Удмуртской Республики // Тезисы докладов 5-й Российской университетско-академической научно-практической конференции. Ч.6. Ижевск. С.76–77.
- Дедюхин С.В., Борисовский А.Г. 2001. Состав фауны жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) семейств Lucanidae и Trogidae Удмуртской Республики // Вестник Удмуртского университета. Ижевск. No.5. С.23–28.
- Дедюхин С.В., Ермолаев И.В. 2001. Жуки-мертвоеды (Coleoptera, Silphidae) Удмуртии // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Материалы международной научной конференции. Оренбург. С.212–213.
- Дедюхин С.В., Капитонов К.А. 2004. Население жесткокрылых (Coleoptera) — обитателей нор и уборных сурка (*Marmota bobak* Mull.), интродуцированного на юге Удмуртии // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Ижевск: УдГУ. С.191–202.
- Ермолаев И.В. 2002. Экологические последствия скоротечных очагов листовичной чехликовой моли в Удмуртии // Фундаментальные и прикладные проблемы популяционной биологии. Тезисы докладов VI Всероссийского популяционного семинара. Нижний Тагил: НГПИ. С.45–46.
- Ермолаев И.В., Дедюхин С.В. 2000. Фауна жуков-мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) Удмуртии // Вестник Удмуртского университета. Серия «Ботаника, зоология, экология». No.5. С.96–102.
- Ермолаев И.В., Сидорова О.В. 2002. Членистоногие-филлофаги липы мелколистной города Ижевска // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Материалы II международной научной конференции Оренбург: ОГПУ. С.161–162.
- Козлова Е.А. 1965. Предварительные материалы к фауне жуков Удмуртской АССР // Доклады и сообщения научной конференции физико-математического и естественного факультетов. Ижевск: «Удмуртия». С.137–141.
- Лебедев А. 1906. Материалы для фауны жуков (Coleoptera) Казанской губернии. Ч.1 // Труды Русского энтомологического общества. Т.XXXVII. No.3–4. С.352–438.

- Лебедев А. 1913 (1912). Материалы для фауны жуков (Coleoptera) Казанской губернии. Ч.2 // Русское Энтомологическое обозрение. Т. XII. No.2. С.336–448.
- Никитский Н.Б., Осипов И.Н., Чемерис М.В., Семёнов В.Б., Гусakov А.А. 1996. Жесткокрылые–ксилобионты, мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-Террасного биосферного заповедника (с обзором фауны этих групп Московской области) // Сборник трудов Зоологического музея МГУ. Т. XXXVI. 198 с.
- Рощиненко В.И. 1965. К вопросу о распространении вредных щелкунов в Удмуртской АССР // Доклады и сообщения научной конференции физико-математического и естественного факультетов. Ижевск: «Удмуртия». С.131–136.
- Рощиненко В.И. 1969. Фауна щелкунов в поймах рек Камы, Чепцы и Кильмези // Проблемы почвенной зоологии. Материалы третьего Всесоюзного совещания. Казань. С.139–140.
- Рощиненко В.И. 1970. Фауна щелкунов в пойме р. Камы в пределах Удмуртской АССР // Материалы 4-й научной конференции зоологов пединститута РСФСР. Горький. С.232–233.
- Рощиненко В.И. 1971. Колеоптерофауна лесных вырубок // Проблемы защиты таёжных лесов. Материалы совещания. Красноярск: АН СССР, Сибирское отделение. С.118–120.
- Рощиненко В.И. 1972. Беспозвоночные (списки видов) // Природа Удмуртии. Ижевск: «Удмуртия». С.173–186.
- Рощиненко В.И. 1973. О фауне листоедов Удмуртии // Природные комплексы Удмуртии. Ижевск: «Удмуртия». С.31–33.
- Рощиненко В.И. 1975. Жесткокрылые Удмуртской АССР. Диссертация ... канд. биол. наук. Свердловск. 202 с.
- Рощиненко В.И. 1977. Об изменениях в фауне жесткокрылых (Coleoptera) Удмуртии // Тезисы докладов VII международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы. Л.: Наука. С.87–89.
- Рощиненко В.И. 1978. Размещение жужелиц в пойме р. Кильмези // Фауна и экология животных УАССР и прилегающих районов. Ижевск. С.80–88.
- Рощиненко В.И. 1979. О составе фауны жесткокрылых (Coleoptera) Удмуртии // Материалы VII международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы. Л.: Наука. С.190–192.
- Рощиненко В.И. 1981. Эколого-зоогеографическая характеристика долгоносиков и трубковертов Удмуртии // Фауна и экология животных УАССР и прилегающих районов. Ижевск. С.99–106.
- Рощиненко В.И. 1988. Жесткокрылые // Редкие и исчезающие растения и животные Удмуртии. Ижевск: «Удмуртия». С.114–119.
- Рощиненко В.И., Козлова Е.А. 1963. Некоторые данные по фауне щелкунов (Coleoptera, Elateridae) Удмуртии // Энтомологическое обозрение. Т.42. Вып.3. С.572–575.
- Рощиненко В.И., Козлова Е.А. 1970. Некоторые данные по изучению колеоптерофауны Удмуртии за 1960–1966 гг. // Материалы итоговой научно-практической конференции зоологов Волжско-Камского края. Казань. С.173–176.
- Шернин А.И. 1927. К фауне жесткокрылых (Coleoptera) долины р. Чепцы // Труды Вятского педагогического института. Т.2. Вып.1. С.65–74.
- Эстерберг Л.К. 1935. Насекомые Горьковского и Кировского краёв // Природа Горьковского и Кировского краёв. Горький. С.195–203.
- Bieńkowski A.O. 2004. Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Eastern Europe. New key to subfamilies, genera and species. Moscow. 278 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2003 // I. Löbl, A. Smetana (eds): Archostemata–Myxophaga–Adephaga. Vol.1. Apollo Books: Stenstrup. 819 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2004 // I. Löbl, A. Smetana (eds): Hydrophiloidea–Histeroidea–Staphylinoidea. Vol.2. Apollo Books: Stenstrup. 924 p.
- Kryzhanovskij O.L., Belousov I.A., Kabak I.I., Kataev B.M., Makarov K.V., Shilenkov V.G. 1995. A Checklist of the Ground-Beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae) // Sofia: Pensoft. Ser. Faunist. No.3. 271 p.
- Lawrence J.F., Newton A.F. 1995. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names) // Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera. Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson. Vol.2. Warszawa. P.779–1007.
- Silfverberg H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Helsinki. 94 p.
- Silfverberg H. 2004. Enumeratio nova Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae // Sahlbergia. Vol.9. No.1. 111 p.