

**Н. Н. Плавильщиковъ (Москва).**

**Жуки-усачи Полтавской губерніи (Coleoptera, Cerambycidae).**

[Изъ Зоологическаго Музея Московскаго Университета].

**N. Plavilstshikov (Moscou).**

**Les Longicornes du gouvernement de Poltava (Coleoptera, Cerambycidae).**

[Musée zoologique de l'Université de Moscou].

Свѣдѣнія наши объ энтомофаунѣ Полтавской губерніи пока еще весьма незначительны; вышедшій недавно списокъ жуковъ Полтавской губерніи Кизерицкаго<sup>1)</sup> насчитываетъ всего 594 вида, что составляетъ не болѣе  $\frac{1}{6}$  числа видовъ, водящихся здѣсь. Усачей въ этомъ списокѣ показано только 35 видовъ; это-то обстоятельство и побуждаетъ меня опубликовать мои свѣдѣнія объ усачахъ Полтавской губерніи, тѣмъ болѣе, что число видовъ моего списка (87) уже довольно близко къ предѣльному: у меня показано около  $\frac{3}{4}$  изъ числа видовъ, которые здѣсь могутъ быть найдены.

Матеріаломъ для этого списка послужили коллекціи Полтавскаго Музея<sup>2)</sup>, имѣющіеся у меня сборы П. И. Жихарева (Лохвицкій уѣздъ), часть видовъ включена на основаніи списка коллекціи Баумгартена<sup>3)</sup> (исключительно Кобелякскій уѣздъ) и, наконецъ, три вида взяты изъ списка Кизерицкаго — *Ropalopus femoratus*, *Phytoecia scutellata* и *Ph. ephippium* (виды, показанные въ его списокѣ отмѣчены звѣздочкой).

1) Кизерицкій, В. Къ фаунѣ жуковъ Полтавской губерніи. Русск. Энт. Обозр., XV, 1915, стр. 167—184.

2) Пользуюсь случаемъ выразить здѣсь мою искреннюю признательность Д. А. Оглоблину, благодаря любезности котораго я имѣлъ возможность ознакомиться съ коллекціями Музея.

3) Coleopteren-Sammlung Seiner Excellenz Friedrich von Baumgarten, weiland Präsident der Kaiserlichen Banken im Zartum Polen zu Warschau. St. Petersburg, 1909, 76 pp. Litograph. Въ списокѣ этотъ источникъ приводится сокращенно — В а и т.

Перечень мѣстъ, въ которыхъ производились сборы<sup>4)</sup>:

Полтавскій уѣздъ: г. Полтава (П.), с. Рѣшетилровка (Рѣш.), д. Гетманщина (Гтм.), д. Свинковка (Св.), д. Зинцы (З.), д. Патлаевка (Патл.), с. Бульново (Бл.), д. Шкурупчевъ (Шкр.), Бакай.

Константиноградскій у.: м. Карловка (Карл.), х. Разумовка (Раз.).

Кобелякскій уѣздъ: м. Новые-Сенжары (Н.-С.).

Зеньковскій уѣздъ: с. Дейкаловка (Дейк.).

Лубенскій уѣздъ: г. Лубны (Л.), с. Кругликъ (К.), с. Мгарь (М.), Мгарскъ.

Переяславскій уѣздъ: д. Барышевка (Барш.), с. Хоцьки (Хц.).

Роменскій уѣздъ: ст. Бѣловодъ (Бѣлв.).

Кременчугскій уѣздъ; х. Долгій (Д.).

Лохвицкій уѣздъ (Лохв.).

Золотоношскій уѣздъ: с. Прохоровка (Прх.). с. Сушки (Сш.).

Хорольскій уѣздъ: с. Остапье.

Сборы производились слѣдующими лицами: Б. Боженко, Н. Войтонисъ, С. Кульжинскій, В. и Н. Николаевы, Д. Оглоблинъ, А. Олейниковъ, А. Олѣховскій, Р. Палей, И. Зарѣцкій.

1. *Spondylis buprestoides* L. — П. 7. VII. 09, 3. VII. 913; Гтм. 30. VII. 913; Св. 17. VII. 911.
- \* 2. *Prionus coriarius* L. — П. 9. VII. 09; Гтм. 26. VII. 13; 3. 25. VI. 911; Св. 5, 10. VIII. 912; К. 24, 26, 29. VI, 2. VII. 01; М. 1; VIII. 02; Лохв. 6. VII. 915.
3. *Ergates faber* L. — Гтм. 26. VII. 1913. 5 экз.
- \* 4. *Rhagium sycophanta* Schrank. — П. 14. VI. 09, 12. VII. 1913; Л. 25. V. 01, 2. V. 07; К. 16. V. 02.
5. *Rh. mordax mordax* Deg. — П. 9. VI. 09; К. 16. V. 02.
6. *Rh. inquisitor inquisitor* L. — Гтм. 10. IV. 913, 20. IV. 914.
7. *Stenochorus* (s. str.) *meridianus* L. — П. 22—30, V. 1911, 11. VI. 911; Св. 3. VI. 911, 4. VI. 912; Ваум. (р. 67).
8. *St. (Anisorus) quercus* Goetz. — П. 11. VI. 09<sup>5)</sup>; Св. 15, VI. 913.
- \* 9. *Acmaeops (Dinoptera) collaris* L. — П. 4. V., 5. VI. 910, 18. VI. 912, 11—18. VI. 911; Л. 27. V. 01.
10. *Gaurotes virginea* L. — Ваум. (р. 67).

4) Въ скобкахъ указаны сокращенія, подъ которыми эти мѣстности приводятся въ списокѣ.

5) 1 экземпляръ въ моей коллекціи (Д. Оглоблинъ!).

11. *Leptura (Anoplodera) rufipes* Schall. — П. 30. V., 30. VI. 09.
- \* 12. *L. (Vadonia) unipunctata* F. — П. 9, 17. VI. 09.
- \* 13. *L. (Vadonia) livida* F. — П. 12. VI., 1. VII. 1910, 11. VI. 911.  
20. V. 1913; Патл. 15. VII. 914; Св. 9. VI. 910, 11—15. VI.,  
5. VII. 912; Карл. 14. VI. 911; М. 28. V. 913; Ваум. (р. 67);  
Лохв. 27. VI. 1915.  
ab. *bicarinata* Arnold. — П. 11. VI. 911; Патл. 15. VII. 914;  
Св. 9. VI. 910; М. 28. VII. 913.
14. *Leptura* (s. str.) *rubra* L. — Гетм. 26. VII. 913, 14. VIII. 1914. 15 экз.
15. *Judolia (Pachytodes) cerambyciformis* Schrank ab. *bistigma*  
Pic. — Л. 20. V. 02.
16. *J. (Pachytodes) erratica* Daln. — П. 17. V. 5, 10. VI. 910, 6.  
VII. 911; К. 12—24. VI. 01; Лохв. 27. VI. 915.  
ab. *erythrura* Küst. — П. 11. VI., 6. VII. 911.
- \* 17. *Strangalia* (s. str.) *quadrifasciata* L. — Св. 6, 8. VII. 911, 15.  
VII. 913; Л. 5. VI. 03.
18. *Str.* (s. str.) *maculata* Poda. — П. 11. VII. 911; Св. 5. VII;  
912; Л. 20. V. 01; Лохв. 27. VI. 915.
19. *Str.* (s. str.) *aethiops* Poda. — П. 7. VI. 09.
20. *Str.* (s. str.) *melanura* L. — П. 11, 16. VI. 911, 17. VI. 09;  
Патл. 15. VII. 914; Св. 10, 15. VI. 912; Лохв. 27. VI. 915;  
Ваум. (р. 67).
- \* 21. *Str.* (s. str.) *bifasciata* Müll. — П. 21. VI. 910; Патл. 15. VII.  
914; Св. 9. VI. 910; 10—15. VI. 912.
22. *Strangalina attenuata* L. — П. 28. VI. 910, 11. VI. 911, 25. VII. 914;  
3. 3. VI. 911; Св. 14. VII. 910, 17. VI. 911, 13—15. VI. 912;  
Дейк. 9, 12. VII. 911; Л. 15. VI. 02; Лохв. 28. VI. 915;  
Ваум. (р. 68).
23. *Alosterna tabacicolor* Deg. — Св. 10. VI. 912.
- \* 24. *Necydalis major* L. — П. VIII. 914; Ваум. (68).
25. *Molorchus minor* L. — П. 26. IV. 914.
26. *Obrium cantharinum* L. — Св. 8. VII. 911; Ваум. (р. 67).
27. *Cerambyx scopoli* Fuessly. — П. IV. 911, 7, 20. V. 1912;  
Бл. 8. V. 914; Л. 25. V. 01; К. 16, 24. V. 02.
28. *Hesperophanes griseus* F. — П. VII. 1914.  
Нахождение *H. griseus* F. въ Полтавской губернии нѣсколько  
продвигаетъ къ сѣверу границу распространеніе этого вида  
въ Европейской Россіи.
29. *Crioccephalus rusticus* L. — Гетм. 26. VII. 1913.
30. *Asemum striatum* L. — Хц. 9. V. 1914.
31. *Phymatodes pusillus* F. — Ваум. (р. 68).
32. *Ph. lividus* Rossi. — Ваум. (р. 68).
33. *Ph. testaceus* L.

- ab. *rufipes* Costa. — П. 7. V. 910.  
ab. *variabilis* L. — Л. 7. VI. 02.
- \* 34. *Ph. alni* L. — Ваум. (р. 68).  
\* 35. *Pyrrhidium sanguineum* L. — П. IV. 910 17. VI. 911.  
36. *Callidium violaceum* L. — П. 18. IV. 914.  
\* 37. *Ropalopus clavipes* F. — П. 15. V. VI, 12. VII. 910; Св. 1. VI. 912; Лохв. 28. VI. 915; Дейк. 30. VI. 910; К. 19. VI. 01; Остапье VII. 08; Ваум. (р. 68).  
\* 38. *R. macropus* Germ. — П. VI. 910; Л. 15. V. 02, 14. V. 06; К. 9. VI. 01; Ваум. (р. 68).  
\* 39. *R. femoratus* L. — Кизерицкий, стр. 177.  
\* 40. *Hylotropus bajulus* L. — П. 10—12. IX. 911, 8. VII. 912; Св. 27. VII. 911; Дейк. 15. VII. 911; Л. 11. VII. 05; К. 17. VII. 02; Лохв. 6. VII. 915.  
\* 41. *Aromia moschata moschata* L. — Дейк. 10. VII. 911; К. 10. VI. 01; Остапье VII. 08.  
42. *Purpuricenens* (s. str.) *koehleri* L. — Н.-С. VII. 07; Остапье 19. VI, 1. VII. 08.  
\* 43. *Plagionotus arcuatus* L. — П. 10. VII. 911, 29. V. 912; Св. 1. VI. 912; Л. 15. V. 02.  
ab. *reichei* Thoms. — Св. 1. VI. 912.  
\* 44. *P. detritus* L. — Л. 14. V. 06.  
45. *P. floralis* Pall. — П. 11. VI. 915; Св. 20. VI. 912; Карл. 14. VI. 911.  
\* 46. *Xylotrechus rusticus* L. — З. 3. VI. 911; Св. 10. VI. 6. VII. 911; 1. VI. 912; Н.-С. 10. VII. 08; Л. 30. VI. 02; Барш. 8. VII. 912.  
47. *X. arvicola* Oliv. — П. 10, 20. VI. 09.  
48. *X. antilope* Zeit. — П. 20. VI. 911; Св. 8. VII. 911.  
\* 49. *Chlorophorus varius* Müll. — П. 24. VII. 09, 8. VII. 912; Св. 10. VI. 911; Н.-С. 8. VII. 07, 8. VII. 911; Ваум. (р. 69).  
\* 50. *Chl. herbsti* Grahm. — П. 7. V. 910; Л. 4. VI. 01; Остапье 5. VII. 913; Лохв. 27. VI. 915.  
\* 51. *Chl. sartor* Müll. — П. VI. 09, 9. VI. 910, 15, 20. VI. 911; Св. 10. VII. 910, 3. VII. 912; Дейк. 14. VI. 9—13. VII. 911; Остапье 5. VII. 913; Лохв. 28. VI. 915; Ваум. (р. 68).  
52. *Chl. figuratus* Scop. — П. 6, 17. VI. 09, 10. VI. 911; Св. 10—17. VI. 913; Патл. 15. VII. 914; Л. 16. V. 02; Ваум. (р. 68).  
\* 53. *Dorcadion* (s. str.) *carinatum* Pall. — П. 7—20. IV. 910, IV. 911; Л. 7—21. V. 01, 16. V. 02; К. 2. V. 01, 16. V. 02; Барш. 12. V. 912; Ваум. (р. 69).  
54. *D.* (s. str.) *fulvum* Scop. — Шк. 20. IV. 911; Бакаш V. 911; Ваум. (р. 69).

55. *D. (s. str.) sericatum* К р у п. — П. 12. IV. 910, 5. V. 911, 12. IV. 912, 10. IV. 5. V. 913; 3. 2. V. 911; Рѣш. 26. IV. 911; К. 16. V. 02; Ваум. (р. 70).

Нахождение *Dorcadion sericatum* К р у п. въ Полтавской губерніи является довольно таки неожиданнымъ, тѣмъ болѣе, что, какъ видно изъ перечня, видъ этотъ здѣсь распространенъ довольно широко, а въ окрестностяхъ Полтавы встрѣчается ежегодно (1911, 12, 13). Не менѣе интереснымъ является отсутствіе *D. pedestre* Р о д а, всегда обычнаго на юго-западѣ Европейской Россіи; наличность густо покрытыхъ темными волосами продольныхъ полосъ и пятенъ у шва, а равно и другіе признаки, указываютъ однако, гдѣ въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло дѣйствительно съ *D. sericatum* К р у п., а не съ *D. pedestre* Р о д а, — видомъ весьма къ нему близкимъ. Возможно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ особой расой *D. sericatum*, что однако можетъ быть выяснено лишь по просмотрѣ бѣльшаго числа особей (я видѣлъ 16 экземпляровъ). Было бы весьма интересно выяснитъ: встрѣчается ли *D. sericatum* К р у п. въ промежуточныхъ между Полтавской губерніей и берегами Чернаго моря мѣстностяхъ.

56. *D. (s. str.) striatum* D a l m. — П. IV. 910; 3. 2. V. 911; Л. 20. V. 01; Лохв. VI. 915.
- \* ab. *holosericeum* К р у п. — Лохв. VI. 915.
- \* 57. *D. (s. str.) equestre* L a x m. — Раз. 5. V. 913; К. 1. V. 01; Бѣлв. 15. V. 914; Ваум. (р. 69).
- \* 58. *Lamia textor* L. — П. 3. VII. 913; Св. 17. VII. 910, VIII. 912, 10. VI. 913; Л. 6. IX. 02.
59. *Monachus galloprovincialis* O l i v. — 3. 10. VII. 910.
60. *Acanthocinus aedilis* L. — П. 10. V. 912. 1. VIII. 914; Гетм. 20—21. IV. 6. VIII. 914; Св. 5. VIII. 912.
- \* 61. *Exocentrus lusitanus* L. — Св. 6. VII. 912.
62. *Ex. stierlini* G a n g l b. — Св. 3. VIII. 912.
63. *Pogonochaerus hispidulus* P i l l. — П. 15. V. 914.
64. *P. fasciculatus* D e g. — Гтм. 10. IV. 913, 20. IV. 914.
65. *P. ovatus* G o e z e. — П. VI. 913.
66. *Haplocnemia curculionoides* L. — П. 5. IX. 06; Св. 27. VII. 2. VIII. 911; Л. 27. V. 02.
67. *H. nebulosa* F. — Л. 9. VI. 01.
- \* 68. *Anaesthetis testacea* F. — Дейк. 8. VII. 912.
69. *Agapanthia (Calamobiomorphus) leucaspis* S c h o e n h. — Прх. 10. VI. 914.
70. *A. (s. str.) asphodeli* L a t r. — П.
71. *A. (s. str.) dahli* R i c h t. — П.

- \* 72. *A.* (s. str.) *villosoviridescens* Deg.—П. 23. V. 09, 1—12. V. 910, 20. V, 11. VI. 911; 3. 5. VII. 911; Св. 4. VI. 912; Л. 15, 20. V. 01; Лохв. 28. VI. 915; Ваум. (p. 71).
73. *A.* (s. str.) *violacea* F. — Св. 10. VI. 912; Карл. 11. V. 914.
74. *Saperda* (*Anaerea*) *carcharias* L. — П.
75. *S.* (*Compsidia*) *populnea* L. — Св. 5. VII. 912.
76. *S.* (s. str.) *perforata* Pall. — Св. 23. VII. 913.
77. *S.* (s. str.) *scalaris* L. — Сш. 18. VI. 914.
- \* 78. *Tetrops praeusta* L. — Св. 17. IV. 911, 8. 20. VI. 912; Мгарскъ 27. V. 913; Лохв. 915.
- \* 79. *Phytoecia* (*Cardoria*) *scutellata* F. — Кизерицкій (стр. 177).
80. *Ph.* (s. str.) *pustulata* Schrank. — П. 25. V. 911.
- \* 81. *Ph.* (s. str.) *rufimana* Schrank. — Л. 27. V. 02.
- \* 82. *Ph.* (s. str.) *ephippium* F. — Кизерицкій (стр. 178).
- \* 83. *Ph.* (s. str.) *cylindrica* L. — П. 19. IV, 15. V. 910, 8. V. 913. 10. V. 914; Ваум. (p. 71).
84. *Ph.* (s. str.) *nigricornis* F. — П. 1. 18. V. 910.
- \* 85. *Ph.* (*Opsilia*) *coerulescens* Scop. — Карл. 11. V. 914; Д. 4. VI. 911.
86. *Oberea* (s. str.) *oculata* L. — Св. 5. VI. 910; Н.-С. 12. VI. 07, Барш. 8. VI. 912.
87. *O.* (*Amaurostoma*) *erythrocephala* Schrank. — Св. 8, 14. VI. 911; Ваум. (p. 71).

Какъ видно изъ перечня, наиболѣе подробно изслѣдованъ только Полтавскій уѣздъ, остальные же уѣзды, особенно сѣверные, затронуты только слегка и обѣщаютъ еще рядъ интересныхъ находокъ. Мы должны ожидать нахождения въ Полтавской губерніи представителей родовъ *Rhamnusium*, *Cortodera*, *Grammoptera*, *Deilus*, *Gracilia*, *Axinopalpis*, *Notorhina*, *Anaglyptus*, *Acanthoderes*, *Leipopus*; ряда видовъ *Leptura*, *Strangalia*, *Dorcadion*, *Saperda*, *Phytoecia* и мн. др. Въ общемъ же число видовъ, уже констатированныхъ для Полтавской губерніи весьма значительно и, какъ я уже указывалъ, не далеко отъ предѣльнаго (по приблизительному подсчету, здѣсь должно встрѣчаться около 110—115 видовъ усачей).

Изъ наиболѣе интересныхъ находокъ, уже сдѣланныхъ здѣсь, слѣдуетъ отмѣтить *Hesperophanes griseus* F., *Dorcadion sericatum* Кгуп. и *Exocentrus stierlini* Ganglb. Послѣдній, вѣроятно, широко распространенъ по всей средней Европейской Россіи и отсутствіе показаній его для этой полосы, повидимому, объясняется рѣдкостью находеній у насъ видовъ этого рода.