

# РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНИЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. И. Глазуновымъ, Н. Р. Кокуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-  
Тань-Шанскимъ, Т. С. Чичериннымъ, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ.

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

подъ редакціей  
В. В. Редикорцева.

## Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glazunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shanskif  
N. Shiriajev et T. Tschitscharin.

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie.

Rédacteur  
V. Redikorzev.

1917.

т. XVII



Петроградъ. — Petrograd.

26-я Государственная типография, Измайловский пр., д. 29.  
1921.

N. N. Plavilstshikov (Moscou).

Notices synonymiques sur les Longicornes (Coleoptera,  
Cerambycidae). II. \*).

[Musée Zoologique de l'Université de Moscou].

Н. Н. Плавильщиковъ (Москва).

Синонимическая замѣтка о жукахъ-усачахъ (Coleoptera,  
Cerambycidae). II. \*).

[Изъ Зоологического Музея Московского Университета].

26. *Acmaeops* (s. str.) *amurensis* Suvorov (1915) = *Acmaeops* (s. str.) *angusticollis* Gebl. (1833). — On peut consulter à ce sujet ma petite notice (Revue Russe d'Entom. XVI, 1916, p. 19).

27. *Acmaeops* (s. str.) *viridula* Matsumura (1911), Journ. of the College of Agricul., Tohoku Imper. Univers., Sapporo, IV, 1, p. 134 = *Acmaeops* (s. str.) *angusticollis* Gebl. (1833).

28. *Leptura cribripennis* Gahan (1906), Fauna Brit. Ind. Col., I, p. 85, nom. praecorrect. (*Leptura canadensis* Oliv. var. *cribripennis* J. Lec. 1859) = *Leptura gahani*, nom. n.

29. *Phymatodes albofasciatus* Motschulsky (1866), Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXIX, 1, p. 174, nom. praecorrect. (*Phymatodes varius* Fabr. var. *albofasciatus* Bland 1862) = *Phymatodes albincinctus* H. W. Bates (1873).

30. *Hesperophanes cinereus* Blanch. (1851) in Gay, Hist. Chile, V, p. 493, t. 28, f. 9, nom. praecorrect. (*Hesperophanes cinereus* Villers 1789) = *Hesperophanes gayi*, nom. n.

31. *Chlorophorus fulvicollis* Aurivillius (1908), Deutsche Ent. Zeitschr., p. 214, nom. praecorrect. (*Chlorophorus sartor* Müll. ab. *fulvicollis* Muls. 1862) = *Chlorophorus aurivillianus*, nom. n.

32. *Purpuricenus cinctus* Lameere (1890), Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, Bull. p. 213, nom. praecorrect. (*Purpuricenus koehleri* L. ab. *cinctus* Villa 1833) = *Purpuricenus lameerei*, nom. n.

\*) Revue Russe d'Entom., XV, 1915, p. 79.

33. *Anaglyptus abchasicus* Pic (1911), Mat. Longicorn., VIII, 1, p. 12 = *Anaglyptus simplicicornis* Reitt. (1906) ab.
34. *Dorcadion* (s. str.) *tristriatum* Suvorov (1913) = *Dorcadion* (s. str.) *striolatum* Kraatz (1873). — Consulter ma notice synonymique (Revue Russe d'Entom., XV, 1915, p. 225).
35. *Dorcadion* (s. str.) *scabricolle elisabethpolicum* Suvorov (1915), Revue Russe d'Entom., XV, p. 119 = *Dorcadion* (s. str.) *scabricolle* Dal m. ab.
36. *Dorcadion* (s. str.) *scabricolle mesmini* Pic (1903), l'Echange, XIX, p. 146 = *Dorcadion* (s. str.) *scabricolle* Dal m. ab.
37. *Dorcadion* (s. str.) *dobrovoljanskii* Suvorov (1915), Revue Russe d'Entom., XV, p. 116 = *Dorcadion* (s. str.) *scabricolle* Dal m. var.
38. *Dorcadion* (s. str.) *euxinum* Suvorov (1915), Revue Russe d'Entom., XV, p. 119 ne semble pas être une bonne espèce; il se rapporte plutôt à *D. sericatum* Kryn. comme variété.
39. *Saperda* (*Compsidia*) *innotatipennis* Pic (1910), l'Echange, № 301; Mat. Longicorn., VII, 2, 1910, p. 6 est une simple aberration du *Saperda* (*Compsidia*) *balsamiferae* Motsch. (1860).
40. *Saperda* (s. str.) *perforata pallidipes* Pic (1904), Mat. Longicorn., V, 1, p. 9 = *Saperda* (s. str.) *perforata* Pall. (1778) ab.
41. *Phytoecia infernalis* Pic (1904), l'Echange, № 231, p. 17 ne rentre pas dans le genre *Phytoecia* Muls.; c'est une espèce du genre *Thyestes* Thoms. et peut-être une variété de *Th. gebleri* Fal d. (1835).
42. *Stenocorus sachalinensis* Matsumura (1911), Journ. of the College of Agricult., Tohoku Imper. Univers., Sapporo, IV, 1, p. 133 n'est pas une espèce valable, mais une simple aberration de *St. amurensis* Kraatz (1879).