

**Énumération des Coléoptères recueillis par Mr. A.  
V. Martynov dans la Mandchourie.**

Par N. N. Plavilstshikov,

Directeur du Laboratoire Biologique du Technicum de l'Industrie et de  
l'Économie de Plechanov etc. Moscou.

La présente liste a été basée sur les matériaux, que Mr. A. Martynov a collectionné dans les environs de station Lamatenza de la province de Charbin; cette collection, déterminée par Mr. Edmond Reitter, se trouve dans le Musée Zoologique de l'Université de Moscou.

Les matériaux sont collectionnés plus ou moins accidentellement et le nombre des espèces recueillis par Mr. A. Martynov n'est pas grand, mais cette collection a bien d'intérêt complaisant nos connaissances, jusqu' à ces jours très fragmentes, sur la faune de la Mandchourie — premièrement elle donne plusieurs localités nouvelles pour une série des espèces, secondement, et enfin, dans cette collection se trouvent quelques formes nouvelles en partie décrites par Mr. E. Reitter, en partie par moi.

Les Coléoptères sont collectionnés préférablement dans les localités suivantes: 1. „les steppes à fleuve Daljaoche, en 50 kilomètres à l'ouest de Lamatenza“ et 2. Lamatenza, près de Fyn-Choua<sup>1)</sup>

1. *Platysma (Poecilus) gebleri* Dej. var. — D. VII. 07.
2. *Ophonus (Pardileus) tridens* A. Mor. — F. 5.—15. VII. 07,
3. *Harpalus (Pheugines) bungi* Chaud. — D. VII. 07. — On le rencontre de Transbaicalie, de la Mongolie, et de l'Altaj. Pour la Mandchurie (comme on sait) encore n'est pas indiqué.
4. *Anisodactylus* (s. str.) *signatus* Panz. — F. 20.—30. V. 07.
5. *Eretes sticticus* L. — F, 6.—12. VIII. 07. — Est trouvé dans la Chine et Japon; dans l'ouvrage de G. Jacobson<sup>2)</sup> n'est pas indiqué pour la Sibérie orientale.
6. *Graphoderes adamsi* Clarc. — D. VII. 07. — N'est connue comme provenant de la Mandchourie. A ce qu'il parait, une nouveauté pour la faune de l'Asie.
7. *Bledius (Blediodes) opacus* Block. — D. VII. 07. — Une nouveauté pour la faune de Mandchourie.

<sup>1)</sup> Cettes localités dans le texte sont mis par abbréviations: 1-re = D. et 2-me = F.

<sup>2)</sup> Jacobson, 9. Käfer Rußlands, 1908, p. 433.

8. *Coprophilus (Zonoptilus) pennifer* Motsch. var.? *marginalis* Reitt. — F. 6.—10. VI. 07. — Mr. G. Jacobson<sup>3)</sup> a attribué var. *marginalis* Reitt. pour le *Coprophilus eppelsheimi* Fauv., Mr. M. Bernhauer<sup>4)</sup> a mis *C. eppelsheimi* Fauv. au nombre des synonymes de *C. pennifer* Motsch. var. *marginalis* Reitt.
- La distribution géographique de la var. *marginalis* Reitt. (*eppelsheimi* Fauv.) montre que nous avons ici non une simple „variété“, mais une forme géographique, un subspecies — *Coprophilus (Zonoptilus) pennifer marginalis* Reitt. (1894) (= *eppelsheimi* Fauv. 1897 = *lateralis* Reitt. 1894 non Fauv. 1875).
9. *Plomascopus plagiatus* Mén. — D. VII. 07.
10. *Hister bissexseriatus* F. — F. 20.—30. V. 07. — Espèce nouvelle pour la faune de la Mandchourie.
11. *Malachius persimplex* Reitt. — D. VII. 07, 24 exempl. — Espèce décrite par Mr. E. Reitter de cette collection (Ent. Blätt., IV, 1908, p. 129).
12. *Collops dimidiatus* Plav. — D. VII. 05. — Décrite de cette collection (Ann. Mag. Nat. Hist., (9) XIII, 1924, p. 230).
13. *Opetiopalpus sabulosus martynovi* Plav. — D. VII. 05. — Décrite de cette collection (l. c., p. 231).
14. *Brachylacon binodulus* Motsch. — F. 6.—10. VII. 07.
15. *Agriotes subvittatus* Motsch. — F. VII. 07.
16. *Agriotes submarginalis* n. spec. Reitter (in litteris?). — F. VII. 07.
17. *Cardiophorus (Platynichus) decorus* Fald. var.? — D. VII. 07. Probablement une des espèces Chino-japonaises du subgenre *Platynichus* Motsch.: *C. decorus* est une espèce de la Méditerranée et n'est pas répandue à l'orient loin que la province Transcaspienne.
18. *Dermestes cadaverinus* F. var. *domesticus* Germ. — F. 5.—15. VII. 07.
19. *Hydrophilus affinis* Sharp. — F. 6.—12. VIII. 07.
20. *Cercyon* (s. str.) *quisquillus* L. — D. VII. 07. — Une nouveauté pour la Mandchourie (n'est pas connue de la Sibérie).
21. *Carpophilus* (s. str.) *hemipterus* L. — F. VI. 07. — Une nouveauté pour la Mandchourie.

<sup>3)</sup> Jacobson, 9. l. c., p. 468.

<sup>4)</sup> Bernhauer, M. et Schubert K. Staphylinidae II. in: Junk et Schenkling, Coleopt. Catal., pars 29, 1911, p. 89.

22. *C. (s. str.) chalybaeus* Murr. var. *punctatissimus* Reitt. — D. VII. 07.
23. *Meligethes ? picipes* Sturm. — D. VII. 97.
24. *Olibrus permicans* Reitt. — D. 6.—10. VII. 07. — 3 exempl. — Espèce décrite par Mr. E. Reitter de cette collection (C. Rundschau, II, 1913, p. 126).
25. *Hippodamia tredecimpunctata* L. — D. VII. 07. — 26. *Tytthaspis sedecimguttata* L. — F. VI, D. VII. 07. — Une nouveauté pour la Mandchourie. La distribution de cette espèce dans l'Orient est bien inconnue; Mr. G. Jacobson (op. cit., 1915, p. 981) l'a indiqué pour le gouvernement de Tomsk en Sibérie et pour la Mongolie boréale seules.
27. *Coccinella quatuordecimpustulata* L. — D. VII. 07.
28. *Harmonia axyridis* Poll. — D. 15.—30. VII. 07.
29. *Propylaea quatuordecimpunctata* L. — D. VI. 07.
30. *Notoxus binotatus* Gebl. — D. VII. 07. — Une nouveauté pour la Mandchourie.
31. *Lytta pallasii* Gebl. — D. VII. 07.
32. *Agapanthia amurensis* Kraatz. — D. VII. 07.
33. *Thyestes gebleri* Fald. — D. VII. 07.
34. *Cryptocephalus labiatus* L. — D. 25.—30. VII. 07.
35. *C. parvulus* Müll. — D. 1.—10. VII. 07.
36. *C. bohemicus* Drap. — D. 1.—10. VII. 07.
37. *Parnops jacowlewi* Reitt. — Kourashi, 1905; F. 6.—10. VI. D. VII. 07.
38. *Pachnephorus sabulosus* Gebl. — D. 20.—30. VII. 07.
39. *Chrysochus chinensis* Baly. — D. VII. 07.
40. *Entomoscelis orientalis* Motsch. — D. VII. 07.
41. *Chrysomela quadriimpressa* Motsch. — D. VI. 07.
42. *Chr. graminis* L. var. *virgata* Motsch. — D. 1.—10. VII. 07,
43. *Chr. gemmata* Motsch. — D. 25.—30. VII. 07.
44. *Plagioderia laevicollis* Reitt. — D. 1.—10. VII. 07, 14 ex.
45. *Melasoma populi* L. — D. 25. 30. VII. 07.
46. *Luperus pallidus* Reitt. — D. VII. 07.
47. *Luperodes praeustus* Motsch. — D. VII. 07.
48. *Phyllodecta vulgatissima* L. — D. 1.—10. VII. 07.
49. *Haltica fastidiosa* Fairm. — D. VII. 07.
50. *Galerucella pusilla* Duft. — D. VII. 07.
51. *Galerucesthis thalassina* Fald. — D. VII. 07.
52. *G. aenescens* Fairm. — F. 1905.

53. *Pallasia absinthi* Pall. — F. 1905.
54. *Monolepta biarcuata* Weise. — F. V. 07.
55. *Chlorophanus brachythorax* Motsch. — D. 28. VII. 07.
56. *Chl. aurifer* Faust. — D. 28. VII. 07.
57. *Phyllobius pseudopomonae* Reitt. — F. VI. 07.
58. *Sitona cylindricollis* Fahr. — VII. 07.
59. *S. lineella* Boisd. var. — D. 28. VII. 07.
60. *S. lateralis* Gyllh. — D. 28. VII. 07.
61. *Corigetbes marmoratus* Desbr. — F. VII. 07.
62. *Chloebius kozhevnikovi* Reitter (in litt.?). — D. 1.—10. VII. 07, 17 exempl.
63. *Phytonomus rumicis* L. var. — D. VII. 07.
64. *Cleonus piger* Scop. — D. VII. 07. [? N. P.]
65. *Lepyrus christophi* Faust var. *notabilis* Faust. — D. 25.—30. VII. 07.
66. *L. japonicus* Roel. — F. 6.—10. VI. 07.
67. *Miarus campanulae* L. — F. VI. 07.
68. *Apoderus erythropterus* Gmel. — D. 1.—10. VII. 07.
69. *Amomphus virescens* Bon. — F. 8.—10. VI. 07.
70. *Cyphicerus obliquesignatus* n. sp. (Reitter, in litt.?) — D. 28. VII. 07. 28 exempl.

Il y a outre des énumérées un rangée des formes déterminées à nomme des genres seules; ces sont: *Rhanthus*, *Berosus*, *Hyphydrus*, *Cardiophorus*, *Agrilus*, *Seriscius*, *Verania*, *Scymnus*, *Mordellistena*, *Epicauta*, *Blaps*, *Piazomias*, *Gynandrophthalma*, *Labidostomis*, *Colasposoma*, *Luperus*, *Luperodes*, *Crepidodera*, *Cryptocephalus* (3 espèces), *Coptocephala Pachybrachis* (2 espèces), *Longitarsus* (2 espèces), *Psylliodes* (2 espèces), *Nodostoma* (4 espèces), *Cassida*, *Chalcoides*, *Enoplurus*, *Rhynchites*, *Coelambus* et les autres.

---