

Neue Strangalia-Formen (Coleoptera, Cerambycidae).

Von N. N. Plavilstshikov in Moskau.


(Mit 2 Abbildungen).

Strangalia (s. str.) **thoracica** Creutz ab. **nigropilosa** nova.— Bei *Str. thoracica* Creutz sind die Flügeldecken schwarz und gewöhnlich auch schwarz behaart; seltener sind die Flügeldecken orangerot und da gewöhnlich gelb behaart (ich habe alle rote Formen geprüft). Zwischen den ab. *ussurica* Pic-Exemplaren habe ich ein Exemplar mit schwarz behaarten Flügeldecken gefunden: diese Form nenne ich ab. *nigropilosa*. — Ut ab. *ussurica* Pic, sed elytris nigro-pilosis. — Ussuri.

Strangalia nigra L. ab. **fulvopilosa** nova.— Ut forma typica, sed elytris fulvo aut cinereo-fulvo pubescentibus. — Bessarabia: Soroki, 13. VI. 1912 (Panin leg!). — Die ganz analoge Form wie *Str. aethiops* Poda ab. *letzneri* Fabr., *Str. thoracia* Creutz. ab. *stictipes* Heyr., *Leptura scutellata* F. ab. *stichai* Heyr. Flügeldecken sind nicht schwarz, sondern gelb behaart.

Strangalia (s. str.) **hecate** Rtt. ab. ♀ **anthracipennis** nova. — Corpore toto nigro, femoribus rubris. — Talass-Alatau, 6-7000, K. Aris! — Ganz schwarz, nur die Schenkel dunkelrot.

Strangalia (s. str.) quadrifasciata caucasica Plav. ab. **inscripta** nova. — Fasciis 1-3 fortissime recurvatis: fascia prima ut maculis duabus parvis lateralibus, fascia secunda ut macula transversa laterali, fascia tertia ut macula dorso-laterali videatur. — Cauc. occ.: Circassia, Sotshi, 16. VI. 1914 (coll. mea!). — Mit ab. *biiinterrupta* Plav. und ab. *suramensis* Plav. am nächsten verwandt. Flügeldeckenbinden stark reduziert: 1-te Binde durch zwei kleine Lateralflecken, 2-te Binde durch eine quere Lateralmakel und 3-te Binde durch eine quere Makel, welche den Rand und die Naht nicht erreicht, dargestellt (Fig. 1).



Strangalia quadrifasciata caucasica Plav. ab **incognita** n. — Fasciis 1-3 fortissime recurvatis: fascia prima ut macula parva laterali, fascia secunda ut maculis duabus parvis lateralibus, fascia tertia ut macula dorso-laterali videtur. — Cauc. occ.: Circassia, Atshish'cho, IX. 1913 (Zhicharev olim leg.!) — Mit ab. *inscripta* sehr nahe stehend. 1-te Binde bis zu einer kleinen Lateralmakel, 2-te Binde bis zu zwei kleinen Lateralmakeln, 3-te Binde bis zu einer dorso-lateralen Makel reduziert (Fig. 2).