

М. Е. Тер-Минасян

НОВЫЕ ВИДЫ CLEONINAE
(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) ИЗ АФГАНИСТАНА

В сборах О. Н. Кабакова в Афганистане за 1970—1973 гг., переданных мне для определения, были обнаружены новые виды, описание которых дается в настоящей статье. Голотипы и часть паратипов описанных видов хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР, часть паратипов — в коллекции О. Н. Кабакова, которому выражаю искреннюю благодарность за предоставление интересного материала.

Larinus (Larinomesius) afghanicus Ter-Minassian, sp. n.

Головотрубка короткая и толстая, слегка расширена к вершине, не длиннее или едва длиннее половины переднеспинки, вдавления над глазами слегка возвышают срединную часть головотрубки, на которой по середине явственного кия нет, но сверху по бокам вдоль срединной линии имеются явственные, но не глубокие вдавления. Скульптура головы и головотрубки скрыта под густыми тонкими серыми волосками. Лоб не уже головотрубки у основания. 1-й членик жгутика усиков почти вдвое длиннее 2-го, который слегка длиннее остальных, поперечных. Булава довольно крупная, овальная с заостренной вершиной, глаза заметно заострены книзу. Переднеспинка явственно поперечная, у основания почти на $\frac{1}{4}$ шире своей длины у середины, основание посередине полукругло вытянуто к щитку, бока явственно закруглены и постепенно сужены кпереди, перед вершиной с явственной перетяжкой, заглазничные лопасти явственные, полукруглые, диск не сильно, но явственно выпуклый; скульптура на диске переднеспинки двойная — крупная, более редкая, и в промежутках между крупными точками густая и мелкая. Очень тонкие серые волоски образуют продольную полосу на середине диска переднеспинки и довольно широкие полосы на боках переднеспинки, внутренний край которых посередине сужен и изогнут к центру. Щиток небольшой, узкий, продолговатый. Надкрылья у основания явственно шире переднеспинки, с прямым основным краем, с параллельными боками, на $\frac{1}{3}$ длиннее общей ширины плеч, с тонкими линейвидными бороздками и широкими и плоскими промежутками, покрыты тонкими серыми волосками, которые сгущены в виде полосы вдоль шва, у наружного края надкрылий и образуют мелкие пятна между этими полосами. Ноги умеренно толстые, густо покрыты серыми волосками, 2-й членик задних лапок поперечный, брюшко также густо покрыто серыми волосками. Длина 9—11 мм.




Рис. 1—6. Эдеагус видов Cleoninae
 1, 2 — *Larinus cariomonti* (1 — сверху, 2 — сбоку); 3, 4 —
L. afghanicus sp. n. (3 — сверху, 4 — снизу); 5, 6 — *Temnorhinus*
discrepans sp. n. (5 — сверху, 6 — снизу)

Голотип ♂: Афганистан: пров. Орузган, Хаберан, 26 IV 1970. Паратипы: 2 ♀ — там же; 1 ♂, пров. Газни, сев.-зап. Мукур, 28 V 1973. 2 ♂: 2200 м, пров. Орузган, Шахрестан, 3, 6 VII 1970; 4 ♀, там же.

Близок к *L. cariomonti* Faust, от которого отличается отсутствием крупной ямки на лбу, боковая полоса на переднеспинке не образует осо-

бого зубца, а лишь заострена у середины, точки в бороздках надкрылий сливаются или трудно различимые, более крупными размерами, а также формой вершины эдегуса (рис. 1—2, 3—4).

***Temnorhinus discrepans* Ter-Minassian, sp. n.**

Головотрубка не длиннее $\frac{2}{3}$ переднеспинки, резко сужена к вершине, с сильным килем посередине, по обеим сторонам которого в основной части головотрубки явственные, широкие, ниспадающие к бокам вдавления, перед серединой головотрубки эти вдавления ограничены поперечными косыми килями, затем на вершинной трети головотрубки по обеим сторонам срединной линии имеются продольные вдавления. Стволик усиков тонкий и длинный, почти равен по длине жгутику. 2-й членик жгутика более чем втрое длиннее 1-го; остальные мало отличаются по длине, поперечные; булава узкая, удлинённая, с заостренной вершиной. Глаза сильно заострены книзу. Длина переднеспинки по средней линии почти равна ее ширине у основания, передний край посередине и середина основания дуговидные, заглазничные лопасти явственно выражены, диск и бока заметно выпуклые; переднеспинка покрыта довольно редкими, крупными, ямкообразными точками, между которыми очень густо и мелко точечная. На середине основания сверху имеется довольно крупная ямка. Переднегрудь и бока переднеспинки довольно густо покрыты серыми 3-вершинными чешуйками, из которых срединная вершинка длиннее боковых. Щиток треугольный, небольшой. Надкрылья не менее чем вдвое длиннее ширины плеч, от плеч с овально-расширенно-закругленными боками, наибольшей ширины за серединой, в вершинной трети, с довольно глубокими точечными рядами, точки в которых не сливаются; промежутки широкие, выпуклые, покрыты трехлопастными чешуйками с удлинённой срединной лопастью. Ноги тонкие, длинные. Задние лапки с удлинёнными 1—2 члениками; последний членик длинный, длиннее первых трех вместе, изогнутый, утолщен к вершине, коготки толстые, сросшиеся у основания. Брюшко покрыто 3—4-вершинными чешуйками. Длина 15—17 мм.

Голотип: ♂: Афганистан, 1100 м, пров. Кандагар западнее Спинбулдака. Паратипы: 5 ♂ и 2 ♀, там же.

От всех видов *Temnorhinus* отличается своеобразным строением верха головотрубки, которая покрыта глубокими вдавлениями перед серединой и за серединой. Эдегус — рис. 5—6.