



ЗАМЕТКИ

Нова знахідка Gracillaridae в Українському Поліссі [New Finds of Gracillaridae in Ukrainian Polissya]. — *Caloptilia robustella* (Jackh, 1972) (Lepidoptera, Gracillaridae), ♂, Васильків (Київська обл.), 15.10.2001 (Василюк). Вид був відомий з західної Європи (Англія, Нідерланди, Данія, Австрія, південь Скандинавії). В Україні виявлений недавно, у Гірському Криму (2 сг, Краснолісся) (Бідзіля, Будашкін, in press). В Украшському Поліссі зафіксований вперше. — **О. В. Василюк** (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

Новые для фауны Украины виды скрытников (Coleoptera, Lathridiidae) [New Records of the Lathridiidae Beetles (Coleoptera) in Ukrainian Fauna]. — При изучении фондовых коллекций Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев) и Музея природы Харьковского национального университета нами обнаружено 5 новых для фауны Украины видов жуков семейства Lathridiidae. *Dienerella clathrata* (Mannerheim, 1844) — вид распространен по всей Европе к югу от линии Париж—Прага. Новые находки на территории Украины: сг, г. Киев, берег р. Днепр, Лысая гора, почвенные ловушки, 6–11.06.2000 (Назаренко); 3 ♂, Украина, г. Киев, ур. Лысая Гора, почвенные ловушки, 12–27.08.2000 (Назаренко); 2 сг, д, Каневский заповедник, гнездо рыжей полевки, 30.05.1978, № 213 (Головач, в коллекции А. А. Петренко); ♂, Каневский заповедник, гнездо рыжей полевки, 13.12.1978, № 222 (Головач, в коллекции А. А. Петренко). *Corticaria obscura* Ch. Brisout, 1863 — ареал вида включает Западную, Южную и Среднюю Европу, Кавказ, Алжир. Новые находки: 5 экз., Крым, Бахчисарайский р-н, окр. с. Танкового, сухой солнечный склон, в сухих колосках *Asphodeline* sp., 2.05.1999 (Дрогваленко); 2 экз. Крым, Судакский р-н, окр. с. Морское (Чабан-Куле), кошение по ксерофитным каменистым склонам, поросшим каменным дубом, фисташкой и кустами, 30.04.2001 (Надеин); ♂, Украина, окр. г. Черновцы, Садгора, луг на склонах горы, кошение, 6.06.2001 (Назаренко). *Corticaria dubia* Dajoz, 1970 — вид описан из Испании, известен также из Англии и Трансильвании. Новые находки: ♂, Крым, Ай-Петринская яйла, под корой сосны на мицелиальной пленке *Trichaptum abietinum*, 7.05.1999, № 622 (Дрогваленко); ♀, Крым, Караби-яйла, гора Иртыш, лес, в норе, 2.05.1996 (Юнаков). *Melanophthalma sericea* (Mannerheim, 1844) — ареал вида включает страны Средиземноморья, Дагестан, Иран, Афганистан. Новые находки: 3 ♂, Херсонская обл., Черноморский заповедник, уч. Ягорлытский Кут, на листьях лоха серебристого, 14.07.1994 (Дрогваленко). *Melanophthalma fuscipennis* (Mannerheim, 1844) — ареал вида включает Южную и Среднюю Европу, Средиземноморье, Кавказ. Новые находки: 1 экз., Крым, Судакский р-н, окр. с. Морское (Чабан-Куле), кошение по ксерофитным каменистым склонам, поросшим каменным дубом, фисташкой и кустами, 30.04.2001 (Надеин). — **Т. А. Трихлеб** (Донецкий национальный университет).