

К ФАУНЕ ЖУКОВ-ПИЛОУСОВ (COLEOPTERA: HETEROCERIDAE) СРЕДНЕГО И
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

ON THE FAUNA OF VARIEGATED MUD-LOVING BEETLES (COLEOPTERA:
HETEROCERIDAE) OF THE MIDDLE AND LOWER VOLGA REGION

А.С. Сажнев

A.S. Sazhnev

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,
ул. Астраханская, д. 83, Саратов, 410026, Россия

e-mail: sazh@list.ru

Chernyshevsky Saratov State University
ul. Astrakhanskaya 83, Saratov, 410026, Russia

Резюме. На исследуемой территории обнаружено 12 видов пилоусов. *Augyles flavidus* приводится для Поволжья впервые. Из Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстан на данный момент известно по восемь видов, из Саратовской области – девять видов пилоусов, для Астраханской области приводится 10 видов, а с территории Волгоградской области и Республики Калмыкия по два вида пилоусов.

Abstract. A total of 12 variegated mud-loving beetles have been recorded in the study area. Currently, eight species of this family are known from each of the following three territories: Samara Oblast, Ulyanovsk Oblast and the Republic of Tatarstan; nine species are known from Saratov Oblast; ten species are recorded from Astrakhan Oblast; two species are recorded from Volgograd Oblast and two from the Republic of Kalmykia.

В настоящем сообщении приводятся сведения по видовому составу семейства жуков-пилоусов (Coleoptera: Heteroceridae) в Среднем и Нижнем Поволжье, дополняющие полученные ранее данные (Литовкин, Сажнев, Клёмин, 2013).

Пилоусы (Heteroceridae MacLeay, 1825) – небольшое всесветно распространённое семейство жесткокрылых. Мировая фауна семейства не ревизована, однако, известно более 330 видов. В Палеарктике отмечено 93 вида из 3 родов: *Augyles* (60 видов), *Heterocerus* (31 вид), *Micilus* (2 вида) (Mascagni, 2006). На территории России на данное время отмечено 19 видов семейства из двух родов (*Augyles*, *Heterocerus*) (Сажнев, 2013б), из них 14 видов – в Европейской части страны (Зайцев, 1916; Кирейчук, 2001; Сажнев, 2012, 2013б; Zaitzev, 1908; Mascagni, 2006).

Наиболее ранние сведения по гетероцеридам Поволжья мы находим в классических трудах К.Э. Линдемана (Линдемман, 1871), Ф.А. Зайцева (Zaitzev, 1908) и Г.Г. Якобсона (Якобсон, 1913), в которых приведены достаточно полные (для того времени) списки жесткокрылых, в том числе и пилоусов, с указанием точек их нахождения. Из специальных работ позапрошлого века заслуживает внимания работа А.А. Силантьева (Силантьев, 1894). Его сборы проводились на территории Саратовской области в водоемах бассейна реки Хопер (с. Пады). Он указывает 2 вида из семейства Heteroceridae. Дополнительные сведения по фауне гетероцерид Саратовской области мы находим в труде Н.Л. Сахарова (Сахаров, 1905), для Республики Татарстан в статьях А.Г. Лебедева (Лебедев, 1906, 1912), а так же в обобщающих работах Ф.А. Зайцева (Зайцев, 1916, 1928) по югу Поволжья (в пределах Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей по современному территориальному