

1997

1997. -208 .

- Coleoptera (. . . , . . . ,
 . . . , . . . , . . . , . . . , . . . ,
 . . . , . . .): 59-128.

- Coleoptera
- Carabidae
- 383. *Cicindela germanica* Linnaeus, 1758: 5 .
- : 1987 - 5 .
- 384. *Cicindela sylvatica* Linnaeus, 1758: 3 .
- 1972 - 3 .
- 385. *Omophron limbatus* (Fabricius, 1776) / , 1988.
- : 87 .

- : 1973 - 54 , 1994 - 15 ; : 1993
- 18
386. *Leistus ferrugineus* (Linnaeus, 1758) / , 1992.
: 3 .
- : 1989 - 1 ; - : 1989 -
2 .
387. *Leistus terminatus* (Hellwig, 1793) / , 1992.
: 24 .
- : 1989 - 2 , 1
; : 1989 - 1 ; : 1987 - 10
: 1987 - 1 , 3 ; -
: 1989 - 1 , 1989 - 1 ;
- : 1989 - 2 , 1
, 1 ; - : 1987 - 1
388. *Nebria livida* (Linnaeus, 1758): 8 .
: 1973 - 4 , 1993 - 2
, 1994 - 1 juv. ; : 1994 -
1 juv. .
389. *Nebria brevicollis* (Fabricius, 1792) / , 1992.
: 63 .
- : 1989 - 1 ; - : 1989
- 40 ; : 1989 - 13 ; - : 1987 - 4 ;
- : 1987 - 1 ; - : 1989 - 4 .
390. *Notiophilus aquaticus* (Linnaeus, 1758) / , 1992.
: 9 .
: 1987 - 2 ; - : 1989 - 1
; - : 1987 - 3 ; :
1987 - 1 , 1994 - 1 juv. ;
- : 1994 - 1 .
391. *Notiophilus palustris* (Duftschmid, 1812) / , -
, 1980.
: 18 .
: 1987 - 2 ; - : 1987 -

- 7 , 1989 - 3 ; - : 1987 - 1 ; :
 1987 — 2 , 1994 - 2 , 1994 - 1 juv.
392. *Notiophilus germinyi* Fauvel, 1863: 16 .
 : 1973 - 8 , 1987 - 2 ;
 : 1994 - 6 .
393. *Notiophilus biguttatus* (Fabricius, 1779) / , 1992.
 : 8 .
 : 1987 - 3 ; - : 1989 - 1
 ; : 1994 - 3 ;
 - : 1989 — 1 .
394. *Calosoma inquisitor* (Linnaeus, 1758) / , 1985.
 : 29 .
 - : 1989 - 3/1 ; : 1989 - 7
 ; - : 1987 - 4 , 1989 - 8/6 .
395. *Calosoma auropunctatum* (Herbst, 1784) / ,
 1985.
 : 12 .
 : 1973 - 10 ; : 1973 - 2 .
396. *Calosoma denticolle* Gebler, 1833: 1 .
 : 1993 - 1 .
397. *Calosoma investigator* (Illiger, 1798) / , 1985.
 : 8 .
 : 1993 - 1 ; : 1993 - 7 .
398. *Carabus arvensis* Herbst, 1784 / , 1990.
 : 666 .
 - : 1989 - 42/35 , 3/5 -
 ; : 1987 - 137 ; - :
 1987 - 1 , 186 , 1
 , 1989 - 9/9 ; : 1989 - 2/1
 , 1/0 , 1994 - 2/2
 , 1994 - 1 juv. ; -
 : 1987 - 95 , 1989 - 6 ; : 1987
 - 45 , 1994 - 1/3 , 6
 juv. ; - : 1987 - 8

- , 1989 - 1 /0 , 0/2 ;
- : 1987 - 35 1994 - 2/0
; - 1989 - 2/3
, 1/0 ; - 1987 -
19
399. *Carabus cancellatus* Illiger, 1798 / , 1989.
400. *Carabus granulatus* Linnaeus, 1758 / , 1990.
: 135 .
— : 1989 — 1/2 , 3/0
; : 1987 - 8 ; - -1987 - 16
, 14 , 1989 - 2/1
; : 1989 - 7/4 , 1/3
, 1994 - 1 juv. ; — : 1987 - 11/4
, 1 ; : 1987 - 7
, 8 ; - :
1987 - 12 , 2/2 ,
1989 - 0/2 ; - : 1987 - 1
, 3 juv. ; - : 1989 - 6/11
, 1 juv. , 1 /0
401. *Carabus excellens* Fabricius, 1798 / , 1987.
: 18 .
: 1987 - 1 ; - : 1987 - 3
, 1989 - 0/1 , 1/0 ;
: 1989 - 0/2 , 1/0
; - : 1987 - 1/2
; : 1987 - 4 , 1
; - : 1989 - 0/1
402. *Carabus nemoralis* Müller, 1764: 1 .
: 1994 - 1 juv.
403. *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761: 44 .
- : 1989 — 2/2 ; : 1987 - 4
; - - 1987 - 10 , 1989 -
3/0 ; : 1972 - 4
, 1989 - 1/0 ;

- 1987 - 12 ; : 1987 - 3
, 1994 - 1 juv. ; -
- 1987 - 2 .
404. *Carabus glabratus* Paykull, 1790 / , 1992.
: 55 .
: 1994 - 0/1 , 4 juv.
; - : 1987 - 1 ; :
1994 - 12/20 ; - : 1994 -
10/7 .
405. *Carabus hortensis* Linnaeus, 1758: 1 .
: 1994 - 1 juv. .
406. *Carabus marginalis* Fabricius, 1794 / , 1989.
: 20 .
- : 1987 - 1 ; : 1987 - 2 ,
1994 - 2/3 ; — : 1987 - 1
; - : 1987 - 1 , 1994 - 5/5
407. *Carabus violaceus* Linnaeus, 1758 / , 1989.
: 63 .
- : 1989 — 1 juv. ; :
1987 - 2 ; - : 1987 - 3
, 1 juv. , 3 juv. ; : 1989
- 1/0 ; - : 1987 - 6
; : 1987 - 32 , 1994 - 0/1
; — : 1987 - 1/0
, 1989 - 0/5 ; - : 1987 - 1
juv. , 1994 - 0/2 ;
~ : 1989 - 1/1 ; —
- 1987 - 2 juv. .
408. *Carabus coriaceus* Linnaeus, 1758 / , 1989.
: 98 .
- : 1989 - 0/1 ; : 1987 - 3
; - : 1987 — 1 , 1
, 1989 - 0/1 , 2 juv. ; : 1989 - 1/0
; - : 1987 - 1, 1 juv. ; : 1987 -
28 , 1994 - 3/1

- ; — : 1987 - 1
, 4 , 1989 - 1/1 ; -
: 1987 - 9 , 1994 - 3/4
; - : 1989 - 1
, 2/8 , 4/13 ;
- : 1987 - 2 , 1
- Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) / , 1992.
: 11 .
: 1994 - 1/2 ; - : 1987 - 1
; - : 1994 - 5/2
410. Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758) / , ,
1980.
: 3 .
: 1993 - 2 ;
: 1994 - 1
411. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) / , ,
1980.
: 54 .
- : 1989 — 10 ; : 1987 - 2
; - : 1987 - 5 , 1989 - 1 ; i : 1989 -
0/1 ; - : 1987 - 0/1 ;
: 1987 - 8 , 16 , 1994 - 2/1
; - : 1987 - 4
; - : 1987 - 2 ,
1994 - 1/0
412. Clivina collaris (Herbst, 1784): 4 .
: 1993 - 3 ; : 1987 - 1
413. Clivina fossor (Linnaeus, 1758) / , 1992.
: 139 .
- - 1989 - 15 ; : 1987 - 1, 4 juv.
, 47, 18 juv. ; -
: 1989 - 5 ; - : 1987 - 2
, 12 -

- ; . 1987 - 1 , 18
 ; - : 1987 - 1
 , 7 , 1989 - 2 ; - :
 1989 - 6
414. *Dyschirius obscurus* (Gyllenhal, 1827): 18 .
 . 1973 - 10 ; : 1993 - 8
415. *Dyschirius thoracicus* (Rossi, 1790): 153 .
 1993 - 112 , 1994 - 11
 ; : 1993 - 30
416. *Dyschiriodes globosus* Herbst, 1783 / , 1990.
 : 118 .
 : 1987 - 1 , 36 ; -
 : 1989 - 1 ; : 1989 - 1
 ; - : 1987 - 1 , 6
 ; : 1987 — 5 , 42
 ; - : 1987 - 23 ,
 1 ; - : 1989 - 1 .
417. *Dyschiriodes neresheimeri* (Wagner, 1915): 6 .
 : 1973 - 6
418. *Dyschiriodes politus* Dejean, 1825: 7 .
 : 1993 - 7
419. *Dyschiriodes aeneus* Dejean, 1825 / , 1992.
 : 5 .
 : 1987 - 2 ; : 1993 - 2
 ; : 1987 - 1
420. *Dyschiriodes tristis* (Stephens, 1827): 3 .
 : 1994 - 3
421. *Brosicus cephalotes* (Linnaeus, 1758): 6 .
 : 1993 - 6
422. *Miscodera arctica* (Paykull, 1798) / , 1992.
 : 1 .
 - : 1989 - 1 .
423. *Blemus discus* (Fabricius, 1792): 4 .
 - 1993 - 4 .

424. *Epaphius rivularis* (Gyllenhal, 1810): 2 .
: 1993 - 1 , 1994 1/0
425. *Epaphius secalis* (Paykull, 1790) / , 1988.
: 456
- : 1989 - 5 ; : 1989 - 2
, 1 ; : 1987 -
44 , 96 , 1994 -
22 ; — : 1987 — 32
, 72 ; 1989 - 6
, 3 ; -
: 1987 -46 , 1994 — 19
; - : 1989 - 60
, 41 ; -
: 1987 - 5 , 2
426. *Trechus quadristriatus* (Schrank, 1781): 12 .
: 1993 - 12 .
427. *Tachyta nana* (Gyllenhal, 1810): 5 .
: 1994 - 5 .
428. *Asaphidion flavipes* (Linnaeus, 1761) / , 1992.
: 1 .
- : 1989 - 1 .
429. *Bembidion argenteolum* (Ahrens, 1812): 2 .
: 1993 - 2 .
430. *Bembidion litorale* (Olivier, 1790): 34 .
: 1973 - 8 ; : 1993 -12
, 1994 - 14 .
431. *Bembidion velox* (Linnaeus, 1761): 7 .
: 1973 - 7 .
432. *Bembidion striatum* (Fabricius, 1792): 8 .
: 1993 - 8 .
433. *Bembidion pygmaeum* (Fabricius, 1792): 4 .
: 1973 - 4 .

434. *Bembidion lampros* (Herbst, 1784): 15
: 1987 - 1 ; 1973 - 14 .
435. *Bembidion properans* (Stephens, 1829): 383 .
: 1987 - 33 ; - : 1989 - 28 ;
: 1989 - 2/0 , 1973 - 27 ;
- : 1987 - 33 ; : 1987 — 144
; - : 1987 - 116 .
436. *Bembidion punctulatum* Drapiez, 1820: 3 .
: 1994 - 3 .
437. *Bembidion ruficolle* (Panzer, 1797): 6 .
: 1973 - 6 .
438. *Bembidion obliquum* Sturm, 1825: 11 .
: 1993 - 11 .
439. *Bembidion semipunctatum* (Donovan, 1806): 33 .
: 1994 - 33 .
440. *Bembidion varium* (Olivier, 1795): 52 .
: 1993 - 35 , 1994 - 17 .
441. *Bembidion dentellum* (Thunberg, 1787): 11 .
: 1993 - 11 .
442. *Bembidion biguttatum* (Fabricius, 1779) / , 1983.
: 1 .
: 1987 - 1 .
443. *Bembidion guttula* (Fabricius, 1792) / , 1992.
: 2 .
: 1989 - 1 ; : 1987 - 1 .
444. *Bembidion azurescens* Dalla Torre, 1877: 24
: 1973 - 18 ; : 1993 - 6 .
445. *Bembidion gilvipes* Sturm, 1825: 1 .
: 1973 - 1 .
446. *Bembidion assimile* Gyllenhal, 1810 / , 1983.
: 3 .

- : 1987 - 3
447. *Bembidion quadrimaculatum* (Linnaeus, 1761): 3
 - : 1989 - 2 ; : 1987 - 1
448. *Bembidion andreae polonicum* Müller, 1830: 4
 : 1993 - 4
449. *Bembidion femoratum* Sturm, 1825: 36
 : 1973 - 4 ; : 1993 - 15
 , 1994 - 17
450. *Bembidion bruxellense* Wesmael, 1835: 15
 : 1993 - 7 , 1994 - 8
451. *Patrobus atrorufus* (Strom, 1768) / , 1992.
 : 189
 - : 1989 - 1 ; : 1989 - 13
 , 1 ; ; —
 : 1987 — 5/7 ; : 1987 - 58
 , 3 , 1994 - 0/2
 ; - : 1987 — 28
 , 1 , 1989 - 2
 , 1 ; — : 1987 - 11
 ; - : 1989 - 38 , 1
 ; - : 1987 - 17
452. *Stomis pumicatus* (Panzer, 1796): 16
 : 1994 - 1/0 ; : 1994 - 10/3
 , 2
453. *Poecilus cupreus* (Linnaeus, 1758) / , 1992.
 : 204
 - : 1989 - 1 juv. ; : 1987
 - 89 ; - : 1989 - 0/1 ;
 , 21/17 ; : 1989 - 1/0 ;
 - : 1987 - 15 ; : 1987 - 1
 , 56 ; - : 1987 - 1
 ; - : 1987 - 0/1

454. *Poecilus versicolor* (Sturm, 1824) / , 1992
: 407
: 1987 - 2 , 3 , 161
, - : 1989 - 8/3
, 20/26 ; : 1989 - 2/4 ;
- 1987 - 28 ; : 1987 - 143
, 1994 - 1 juv. ; - : 1987 - 4
, 1989 - 1 ; - : 1989 - 1
455. *Poecilus lepidus* (Leske, 1785) / , 1983.
: 8
: 1987 - 1 ; - : 1989 - 0/1
; : 1989 - 0/1 ; -
: 1987 - 2 ; : 1987 - 2 ; -
: 1989 - 0/1
456. *Poecilus punctulatus* (Schaller, 1783): 6
: 1973 - 6
457. *Pterostichus niger* (Schaller, 1783) / , 1992.
: 53
- : 1989 - 1 juv. ; -
: 1987 - 1 , 1989 - 1 ;
: 1987 - 7 , 5 ,
1994 - 0/1 ; - : 1987 - 1/4
, 2 , 1989 - 2/4
, 1/0 , 3/2
; - : 1987 - 0/1
, 1994 - 1/1 ; - : 1989
- 8/7
458. *Pterostichus vernalis* (Panzer, 1796) / , 1988.
: 35
: 1987 - 5 ; - : 1989 - 11 ;
- : 1987 - 1 ; : 1987 - 1
, 17
459. *Pterostichus anthracinus* (Illiger, 1798) / , 1992.
: 11
: 1987 - 2 , 1

- ; - : 1989 - 0/4 ; : 1989 - 0/1
; : 1987 - 3 .
460. *Pterostichus gracilis* (Dejean, 1828): 2 .
: 1993 - 2 .
461. *Pterostichus minor* (Gyllenhal, 1827) / , 1992.
: 2 .
: 1987 - 1 , - : 1989 - 1
462. *Pterostichus nigrita* (Paykull, 1790) / , ,
1980.
: 179 .
- : 1989 - 95 ; : 1987 - 1
, 12 , 1 ;
- : 1989 - 1/2 ; : 1989 - 5/3
; — : 1987 - 16 ; : 1987 - 18
, 2 ; — : 1987 -
5/1 , 1989 - 2 ; - - 1987 -
1/0 ; - : 1989 - 3 ; - :
1987 - 5/6 .
463. *Pterostichus diligens* (Sturm, 1824): 33 .
: 1987 - 12 ; : 1989 - 1/1 , 1994
- 0/1 ; - : 1987 - 2
; - 1987 - 2 , - : 1989 - 2 ;
- : 1987 - 2/1 ; - : 1987 - 4/5
464. *Pterostichus strenuus* (Panzer, 1797) / , 1990.
: 92 .
: 1987 - 6 , 16
; — : 1989 - 20 ; : 1989 - 3/4
, 1 , 1994 - 3/3
; - : 1987 - 4/2
; : 1987 - 23 , 2
, 1994 - 2/3 .
465. *Pterostichus aterrimus* (Herbst, 1784): 2 .
: 1994 - 2 .

466. *Pterostichus aethiops* (Panzer, 1797) - 7 .
 - 1988 - 7
467. *Pterostichus quadrioveolatus* Letzner, 1852: 2 .
 - 1988 - 2
468. *Pterostichus oblongopunctatus* (Fabricius, 1787) / ,
 , 1980.
 : 948 .
 - : 1989 - 16 , 53
 , 199 ; : 1987 - 85
 , 1 , 44 ; -
 : 1987 - 37 , 34
 , 51 , 1989 - 158
 ; : 1989 - 1/1 , 2/7
 , 4/4 , 1994 - 22/24
 ; - : 1987 - 5/1
 , 2 , 46
 , 1989 - 1 ; : 1987 - 4
 , 26 , 6 , 1994 -
 7/38 ; - : 1987 - 0/1
 , 5 , 1989 - 2/1
 ; - : 1987 - 2 , 8
 , 1994 — 2/2 ; -
 : 1989 - 1 , 5
 , 14 ; - : 1987 —
 1 , 25 .
469. *Pterostichus melanarius* (Iliger, 1798) / , , 1980.
 : 166 .
 : 1987 - 1 ; - : 1987 - 14
 , 1989 - 0/3 , 1/0
 ; : 1989 - 6/0 , 1/0
 ; - : 1987 - 4/2 ;
 : 1987 - 86 , 6 , 1
 ; - : 1987 - 5/12 , 1
 , 1 , 2

- , 1989 - 7 , 2/0
, 1/1 ; - .
1987 - 1 ; - : 1989 - 4
, 4
470. *Calathus fuscipes* (Goeze, 1777): 16 .
: 1973 - 16 .
471. *Calathus ambiguus* (Paykull, 1790) / , ,
1980.
472. *Calathus erratus* (C.R. Sahlberg, 1827): 23 .
- 1973 - 23 .
473. *Calathus melanocephalus* (Linnaeus, 1758) / , ,
1980.
: 107 .
- : 1989 - 9 ; : 1987 - 3 , 1,
1 juv. ; - : 1987 - 1
, 1 , 1 , 1989 - 1
, 1 ; - : 1987 -
5 ; : 1987 - 6 , 5
; - : 1987 - 1 , 1989 -
18 , 2 ; - :
1989 - 28 , 19 ,
- : 1987 - 4
474. *Calathus micropterus* (Duftschmid, 1812) / , ,
1980.
: 628 .
- : 1989 — 67 ; : 1987 - 21
; - : 1987 - 10 ; : 1989 - 1/0 , 1994 -
3/3 ; : 1987 - 9
; : 1987 - 35 , 1 , 1994 -
44/76 ; - : 1987 - 4
, 1989 - 47 , 1 ;
- : 1987 - 1 , 1994 - 24/66
; - : 1989 -

- 192 , - : 1987 - 23 .
475. *Calathus halensis* (Schaller, 1783)- 2 .
: 1973 — 2 .
476. *Agonum dolens* (C.R. Sahlberg, 1827): 2 .
: 1973 — 2 .
477. *Agonum ericeti* (Panzer, 1809) / , 1991.
: 445 .
- : 1989 - 248 ; : 1987 - 23
; - : 1987 - 2 ; : 1989 - 3 ; -
: 1987 - 2 ; : 1987 - 22 ; - :
1987 - 7/10 , 1989 - 95 ; - : 1987 - 8/8
; - : 1989 - 17 .
478. *Agonum gracilipes* (Duftschmid, 1812): 5 .
: 1993 - 5 .
479. *Agonum longicorne* Chaudoir, 1846: 1 .
: 1973 - 1 .
480. *Agonum impressum* (Panzer, 1797): 14 .
: 1973 - 12 ; : 1987 - 2 .
481. *Agonum lugens* (Duftschmid, 1812): 2 .
: 1973 - 2 .
482. *Agonum marginatum* (Linnaeus, 1758): 3 .
: 1973 - 3 .
483. *Agonum duftschmidi* Schmidt, 1994 / , 1988.
: 58 .
: 1987 - 2 , 1 ,
1 ; : 1989 - 2 ,
; - : 1987 - 1/2 ; : 1987 — 29
; - : 1987 - 13 ; - : 1987 - 7 .
484. *Agonum muelleri* (Herbst, 1784): 1 .
: 1987 — 1 .
485. *Agonum sexpunctatum* (Linnaeus, 1758): 29 .
: 1987 - 1 , 9 ;

- 1 - : 1989 - 8 ; : 1973 - 3 , 1989 -
; - - 1987 - 1 ; : 1987 - 2
; - : 1987 - 2 , 1989 - 1 ; -
: 1989 - 1 .
486. *Agonum versutum* (Sturm, 1824): 13 .
: 1993 - 12 , 1994 - 1 juv.
487. *Agonum viduurn* (Panzer, 1797) / , , 1980.
: 2 .:
1989 - 1 ; : 1994 - 1 juv
488. *Agonum fuliginosum* (Panzer, 1809) / , 1992.
: 43 .
: 1987 - 3 , 4
4 ; - : 1989 - 2 ; -
: 1987 - 2/1 ; : 1987 - 16
, 1994 - 4 ; - : 1987 - 6
, 1 .
489. *Agonum gracile* (Sturm, 1824): 4 .
- 1994 - 4 .
490. *Agonum micans Nicolai*, 1822: 3 .
- 1993 - 3 .
491. *Agonum piceum* (Linnaeus, 1758): 1 . - 1993 - 1 .
492. *Agonum thoreyi* (Dejean, 1828): 4 .
: 1993 - 4 .
493. *Platynus assimile* (Paykull, 1790) / , 1992.
: 65 .
: 1987 - 1 , - : 1989 - 18
; : 1989 - 8/6 , 4
, 1994 - 1/0 ; - :
1987 - 1/2 , 1 ;
: 1987 - 3 , 12
; - 1987 - 8 .

494. *Platynus krymckii* Sperk, 1835 / , 1992.
: 13 .
: 1987 - 11 ; - 1989 - 2 .
495. *Platynus longiventre* Mannerheim, 1825 / , 1992.
: 7 .
. 1987 - 3 ; - : 1989 - 2 ;
- : 1987 - 1 ; : 1987 - 1 .
496. *Platynus livens* (Gyllenhal, 1810) / , 1992.
: 1 .
: 1987 - 1 .
497. *Oxypselaphus obscurum* (Herbst, 1784) / , 1992.
: 112 .
: 1987 - 1 ; - : 1989 - 1
; : 1989 - 7
, 1994 - 0/5 ; - : 1987
- 4 ; : 1987 - 31 , 1994 - 27
; - : 1987 - 16
, 1989 - 3 ; - :
1987 - 1 , 1994 - 1 ; -
- 1989 - 15 .
498. *Anchomenus dorsalis* (Pontoppidan, 1763): 2 .
: 1973 - 2 .
499. *Synuchus vivalis* (Illiger, 1798) / , 1992.
: 10 .
- 1987 - 3 , 1994 - 0/1
; - : 1989 - 6 .
500. *Amara chaudiroidi incognita* Fassati, 1946: 1 .
: 1987 - 1 .
501. *Amara plebeja* (Gyllenhal, 1810): 23 .
- 1987 - 3 ; : 1973 - 2
; : 1987 - 13 .
502. *Amara aenea* (De Geer, 1774): 15 .
: 1987 - 1 ; - : 1989 -

- 1/1 ; 1973 - 11 ; : 1987 - 1
503. *Amara communis* (Panzer, 1797) / , 1992.
 - 21 .
 : 1987 - 4 , 3 ; -
 : 1989 - 2 , 5 ;
 : 1989 - 2/0 ; : 1987 - 3
 , 2
504. *Amara eurynota* (Panzer, 1797): 2 .
 : 1973 - 2
505. *Amara famelica* Zimmermann, 1832: 30 .
 : 1987 - 5 ; - : 1987 — 2 ;
 : 1993 - 3 ; : 1987 - 20
506. *Amara familiaris* (Duftschmid, 1812) / , 1992.
 : 25 .
 : 1987 - 23 ; : 1987 — 2
507. *Amara lunicollis* Schiödte, 1837: 2 .
 : 1993 - 1 ; : 1973 - 1
508. *Amara similata* (Gyllenhal, 1810): 9 .
 : 1987 - 1 ; : 1973 — 8
509. *Amara spreta* Dejean, 1831 / , 1983.
 : 12 .
 : 1973 - 11 ; : 1993 — 1
510. *Amara tibialis* (Paykull, 1798) / , 1992.
 : 30 .
 : 1987 - 1 , 11 ;
 - : 1989 - 1 ; : 1987 - 9 ; - :
 1987 - 8
511. *Amara bifrons* (Gyllenhal, 1810): 9 .
 : 1993 - 9
512. *Amara brunnea* (Gyllenhal, 1810) / , 1992.
 : 6 .
 - - 1989 - 2 ; -

- : 1989 - 1 ; - : 1989 - 3 .
 513. *Amara infima* (Duftschmid, 1812): 2 .
 : 1993 - 2 .
 514. *Amara ingenua* (Duftschmid, 1812): 4 .
 : 1973 - 4 .
 515. *Amara municipalis* (Duftschmid, 1812): 3 .
 : 1993 - 3 .
 516. *Amara apricaria* (Paykull, 1790): 7 .
 : 1987 - 1 , 1993 - 6 .
 517. *Amara consularis* (Duftschmid, 1812): 3 .
 : 1993 - 3 .
 518. *Amara fulva* (. Müller, 1776): 16 .
 — : 1989 — 1 ; : 1973 - 10
 , 1993 - 2 ; : 1993 - 2 ;
 - : 1987 - 1 .
 519. *Amara majuscula* (Chaudoir, 1850): 4 .
 : 1993 - 4 .
 520. *Amara equestris* (Duftschmid, 1812) / , 1974.
 521. *Curtonotus aulicus* (Panzer, 1797): 1 .
 - : 1989 - 1 .
 522. *Anisodactylus binotatus* (Fabricius, 1787): 140 .
 : 1987 - 77 ; - : 1989 - 0/1 ;
 - : 1987 - 3 ; : 1987 - 17 ; -
 : 1987 - 38 ; : 1973 - 4 .
 523. *Anisodactylus signatus* (Panzer, 1797): 1 .
 : 1987 — 1 .
 524. *Bradycellus caucasicus* (Chaudoir, 1846): 2 .
 : 1993 — 2 .
 525. *Dicheirotichus placidus* (Gyllenhal, 1827): 3 .
 : 1988 — 3 .
 526. *Stenolophus teutonius* (Schrank, 1781) / , 1992
 : 1 .
 : 1987 - 1 .
 527. *Stenolophus skrimshirani* Stephens, 1828: 2 .
 : 1988 - 2 .
 528. *Stenolophus mixtus* (Herbst, 1784). - 12 .
 - : 1989 - 1 ; : 1993 — 11

529. *Acupalpus flavicollis* (Sturm, 1825): 11 .
: 1988 - 5 , 1993 — 6
530. *Acupalpus meridianus* (Linnaeus, 1767): 8 .
: 1987 - 1 ; : 1973 - 4 ;
: 1993 - 3 .
531. *Acupalpus parvulus* (Sturm, 1825) / , 1992.
: 83 .
: 1987 - 49 ; - : 1989 - 16 ;
: 1989 - 1 , 1 ;
- : 1987 - 3 ; : 1987 - 12 ; -
: 1987 - 1 .
532. *Acupalpus exiguus* (Dejean, 1829): 15 .
: 1987 - 9 ; - : 1989 - 1 ;
: 1988 - 5 .
533. *Harpalus rufipes* (De Geer, 1774) / , 1974.
: 222 .
: 1987 - 2 , 10 ;
- : 1987 - 1 ; : 1973 - 22 ,
1987 - 1 , 1 , 1
, 24 , 1993 - 5 ; -
: 1987 - 129 , 1989 - 6 ; :
1973 - 16 ; - : 1994 - 1
; - : 1989 - 1 , 2
534. *Harpalus calceatus* (Duftschmid, 1812): 2 .
: 1973 - 2 .
535. *Harpalus quadripunctatus* Dejean, 1829: 18 .
1987 - 18 juv. .
536. *Harpalus pumilus* (Sturm, 1818): 3 .
1973 - 1 , - 1993 - 2

537. *Harpalus froelichi* Sturm, 1818: 3 .
: 1993 - 3 .
538. *Harpalus tardus* (Panzer, 1797)- 6 .
: 1973 - 2 ; - 1993 - 4 .
539. *Harpalus latus* (Linnaeus, 1758) / , , 1980.
: 16
- - 1989 - 1 ; : 1989 - 1/0
, 1/0 , 1994 - 0/2
; : 1987 - 3
, 2 , 1 , 1988 - 3
; - : 1989 - 1 ;
- : 1987 - 1 juv. .
540. *Harpalus xanthopus winkleri* Schaubberger, 1923 / ,
1992.
541. *Harpalus luteicornis* (Duftschmid, 1812): 1 .
: 1973 - 1 .
542. *Harpalus smaragdinus* (Duftschmid, 1812): 18 .
: 1973 - 14 ; : 1993 - 4 .
543. *Harpalus affinis* (Schrank, 1781): 14 .
: 1973 - 4 ; : 1973 - 10 .
544. *Chlaenius nitidulus* (Schrank, 1781): 5 .
: 1987 - 1 ; : 1993 - 3
; - : 1987 - 1 .
545. *Chlaenius nigricornis* (Fabricius, 1787) / , 1988.
: 6 .
- - 1989 - 5 ; : 1987 - 1 .
546. *Chlaenius tristis* (Schaller, 1783): 1 .
: 1994 - 1 .
547. *Oodes helopioides* (Fabricius, 1792) / , ,
1980.
: 36 .
- : 1989 - 11 ; : 1987 - 4 ;
- : 1989 - 12 ; : 1989 - 5 ; - :
1987 - 1 ; : 1987 - 1

- 1989 - 1
548. *Badister bullatus* (Schrank, 1798) / , 1992.
: 12 .
: 1987 — 1 ; - : 1989 — 4
; : 1989 - 2 , 1
; — . 1987 — 1
; : 1987 - 2 , 1994 - 1/0
549. *Badister lacertosus* Sturm, 1815: 5 .
: 1988 - 5
550. *Badister unipustulatus* Bonelli, 1813 / , 1992.
: 1 .
— : 1987 — 1
551. *Badister sodalis* (Duftschmid, 1812) / , 1992.
: 3 .
: 1987 - 1 , 1
, 1
552. *Badister peltatus* (Panzer, 1796) / , 1992.
: 1 .
- : 1989 - 1
553. *Lebia chlorocephala* (Hoffmannsegg, 1803): 1 .
: 1993 - 1
554. *Dromius agilis* (Fabricius, 1787): 4 .
: 1988 - 4
555. *Dromius fenestratus* (Fabricius, 1794): 7 .
: 1988 — 7
556. *Dromius schneideri* Crotch, 1871: 3 .
: 1988 - 3
557. *Dromius quadraticollis* . Morawitz, 1862: 2 .
: 1988 - 2
558. *Philorhizus sigma* (Rossi, 1790): 1 .
- 1993 - 1
559. *Syntomus foveatus* (Fourcroy, 1785): 4 . . 1993 - 4

560. *Syntomus truncatellus* (Linnaeus, 1761): 9 .
: 1973 - 7 ; : 1993 - 2 .
561. *Microlestes minutulus* (Goeze, 1777) / , 1992.
: 1 .
- : 1989 - 1 .
- Haliplidae
562. *Peltodytes caesus* (Duftschmid, 1805) / , , 1988.
: 5 .
: 1982 - 1/2 ; : 1988 - 2/0 .
563. *Haliplus fulvus* (Fabricius, 1801): 3 .
: 1989 - 1/0 ; : 1989 - 0/2 .
564. *Haliplus fluviatilis* Aube, 1836: 25 .
: 1989 - 1/2 ; : 1984 - 5/6 ;
: 1988 - 6/5 .
565. *Haliplus wehnckeii* Gerhardt, 1877: 7 .
: 1989 - 2/1 ; : 1979 - 0/4 .
566. *Haliplus ruficotlis* (De Geer, 1774): 71 .
: 1984 - 11/15 , :
1988 - 14/9 ; : 1979 - 12/10 .
- Noteridae
567. *Noterus clavicornis* (De Geer, 1774): 12 . J.
: 1994 - 2/1 ; : 1988 - 3/0 ;
: 1979 - 2/4 .
568. *Noterus crassicornis* (Müller, 1776): 105 .
: 1994 - 35/55 .
; : 1988 - 4/11 .
- Dytiscidae
569. *Bidessus unistriatus* (Schrank, 1781): 7 .
: 1989 - 0/2 ; : 1994 -
0/1 ; : 1988 - 3/1 .

570. *Hydroglyphus pusillus* (Fabricius, 1781): 7 .
: 1984 - 1/0 ; :
1988 - 3/0 ; : 1982 - 2/1 .
571. *Hyphydrus ovatus* (Linnaeus, 1761): 62 .
: 1989 - 8/9 ; 1994 -
13/8 ; : 1988 - 14/10 .
572. *Hygrotus decoratus* (Gyllenhal, 1810): 149 .
: 1988 - 27/18 ; : 1994 -
32/61 ; : 1979 - 8/3 .
573. *Hygrotus inaequalis* (Fabricius, 1777): 76 .
: 1988 - 6/7 ; : 1994 -
5/13 ; : 1988 - 10/8 ; : 1979 - 12/15 .
574. *Hygrotus versicolor* (Schaller, 1783): 28 .
: 1984/94 - 9/12 ; : 1982 - 3/4 .
575. *Coelambus polonicus* (Aube, 1842): 5 .
: 1993 - 0/5 .
576. *Coelambus impressopunctatus* (Schaller, 1783): 76 .
: 1984/94 - 27/11 ; : 1988 - 15/17
; : 1987 - 6/0 .
577. *Hydroporus neglectus* Schaum, 1845: 28 .
: 1994 - 10/17 ; : 1979 - 1/0 .
578. *Hydroporus scalesianus* Stephens, 1828: 2 .
: 1994 - 2/0 .
579. *Hydroporus angustatus* Sturm, 1835: 47 .
: 1989 - 0/2 ; : 1994 -
19/24 ; : 1979 - 2/0 .
580. *Hydroporus fuscipennis* Schaum, 1868: 11 .
: 1984/94 - 3/0 ;
: 1979 - 6/2 .
581. *Hydroporus obscurus* Sturm, 1835: 23 .
: 1994 - 13/10 .
582. *Hydroporus rufifrons* (Müller, 1776): 13 .
: 1994 - 5/8 .

583. *Hydroporus erythrocephalus* (Linnaeus, 1758): 80 .
: 1989 - 2/4 ; : 1994 - 46/27 ;
: 1979 - 0/1 .
584. *Hydroporus melanarius* Sturm, 1835: 1 .
: 1994 - 0/1 .
585. *Hydroporus tristis* (Paukull, 1798): 40 .
: 1984/94 - 6/20 ; : 1988 - 3/1 ; :
1979 - 10/0 .
586. *Hydroporus umbrosus* (Gyllenhal, 1808): 16 .
: 1994 - 10/5 ; : 1979 - 1/0 .
587. *Hydroporus incognitus* Sharp, 1869: 1 .
: 1979 - 1/0 .
588. *Hydroporus striola* Gyllenhal, 1826: 97 .
: 1994 - 26/52
; : 1979 - 11/8 .
589. *Hydroporus palustris* (Linnaeus, 1761): 148 .
: 1989 - 12/13
; : 1984/94 - 28/64 ; : 1979 - 12/13
; : 1989 - 2/4 .
590. *Porhydrus lineatus* (Fabricius, 1775) / , , 1988.
: 130 .
: 1989 - 12/7 ; :
1984/94 - 23/26 ; : 1988 - 24/31 ; :
1979 - 7/0 .
591. *Graptodytes granularis* (Linnaeus, 1767): 5 .
: 1984 - 3/2 .
592. *Graptodytes bilineatus* (Sturm, 1835) / , , 1988.
: 4 .
: 1989 - 0/1 ; : 1994 - 1/2 .
593. *Graptodytes pictus* (Fabricius, 1787) 4 . /
: 1994 - 2/2 .
594. *Syphrodytes dorsalis* (Fabricius, 1787): 23 .
: 1994 - 12/10 ;
1979 - 1/0 .

- 595 *Scarodytes halensis* (Fabricius, 1787)- 6 .
1979 - 5/1 .
- 596 *Potamonectes depressus* (Fabricius, 1775): 6 .
1984 - 2/4 .
597. *Copelatus haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787) 22 .
: 1989 - 1/2 ; : 1984/94 - 13/6 .
598. *Agabus uliginosus* (Linnaeus, 1761): 2 .
- 1994 - 1/1 .
599. *Agabus bipustulatus* (Linnaeus, 1767): 3 .
. 1989 - 2/0 ; .
1994 - 0/1 .
600. *Agabus affinis* (Paykull, 1798): 1 .
: 1988 - 0/1 .
601. *Agabus biguttulus* (Thomson, 1867): 1 .
- 1994 - 1/0 .
- 602 *Agabus sturmi* (Gyllenhal, 1808): 4 .
: 1979 - 3/1 .
- 603 *Agabus fuscipennis* (Paykull, 1798): 45 .
1994 - 23/22 .
- 604 *Agabus subtilis* Erichson, 1837: 1 .
- 1993 - 0/1 .
605. *Agabus undulatus* (Schrank, 1776): 15 .
: 1994 - 2/0 ; 7/5 ; : 1979 -
0/1 .
606. *Ilybius subaeneus* Erichson, 1837: 2 .
: 1984 - 1/1 .
- 607 *Ilybius ater* (De Geer, 1774): 6 .
: 1984 - 2/0 ; : 1979 - 3/1 .
- 608 *Ilybius guttiger* (Gyllenhal, 1808): 12 .
: 1979 - 9/3 .
- 609 *Ilybius quadriguttatus* (Lacordaire, 1835). 1 .
- 1979 - 1/0 .
- 610 *Ilybius similis* Thomson, 1856: 3 .

- : 1989 - 2/1 .
611. *Ilybius fuliginosus* (Fabricius, 1792) - 2 .
: 1984 - 2/0 .
612. *Ilybius fenestratus* (Fabricius, 1781): 67 .
: 1989 - 12/16 ; : 1984 - 7/0 ;
: 1979 - 4/11 ; : 1989 - 12/5 .
613. *Rhantus grapii* (Gyllenhal, 1808): 9 .
: 1993 - 6/2 ; : 1994 - 1/0 .
614. *Rhantus suturalis* (MacLeay, 1825): 9 .
: 1994 - 0/1 ; : 1988 - 3/5 .
615. *Rhantus frontalis* (Marsham, 1802): 14 .
: 1989 - 3/4 ; : 1984/94 - 0/3 ;
: 1989 - 3/1 .
616. *Rhantus notaticollis* (Aube, 1837): 3 .
: 1984 - 2/1 .
617. *Rhantus bistriatus* (Bergstrasser, 1778): 4 .
: 1989 - 0/1 ; : 1988 - 1/2 .
618. *Rhantus exsoletus* (Forster, 1771): 63 .
: 1989 - 3/7 , : 1988 -
16/23 ; : 1987 - 11/3 .
619. *Rhantus latitans* Sharp, 1882: 13 .
: 1994 - 2/0 ; : 1988 - 4/7 .
620. *Colymbetes fuscus* (Linnaeus, 1758) /
: 5 .
: 1994 - 1/0 ; : 1987 - 3/1 .
621. *Colymbetes paykulli* Erichson, 1837: 1 .
: 1988 - 1/0 .
622. *Colymbetes striatus* (Linnaeus, 1758): 12 .
: 1994 - 4/0 ; : 1988 - 3/5 .

623. *Laccophilus hyalinus* (De Geer, 1774): 23 .
: 1989 - 7/5 ; : 1994 - 2/0 ;
: 1979 - 4/5 .
624. *Laccophilus minutus* (Linnaeus, 1758): 46 .
: 1989 - 7/5
; 1994 - 18/2 ; : 1988 - 4/10
625. *Hydaticus transversalis* (Pontoppidan, 1763): 40 .
: 1984 - 11/17 ; : 1987 - 5/7 .
626. *Hydaticus modestus* Sharp, 1882: 28 .
: 1989 - 3/5 ; : 1988 - 11/7 ;
: 1989 - 2/0 .
627. *Hydaticus seminiger* (De Geer, 1774): 21 .
: 1994 - 3/2 ; : 1987 - 10/6 .
628. *Graphoderus austriacus* (Sturm, 1834): 34 .
: 1994 - 1 /0
; : 1988 - 13/15 ; : 1987 - 2/3
629. *Graphoderus bilineatus* (De Geer, 1774)- 4 .
1994 - 0/2 ; 1988 - 1/1 .
630. *Graphoderus cinereus* (Linnaeus, 1758): 3 .
: 1984/94 - 1/2 .
631. *Graphoderus zonatus* (Hoppe, 1795)- 2 .
: 1994 - 0/1 ; : 1988 - 0/1 .
632. *Acilius sulcatus* (Linnaeus, 1758): 3 .
: 1989 - 0/1 ; :
1994 - 1/1 .
633. *Acilius canaliculatus* (Nicolai, 1822)- 41 .
: 1989 - 13/8 ; : 1994 - 1/1 ;
- 1987 - 12/6 .
634. *Dytiscus dimidiatus* Bergstrasser, 1778: 3 .
- 1987 - 2/1 .

635. *Dytiscus marginahs* Linnaeus, 1758: 11
 1989 - 2/1 , : 1994 - 0/2 ,
 : 1992 - 1 /5 .
636. *Dytiscus circumcinctus* Ahrens, 1811: 4 .
 : 1984 - 2/2 .
637. *Dytiscus circumflexus* Fabricius, 1801: 1 .
 : 1988 - 0/1 .
- Gyrinidae
638. *Gyrinus minutus* Fabncius, 1798: 32 .
 : 1984 - 15/17 .
639. *Gyrinus aeratus* Stephens, 1835: 8 .
 : 1989 - 3/5 .
640. *Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808: 29 .
 : 1984 - 11/8 ; : 1987 -
 6/4 .
641. *Gyrinus natator* (Linnaeus, 1758): 23 .
 : 1984 - 0/2 ; : 188 - 6/3 ;
 - 1979 - 4/8 .
642. *Gyrinus substriatus* Stephens, 1828: 20 .
 1989 - 12/8 .
- Microsporidae
643. *Microsporus acaroides* (Waltl, 1838): 2 .
 : 1993 - 2 .
- Hydrophilidae
644. *Helophorus aquaticus* (Linnaeus, 1758): 4 .
 1992 - 4 .
645. *Georissus crenulatus* (Rossi, 1794): 1 .
 1992 - 1 .
646. *Berosus lundus* (Linnaeus, 1761): 5 .
 - 1993 - 5 ,
647. *Hydrobius fuscipes* (Lmnaeus, 1758): 12 .
 - 1993 - 95 - 12 , , ,

648. *Hydrochara caraboides* (Linnaeus, 1758): 3
: 1994 - 3
649. *Cercyon haemorrhoidalis* (Fabricius, 1775): 34
: 1993/95 - 34
650. *Cercyon melanocephalus* (Linnaeus, 1758) / , 1991.
: 7
: 1994 - 7
651. *Cercyon bifenestratus* Kiister, 1851: 11
: 1993 - 95 - 2
; : 1993 - 9
652. *Cercyon unipunctatus* (Linnaeus, 1758) 61
: 1993 - 12
; - : 1992 - 49
653. *Cercyon pygmaeus* (Illiger, 1801): 22
: 1994 - 22
654. *Sphaeridium bipustulatum* Fabricius, 1781: 19
: 1993-95 - 19
655. *Sphaeridium lunatum* Fabricius, 1792: 2
: 1994 — 2
656. *Sphaeridium scarabaeoides* (Linnaeus, 1758): 28
: 1993 - 12 ; :
1993-95 - 11 ; : 1994 - 5
- Leiodidae
657. *Leiodes ferruginea* (Fabricius, 1787) / , 1991.
: 1
: 1994 - 1
658. *Anisotoma humeralis* (Fabricius, 1792) / , 1991.
: 5
: 1994/95 - 5
659. *Amphicyllis globus* (Fabricius, 1792) / , 1991.
: 2
: 1993 - 2

660. *Agathidium atrum* (Paykull, 1798) / , 1991
- Silphidae
661. *Nicrophorus vespilloides* Herbst, 1784 / , , 1980.
: 21
- 1988/93 - 21
662. *Nicrophorus vespillo* (Linnaeus, 1758): 19
: 1988/93 - 19
663. *Necrodes littoralis* (Linnaeus, 1758): 5
: 1993 - 4 ; : 1993 - 1
664. *Thanatophilus rugosus* Linnaeus, 1758: 14
: 1988 - 14
665. *Oiceoptoma thoracica* Linnaeus, 1758: 9
: 1993 - 6, 1993 - 3
666. *Aclypea opaca* Linnaeus, 1758.: 27
: 1988 - 25 ; : 1993 - 2
667. *Silpha obscura* Linnaeus, 1758: 7
: 1988 - 7
668. *Silpha tristis* Uiger, 1798: 9
: 1988 - 9
669. *Phosphuga atrata* (Linnaeus, 1758) / , 1994.
: 17
: 1988 - 17
- Cholevidae
670. *Nargus velox* (Spence, 1815) / , 1991.
: 2
: 1988 - 2
671. *Sciodrepoides watsoni* (Spence, 1815) / , 1991.
: 6
: 1988 - 6
672. *Catops kirbii* (Spence, 1815) / , 1991.
: 1

- : 1988 - 1
673. *Catops picipes* (Fabricius, 1787) / , 1991.
: 3
: 1988 - 3
- Platypsyllidae
674. *Platypsyllus castoris* Ritzema, 1869.
- Staphylinidae
675. *Omalium caesum* Gravenhorst, 1806: 1
- : 1988 - 1
676. *Omalium rivulare* (Paykull, 1789): 2
- : 1988 - 1 ; : 1987 - 1
677. *Phloeonomus punctipennis* Thomson, 1867: 1
- : 1988 - 1
678. *Phloeonomus pusillus* (Gravenhorst, 1806) / , 1988.
: 1
: 1987 - 1
679. *Xylodromus testaceus* Erichson, 1840 / , 1989.
: 1
: 1987 - 1
680. *Lathrimaeum atrocephalum* (Gyllenhal, 1827): 209
- : 1988 - 98 ; 1988 - 2
; 1988 - 5 ; 1988 - 104
681. *Olophrum assimile* (Paykull, 1800): 56
- : 1988 - 31 , 25
682. *Eucnecosum brachypterum* (Gravenhorst, 1802): 2
- : 1988 - 1 , 1
683. *Acidota crenata* (Fabricius, 1792): 20
- - 1988 - 3 , 2
15

684. *Anthophagus angusticollis* (Mannerheim, 1830): 6 .
 - : 1988 - 5 , 1 .
685. *Acrognathus mandibularis* (Gyllenhal, 1827): 3 .
 : 1987 - 1 , : 1987 - 2 .
686. *Trogophloeus elongatus* (Erichson, 1839): 1 .
 - : 1988 - 1 .
687. *Trogophloeus rivularis* (Motschulsky, 1860) / ,
 , 1991.
 : 2 .
 : 1988 - 2 .
688. *Trogophloeus corticinus* (Gravenhorst, 1806): 4 .
 - : 1988 - 2 , 2 .
689. *Trogophloeus impressus* (Lacordaire, 1835): 2 .
 : 1987 - 2 .
690. *Trogophloeus pusillus* (Gravenhorst, 1802) / , 1989.
 : 2 .
 : 1987 - 2 .
691. *Oxytelus rugosus* (Fabricius, 1775): 9 .
 - : 1988 - 3 , 3
 , 1 , 2 .
692. *Oxytelus nitidulus* (Gravenhorst, 1802): 1 .
 - : 1988 - 1 .
693. *Oxytelus tetracaratus* (Block, 1799): 13 .
 - : 1988 - 2 , 6
 , 2 , 3 .
694. *Platystethus capito* Heer, 1839: 12 .
 - : 1988 - 10 ; : 1987 - 1-
 , 1988 - 1 .
695. *Platystethus nitens* (Sahlberg, 1832): 1 .
 : 1987 - 1 .
696. *Bledius tricornis* (Herbst, 1784) 3 .
 : 1987 - 2 ; - 1987 - 1

697. *Bledius atricapillus* (Germar, 1825) / , 1990.
: 3 .
: 1987 - 3
698. *Bledius fracticornis* (Paykull, 1790): 8 . : 1987 - 8
- Bledius nanus* Erichson, 1840 / , 1990.
: 2 .
: 1987 — 2
700. *Bledius arenarius* (Paykull, 1800) / , 1988.
: 6 .
: 1987 - 6
701. *Bledius tenenbaumi* Bernhauer, 1936 / , ,
1991.
: 5 .
: 1987 — 5
702. *Oxyporus maxillosus* Fabricius, 1792: 3 .
- : 1988 - 3
703. *Stenus clavicornis* (Scopoli, 1763): 8 .
- : 1988 - 8
704. *Stenus comma* LeConte, 1863 / Pisanenko, Puthz, 1991.
: 3 .
: 1987 - 3
705. *Stenus boops* Ljungh, 1804 / Pisanenko, Puthz, 1991.
: 1 .
: 1987 - 1
706. *Stenus canaliculatus* Gyllenhal, 1827: 2 .
- : 1988 - 2
707. *Stenus europaeus* Puthz, 1966 / Pisanenko, Puthz, 1991.
: 9 .
- : 1988 - 5 ,
; : 1987 - 3 ; : 1987 - 1
708. *Stenus excubitor* Erichson, 1839 / , 1990.
: 6 .
- - 1988 - 4 ; . 1987 - 2

709. *Stenus fuscipes* Gravenhorst, 1802: 8 .
 - . 1988 - 8 . ,
710. *Stenus humilis* Erichson, 1839 / Pisanenko, Puthz, 1991.
 : 8 .
 - : 1988 - 6 . , ;
 : 1987 - 2 .
711. *Stenus melanarius* Stephens, 1833 / Pisanenko, Puthz, 1991.
 : 1 .
 : 1987 — 1 .
712. *Stenus palposus* Zetterstedt, 1838 / . , 1988.
 : 14 .
 : 1988 - 1 . ; : 1987 - 13 .
713. *Stenus formicetorum* Mannerheim, 1843: 1 .
 - : 1988 - 1 .
714. *Stenus bohemicus* Machulka, 1947 / . , 1990.
 : 2 .
 : 1987 - 2 .
715. *Stenus cicindeloides* (Schaller, 1763) / Pisanenko, Puthz, 1991.
 : 1 .
 - 1987 - 1 .
716. *Euaesthetus bipunctatus* (Ljungh, 1804) / . , 1988.
 : 14 .
 - : 1988 - 12 . ; : 1987 - 2 .
717. *Paederus brevipennis* Lacordaire, 1835: 2 .
 - : 1988 - 2 . , .
718. *Paederus riparius* (Linnaeus, 1758): 8 .
 - : 1988 - . ; : 1987 - 2 .
719. *Astenus gracilis* (Paykull, 1789): 2 .
 - : 1988 - 2 .

720. *Stilicus rufipes* Germar, 1836: 29 .
 - 1988 - 13 , 1
 , 4 , 9 ; : 1987 -
 2
721. *Lithocharis nigriceps* (Kraatz, 1859) / , 1988.
 : 1 .
 : 1987 - 1 .
722. *Scopaeus pusillus* Kiesenwetter, 1843: 1 .
 - : 1988 - 1 .
723. *Lathrobium quadratum* (Paykull, 1789): 1 .
 : 1987 - 1 .
724. *Lathrobium terminatum* (Gravenhorst, 1802): 5 .
 - : 1988 - 1 ; : 1988 - 4 .
725. *Lathrobium brunnipes* (Fabricius, 1792): 11 .
 - : 1988 - 1 , 2
 , 7 , 1 .
726. *Lathrobium castaneipenne* Kolenati, 1846: 1 .
 - : 1988 - 1 .
727. *Lathrobium elongatum* (Linnaeus, 1767): 6 .
 - : 1988 - 6 .
728. *Lathrobium filiforme* Gravenhorst, 1806: 3 .
 - : 1988 - 3 , .
729. *Lathrobium fovulum* Stephens, 1833: 5 .
 - : 1988 - 5 .
730. *Lathrobium fulvipenne* Gravenhorst, 1806: 1 .
 - : 1988 - 1 .
731. *Lathrobium geminum* Kraatz, 1857: 8 .
 - - 1988 - 8 , ,
732. *Lathrobium longulum* Gravenhorst, 1802: 8
 - - 1988 - 7 ,

- , ; : 1987 — 1
733. *Cryptobium fracticorne* (Paykull, 1800): 7 .
 - : 1988 - 1 , 3
 , 2 , 1
734. *Leptacinus formicetorum* Markel, 1841 / , 1989.
 : 1987 - 4
735. *Gyrohypnus angustatus* Stephens, 1833: 101 .
 - : 1988 - 22 , 78
 , 1
736. *Gyrohypnus punctulatus* (Paykull, 1789): 1 .
 - : 1988 — 1
737. *Xantholinus laevigatus* Jacobson, 1847: 18 .
 - : 1988 - 11 , 1
 , 6
738. *Xantholinus longiventris* Heer, 1839: 39 .
 - : 1988 — 3 , 1 , 6
 , 27 , 2
739. *Xantholinus tricolor* (Fabricius, 1787): 68 .
 — : 1988 - 28 , 5
 , 35
740. *Othius myrmecophilus* Kiesenwetter, 1843: 88 .
 - : 1988 - 5 ; 2
 , 81
741. *Othius punctulatus* (Goeze, 1777): 177 .
 - : 1988 - 36 , 11
 , 130
742. *Philonthus addendus* Sharp, 1867: 2 .
 : 1987 - 2

743. *Philonthus binotatus* (Gravenhorst, 1802) / , 1988.
: 5 .
: 1987 - 5 .
744. *Philonthus chalceus* Stepheris, 1832: 3 .
- : 1988 - 1 ; : 1987 - 2 .
745. *Philonthus decorus* (Gravenhorst, 1802): 1472 .
- : 1988 - 88 ; -1988 -
1384 .
746. *Philonthus ebeninus* (Gravenhorst, 1802) / , ,
1980.
747. *Philonthus fimetarius* (Gravenhorst, 1802): 4 .
- : 1988 - 4 .
748. *Philonthus fumarius* (Gravenhorst, 1806): 10 .
- : 1988 — 7 ; : 1987 - 3 .
749. *Philonthus fuscipennis* (Mannerheim, 1831): 3 .
— : 1988 - 3 , .
750. *Philonthus mannerheimi* Fauvel, 1869: 5 .
- : 1988 - 5 .
751. *Philonthus nigrita* (Gravenhorst, 1806): 1 .
- : 1988 - 1 .
752. *Philonthus punctus* (Gravenhorst, 1802) / , 1989.
: 5 .
: 1987 — 5 .
753. *Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810): 3 .
: 1987 - 3 .
754. *Philonthus rectangulus* Sharp, 1874 / , 1388.
: 6 .
: 1987 - 6 .
755. *Philonthus sanguinolentus* (Gravenhorst, 1802): 1 .
: 1987 - 1 .

756. *Philonthus sordidus* (Gravenhorst, 1802): 2 .
: 1987 - 2
757. *Philonthus spinipes* Sharp, 1867 / , 1988.
: 2
: 1987 - 2
758. *Gabrius trossulus* (Nordmann, 1837): 17 .
- : 1988 - 17
759. *Gabrius vernalis* (Gravenhorst, 1806): 6 .
- : 1988 - 6
760. *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) / , , 1991.
: 1 : 1988 - 1
761. *Staphylinus erythropterus* Linnaeus, 1758: 36 .
- : 1988 — 2 , 19
, 15
762. *Platydracus chalcocephalus* (Fabricius, 1801): 13 .
- : 1988 - 13
763. *Ocypus globulifer* (Fourcroy, 1785) / , , 1980.
764. *Ocypus similis* (Fabricius, 1792): 31 .
- : 1988 - 8
, 22 ; : 1987 -
1
765. *Ocypus fuscatus* (Gravenhorst, 1802): 1 .
- : 1988 - 1
766. *Heterothops dissimilis* (Gravenhorst, 1802): 2 .
- : 1988 — 2
767. *Quedius scitus* (Gravenhorst, 1806) / , ,
1991.
: 1
: 1988 - 1

- 768 *Quedius xanthopus* Erichson, 1839- 1 :
 - : 1988 - 1
- 769 *Quedius fuliginosus* (Gravenhorst, 1802) /
 1980.
 : 28
 - : 1988 - 19
 , 9
770. *Quedius molochinus* (Gravenhorst, 1806): 2
 - : 1988 - 2
771. *Acylophorus glaberrimus* (Herbst, 1784): 1
 - : 1988 - 1
772. *Habrocerus capillaricornis* (Gravenhorst, 1806): 2
 - : 1988 - 2
773. *Mycetoporus brunneus* (Marsham, 1802): 41
 - : 1988 - 41
774. *Mycetoporus clavicornis* (Stephens, 1832): 7
 - : 1988 - 7
775. *Mycetoporus longicornis* Maklin, 1847: 1
 - : 1988 - 1
776. *Mycetoporus rufescens* (Stephens, 1832): 127
 - : 1988 - 127
777. *Mycetoporus solidicornis* Wollaston, 1864: 5
 - : 1988 - 5
778. *Mycetoporus splendidus* (Gravenhorst, 1806): 36
 - : 1988 - 18
 , 3 , 15
779. *Bryoporus cernuus* (Gravenhorst, 1806) 8
 - : 1988 - 8

780. *Lordithon lunulatus* (Linnaeus, 1761): 3 .
 - : 1988 - 2 ; : 1987 - 1
781. *Lordithon pulchellus* (Mannerheim, 1831) / , 1989.
 : 12 .
 : 1987 - 12
782. *Lordithon trimaculatus* (Paykull, 1800) / , 1988.
 : 2 .
 : 1987 - 2
783. *Bolitobius formosus* (Gravenhorst, 1806): 6 .
 - : 1988 - 6 , ,
784. *Sepedophilus marshami* (Stephens, 1832): 20 .
 - : 1988 - 20 ,
785. *Sepedophilus pedicularius* (Gravenhorst, 1802): 2 .
 - : 1988 - 2
786. *Tachyporus abdominalis* (Fabricius, 1781): 26 .
 - : 1988 - 26 ,
787. *Tachyporus chrysomelinus* (Linnaeus, 1758): 2 .
 - : 1988 - 2 .
788. *Tachyporus nitidulus* (Fabricius, 1781): 1 .
 — : 1988 - 1 .
789. *Tachyporus obtusus* (Linnaeus, 1767): 2 .
 - : 1988 - 2 .
790. *Tachyporus transversalis* Gravenhorst, 1806: 8 .
 - : 1988 - 8 .
791. *Tachinus laticollis* Gravenhorst, 1802: 2 .
 - : 1988 - 2 ,
792. *Tachinus marginellus* (Fabricius, 1781): 1 .
 - : 1988 - 1 .
793. *Tachinus rufipes* (De Geer, 1774): 972 .
 - : 1988 - 339 , 393

794. Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) / , 240 , 1988.
: 1987 - 3 - 3 .
795. Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806) / , 1988.
: 2 .
- : 1988 - 1 ; : 1987 - 1
796. Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806): 2
: 1987 - 2
797. Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) / , 1988.
: 1 .
- 1987 - 1
798. Gyrophaena affinis (. Sahlberg, 1831): 6 .
- : 1988 - 6 ,
799. Gyrophaena angustata (Stephens, 1832) / , 1989.
: 1 .
: 1987 - 1
800. Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 / , 1988.
: 1 .
: 1987 - 1
801. Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830) / , 1988.
: 1 .
: 1987 - 1
802. Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806) / , 1988.
: 2 .
: 1987 - 2
803. Ischnopoda coarctata (Erichson, 1837): 3 .
: 1987 - 3
804. Ischnopoda leucopus (Marsham, 1802) / , 1988.
: 1 .
: 1987 - 1

805. *Amischa analis* (Gravenhorst, 1802): 7
 - : 1988 - 7
806. *Notothecta flavipes* (Gravenhorst, 1806) / , 1988.
 : 7
 : 1987 — 7
807. *Geostiba circellaris* (Gravenhorst, 1806): 108
 - : 1988 - 37
 , 11 , 60
808. *Dinaraea linearis* (Gravenhorst, 1802) / , 1988.
 : 1
 - : 1988 — 1
809. *Liogluta granigera* (Kiesenwetter, 1850): 60
 — : 1988 - 13
 , 47
810. *Liogluta letzneri* (Eppelsheim, 1880): 11
 - : 1988 - 11
811. *Liogluta microptera* Thomson, 1867: 11
 - : 1988 - 11
812. *Atheta gyllenhali* (Thomson, 1856) / , 1988.
 : 1
 - : 1988 - 1
813. *Atheta luridipennis* (Mannerheim, 1831): 1
 - : 1988 - 1
814. *Atheta terminalis* (Gravenhorst, 1806): 1
 — : 1988 — 1
815. *Atheta tmolosensis* Bernhauer, 1940 / , ,
 1991.
 : 3
 - : 1988 - 3
816. *Atheta hepatica* (Erichson, 1839): 1
 - : 1988 - 1
817. *Atheta liturata* (Stephens, 1832) / , , 1991.

- : 2 .
- : 1987 - 2 .
818. *Atheta fungi* (Gravenhorst, 1806) / , 1990.
 : 75 .
 - : 1988 - 41 , , 4 ,
 , 28 , ; : 1987 - 2 .
819. *Atheta crassicornis* (Fabricius, 1792): 1 .
 : 1987 - 1 .
820. *Atheta paracrassicornis* Brundin, 1954 / , 1988.
 - : 1988 - 13 , ;
 : 1987 - 2 .
821. *Atheta trinotata* (Kraatz, 1856): 1 .
 - : 1988 - 1 .
822. *Atheta sodalis* (Erichson, 1837): 18 .
 - : 1988 - 18 .
823. *Atheta myrmecobia* (Kraatz, 1856): 4 .
 - : 1988 - 4 .
824. *Atheta longicornis* (Gravenhorst, 1802): 1 .
 : 1987 — 1 .
825. *Acrotona planipennis* (Thomson, 1855): 90 .
 - : 1988 - 59 , 9
 , 22 .
826. *Drusilla canaliculata* (Fabricius, 1787): 8 .
 - : 1988 - 8 .
827. *Zyras collaris* (Paykull, 1800): 3 .
 - : 1988 - 3 .
828. *Zyras funestus* (Gravenhorst, 1806)- 38 .
 - : 1988 - 38 .
829. *Zyras humeralis* (Gravenhorst, 1802)- 3 .
 - : 1988 - 3 .
830. *Ilyobates nigricollis* (Paykull, 1800): 18 .
 - : 1988 - 12 ,
 , 6 , .

831. *Chilopora rubicunda* (Erichson, 1837): 1 .
 - : 1988 - 1 .
832. *Ityocara rubens* (Erichson, 1837): 2 .
 - 1988 - 2 .
833. *Meotica apicalis* G.Benick, 1953 / , , 1990.
 : 1 .
 - : 1988 - 1 .
834. *Meotica exilis* (Erichson, 1837): 1 .
 - : 1988 - 1 .
835. *Oxypoda elongatula* Aube, 1850: 1 .
 : 1988 - 1 .
836. *Oxypoda procerula* Mannerheim, 1831: 1 .
 - : 1988 - 1 .
837. *Oxypoda lividipennis* Mannerheim, 1831: 21 .
 - : 1988 - 21 .
838. *Oxypoda vittata* Markel, 1842: 2 .
 - : 1988 - 2 .
839. *Oxypoda umbrata* (Gyllenhal, 1810) / , 1988.
 : 92 .
 - : 1988 - 8 , 27 ,
 57 .
840. *Oxypoda abdominalis* (Mannerheim, 1831): 2 .
 - 1988 - 1 , 1987 — 1 .
841. *Oxypoda exoleta* Erichson, 1839: 3 .
 - : 1988 - 3 .
842. *Oxypoda praecox* Erichson, 1839: 21 .
 - : 1988 - 21 .
843. *Oxypoda annularis* (Mannerheim, 1831): 19 .
 - : 1988 - 4 ,
 , 15 .

844. *Oxypoda brachyptera* (Stephens, 1832): 15 .
 - : 1988 - 1 , 14
845. *Oxypoda haemorrhoea* (Mannerheim, 1831): 1 .
 - : 1988 - 1
846. *Thyasophila angulata* (Erichson, 1837) / , 1989.
 : 2 .
 : 1987 - 2
847. *Aleochara brevipennis* Gravenhorst, 1806: 12 .
 — : 1988 - 9 , 2
 , 1
848. *Aleochara moerens* Gyllenhal, 1827 / , ,
 1991.
 : 4 .
 : 1988 - 4 .
- Histeridae
849. *Saprinus rugifer* (Paykull, 1809) / , , 1991.
 : 2 .
 : 1990 - 2
850. *Saprinus semistriatus* (Scriba, 1790): 11 .
 : 1993/95 - 11 , , ,
851. *Saprinus aeneus* (Fabricius, 1775): 8 .
 : 1993/94 - 8 , ,
852. *Hypocaccus rugiceps* (Duftschmid, 1805): 37 .
 : 1993 - 14 , ; :
 1993 - 95 - 23 .
853. *Hypocaccus rugifrons* (Paykull, 1798): 24 .
 : 1993 - 95 - 24 , ,
854. *Paromalus parallelepipedus* (Herbst, 1792): 11 .
 : 1993 - 6 ,
 ; : 1994 - 5 .
- 104
855. *Margarinotus brunneus* (Fabricius, 1775) 1 . : 1983 - 1
856. *Margarinotus striola* (Sahlberg, 1819): 6 .
 : 1993 - 6

857. *Margarinotus terricola* (Germar, 1824): 2
: 1988 - 2
858. *Margarinotus bipustulatus* (Schrank, 1781): 13
: 1988 - 13
859. *Margarinotus obscurus* (Kugelann, 1792): 1
: 1988 - 1
860. *Margarinotus ventralis* (Marseul, 1854): 3
: 1983 - 3
861. *Margarinotus purpurascens* (Herbst, 1792): 4
: 1983 - 4
862. *Margarinotus carbonarius* (Hoffmann, 1803): 2
: 1983 - 2
863. *Hister unicolor* Linnaeus, 1758: 14
: 1988/93 - 9
; : 1993/94 — 5
864. *Hister illigeri* Duftschmid, 1805: 1
: 1990 - 1
865. *Hister helluo* Truqui, 1852: 1
: 1993 - 1
866. *Atholus duodecimstriatus* quatuordecimstriatus (Gyllenhal, 1808): 4
: 1990 - 4
867. *Platysoma minus* (Rossi, 1792): 3
: 1993 - 2
; : 1994 - 1
868. *Hololepta plana* (Sulzer, 1776): 1
: 1995 - 1

Scirtidae

869. *Microcara testacea* (Linnaeus, 1767)- 8 .
 - 1993 - 95 - 8 , ,
870. *Cyphon padi* (Linnaeus, 1758). 15 .
 : 1993 - 95 - 4 ; 1993 -
 11 .
871. *Scirtes hemisphaericus* (Linnaeus, 1758): 2 .
 : 1994 - 2 .
- Trogidae
872. *Trox sabulosus* (Linnaeus, 1758): 4 .
 : 1990 - 4 ,
873. *Trox scaber* (Linnaeus, 1767): 1 .
 : 1990 - 1 .
- Scarabaeidae
874. *Geotrupes spiniger* (Marsham, 1802): 6 .
 : 1990 - 3 ; ; 1993 - 3 .
875. *Geotrupes stercorarius* (Linnaeus, 1758): 18 .
 : 1990 - 10 , ; : 1993
 - 8 .
876. *Geotrupes stercorosus* CScriba, 1791): 12 .
 : 1993 - 4 , ,
 ; : 1993-95 - 8 .
877. *Geotrupes vernalis* (Linnaeus, 1758) / i , 1993.
 : 3
 - 1993 - 3 .
878. *Copris lunaris* (Linnaeus, 1758).. 3 .
 : 1990 - 3 .
879. *Caccobius schreberi* (Linnaeus, 1767): 6 .
 : 1990 - 6 .

880. *Onthophagus taurus* (Schreber, 1759): 12
: 1990 - 12
881. *Onthophagus nuchicornis* (Linnaeus, 1758): 37
: 1990 - 21 ; : 1990- 16
882. *Onthophagus gibbulus* (Pallas, 1781): 3
: 1990 - 3
883. *Onthophagus fracticornis* (Preyssler, 1790): 6
: 1990 - 6
884. *Aphodius erraticus* (Linnaeus, 1758): 3
: 1990 - 3
885. *Aphodius subterraneus* (Linnaeus, 1758): 10
: 1990 - 10
886. *Aphodius fossor* (Linnaeus, 1758): 12
: 1990 - 3 ; : 1993 - 9
887. *Aphodius haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758): 8
: 1990 - 8
888. *Aphodius depressus* (Kugelann, 1792): 3
: 1990 - 3
889. *Aphodius pusillus* (Herbst, 1789): 4
: 1982 - 4
890. *Aphodius equestris* (Panzer, 1798): 2
: 1988 - 2
891. *Aphodius distinctus* (O.F. Müller, 1776): 6
: 1990 - 6
892. *Aphodius prodromus* (Brahm, 1790)- 23
: 1990/93 - 23
893. *Aphodius lgoeckii* Roubal, 1912 / , 1991.
: 3

894. *Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) 47 .
 : 1990 - 21 ; : 1993 - 14 ; :
 1993/94 - 12 .
895. *Aphodius foetens* (Fabricius, 1787): 2 .
 : 1993 - 2 .
896. *Aphodius ater* (De Geer, 1774): 4 .
 : 1990 - 4 , , .
897. *Aphodius sordidus* (Fabricius, 1775): 16 .
 : 1993 - 16 .
898. *Aphodius niger* (Panzer, 1797) / , , 1991.
 : 5 .
 : 1982 - 5 , .
899. *Aphodius varians* Duftschmid, 1805 / , ,
 1991.
 : 3 .
 : 1982 - 3 .
900. *Aphodius plagiatus* (Linnaeus, 1767): 1 .
 : 1983 - 1 .
901. *Aphodius granarius* (Linnaeus, 1767): 6 .
 : 1990 - 6 .
902. *Oxyomus sylvestris* (Scopoli, 1763): 7 .
 - : 1988 - 7 .
903. *Psammodymus sulcicollis* (Illiger, 1802): 1 .
 : 1982 - 1 .
904. *Rhyssenus germanus* (Linnaeus, 1767): 2 .
 . 1982 - 2 .
905. *Serica brunnea* (Linnaeus, 1758) / , , 1980.
 . 1993 - 6 .
906. *Maladera holosericea* (Scopoli, 1772) 4 .
 : 1993 - 4 .

907. *Amphimallon solstitiale* (Linnaeus, 1758) / 1980. : 3 .
: 1993 - 3
908. *Melolontha hippocastani* Fabricius, 1801./ 1980. : 5 . : 1993 - 5
909. *Melolontha melolontha* (Linnaeus, 1758): 2 .
: 1993 - 2
910. *Polyphylla fullo* (Linnaeus, 1758): 2 .
: 1993 - 2
911. *Anomala dubia* (Scopoli, 1763) / , , 1980.
: 3 .
: 1994 - 3
912. *Phyllopertha horticola* (Linnaeus, 1758): 12 .
: 1993/94 - 12
913. *Hoplia parvula* Krynicki, 1832: 5 .
- 1993 - 5
914. *Hoplia graminicola* (Fabricius, 1792): 7 .
. 1993 /94 - 7
915. *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758): 2 .
: 1993 - 2
916. *Tropinota hirta* (Poda, 1761): 4 .
: 1993/94 - 4
917. *Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758): 7 .
: 1993 - 3 ; : 1993/94 - 4
918. *Potosia affinis* (Andesch, 1797): 1 .
: 1993 - 1
919. *Potosia cuprea* ssp. *metallica* (Herbst, 1786): 12 .
- 1993 - 4 , , 1993/94 - 8

920. *Valgus hemipterus* (Linnaeus, 1758): 4 .
: 1993/94 - 4 .
921. *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1763) / . , .
1991. : 1 .
: 1994 - 1 .
922. *Gnorimus nobilis* (Linnaeus, 1758) / . , .
1991. : 5 .
: 1987 — 5 .
923. *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758): 2 .
: 1988 - 2 .
924. *Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1758) / . , 1994.
: 4 .
: 1993/94 — 4 .
- Cantharidae
925. *Cantharis fusca* Linnaeus, 1758: 5 .
: 1994 - 2/3 .
926. *Cantharus obscura* Linnaeus, 1758: 1 .
: 1994 - 0/1 .
927. *Cantharis nigricans* (O.F.Müller, 1776): 5 .
: 1994 - 0/4 ; : 1992 - 0/1 .
928. *Cantharis pellucida* Fabricius, 1792: 1 .
: 1989 - 1/0 .
929. *Cantharis livida* Linnaeus, 1758: 5 .
: 1991 - 2/1 ; : 1989 - 2/0 .
930. *Cantharis figurata* Mannerheim, 1843: 9 .
: 1994 - 0/6 ; : 1992 -1/2 .
931. *Cantharis rufa* Linnaeus, 1758: 3 .
: 1994 - 3/0 .

932. *Cantharis fulvicollis* Fabricius, 1792: 6 .
: 1994 - 1/3 ; : 1989 - 2/0 .
933. *Cantharis nigra* Herbst, 1784: 3 .
: 1992 - 2/0 ; : 1989 - 1/0 .
934. *Cantharis lateralis* Linnaeus, 1758: 2 .
: 1987 - 1/0 ; : 1992 - 1 /0 .
935. *Rhagonycha fulva* (Scopoli, 1763): 3 .
: 1992 - 2/1 .
936. *Rhagonycha testacea* (Linnaeus, 1758): 4 .
: 1987 - 1/0 ; : 1992- 3/0 .
937. *Rhagonycha limbata* G.G.Thomson, 1864: 1 .
- 1987 - 0/1 .
938. *Rhagonycha elongata* (Fallen, 1807): 2 .
: 1989 - 0/2 .
939. *Malthinus biguttatus* (Linnaeus, 1758): 1 .
: 1981 - 1/0 .
940. *Malthinus punctatus* (Geoffroy, 1785): 13 .
: 1994 - 7/6 .
941. *Malthodes fuscus* (Waltl, 1838): 6 .
: 1994 - 2/4 .
942. *Malthodes pumillus* (Brebisson, 1835): 2 .
: 1994 - 0/2 .
- Elateridae
943. *Agrypnus murinus* (Linnaeus, 1758) / , , 1980.
: 1 .
: 1987 - 1 juv. .
944. *Athous niger* (Linnaeus, 1758) / , , 1980.
: 6 .
: 1987 - 6 juv. .

945. *Athous vittatus* (Fabricius, 1792): 29 .
: 1987 - 29 juv. .
946. *Athous haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801) / , Bepe ,
1980.
: 26 .
: 1987 - 26 juv. .
947. *Athous subfuscus* (Müller, 1764) / , , 1980.
: 14 .
: 1987 — 13 juv. , 1 juv. .
948. *Actenicerus sjaelandicus* (Müller, 1764) / , , 1980.
949. *Prosternon tessellatum* (Linnaeus, 1758) / , ,
1980.
: 1 .
: 1987 - 1 juv. .
950. *Selatosomus nigricornis* (Panzer, 1799) / , , 1980.
951. *Selatosomus aeneus* (Linnaeus, 1758) / , , 1980.
952. *Selatosomus latus* (Fabricius, 1801) / , , 1980.
: 9 .
: 1987 — 9 juv. .
953. *Ampedus pomonae* (Stephens, 1830) / , , 1980.
954. *Ampedus pomorum* (Herbst, 1784) / , , 1980.
955. *Melanotus villosus* (GeoHroy, 1785) / , , 1980.
956. *Agriotes sputator* (Linnaeus, 1758): 1 .
: 1987 - 1 juv. .
957. *Agriotes lineatus* (Linnaeus, 1767) / , , 1980.
958. *Ectinus aterrimus* (Linnaeus, 1761) / , , 1980.

- : 4 .
- : 1987 - 4 juv.
959. *Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758) / , , 1980.
: 15 .
: 1987 - 15 juv. .
- Byrrhidae
960. *Morychus aeneus* (Fabricius, 1775): 7 .
: 1993 - 7
961. *Lamprobyrrhulus nitidus* (Schaller, 1783): 2 .
: 1994 - 2
962. *Cytilus sericeus* (Forster, 1771): 11 .
: 1993 - 95 - 11 ,
963. *Byrrhus fasciatus* (Forster, 1771): 17 .
: 1993 - 95 - 17 ,
964. *Byrrhus pustulatus* (Forster, 1771) / , 1994.
: 3 .
: 1994 - 3 , -
965. *Byrrhus pilula* (Linnaeus, 1758) / , , 1980.
: 9 . : 1993/95 — 9 ,
966. *Porcinolus murinus* (Fabricius, 1794): 7 .
: 1993/94 - 7
967. *Curimopsis paleata* (Erichson, 1846): 2 .
: 1993 - 2
- Dermestidae
968. *Dermestes lanarius* Illiger, 1801: 2 .
: 1993 - 2 .

969. *Dermestes lardarius* Linnaeus, 1758: 4 .
; 1994 - 4 .
- Anobiidae
970. *Stegobium paniceum* (Linnaeus, 1758): 24 .
- : 1993 - 24 .
- Ptinidae
971. *Ptinus fur* (Linnaeus, 1758): 14 .
— : 1993 - 14 .
- Trogossitidae
972. *Tenebroides mauritanicus* (Linnaeus, 1758): 1 .
: 1992 - 1 .
- Cleridae
973. *Thanasimus formicarius* (Linnaeus, 1758): 1 .
: 1992 - 1 .
974. *Trichoides apiarius* (Linnaeus, 1758): 4 .
: 1992 - 4 .
975. *Necrobia violacea* (Linnaeus, 1758): 18 .
: 1992 - 7 ; : 1993 - 11 .
- Melyridae
976. *Dasytes niger* (Linnaeus, 1761): 11 .
: 1992 - 95 - 11 , , .
977. *Dasytes plumbeus* (O.F.Müller, 1776): 7 .
1993 - 95 - 7 , .
978. *Dolichosoma lineare* (Rossi, 1792): 8 .
: 1993/94 - 8 , .
- Malachiidae
979. *Cordylepherus viridis* (Fabricius, 1787): 6 .
: 1993./94 - 6 , .

980. *Malachius aeneus* (Linnaeus, 1758): 8
: 1993/94 - 8
981. *Malachius bipustulatus* (Linnaeus, 1758)- 8
: 1993/94 - 8
- Kateretidae
982. *Brachypterus urticae* (Fabricius, 1792): 12
: 1992 - 95 - 12
- Nitidulidae
983. *Eपुरaea guttata* (Olivier, 1811): 2
: 1992 - 2
984. *Eपुरaea marseuli* Reitter, 1872: 3
: 1992/94 - 3
985. *Laria dulcamarae* Scopoli, 1763: 3
: 1992/93 - 3
986. *Meligethes aeneus* (Fabricius, 1775): 23
: 1992/95 - 11
1992/95 - 12
987. *Pocadius ferrugineus* (Fabricius, 1775): 2
: 1995 - 2
988. *Cyllodes ater* (Herbst, 1792): 4
: 1993 - 4
989. *Cryptarcha undata* (Olivier, 1790)- 2
: 1994 - 2
990. *Glischrochilus hortensis* (Geoffroy, 1785): 10
- 1995 - 10

Sphindidae

991. *Sphindus dubius* (Gyllenhal, 1808): 1
: 1992 - 1

Rhizophagidae

992. *Rhizophagus ferrugineus* (Paykull, 1800): 2
: 1993 - 2
993. *Rhizophagus dispar* (Paykull, 1800): 12
: 1992/95 - 3
; - 1992/95 - 9
994. *Rhizophagus bipustulatus* (Fabricius, 1792): 17
: 1993/95 - 4
; : 1993/ 95 -
13
995. *Rhizophagus nitidulus* (Fabricius, 1798): 3
: 1994 - 3

— Cucujidae

996. *Silvanus bidentatus* (Fabricius, 1792): 7
: 1993 — 7
997. *Silvanus unidentatus* (Olivier, 1790): 1
: 1993 - 1
998. *Psammoecus bipunctatus* (Fabricius, 1792): 1
: 1993 - 1

— Erotylidae

999. *Tritoma bipustulata* Fabricius, 1775: 3
: 1994 - 3
1000. *Triplax aenea* (Schaller, 1783): 1
: 1992 - 1
1001. *Triplax russica* (Linnaeus, 1758): 17
: 1992 - 10
; : 1993 - 7

1002. *Triplax scutellaris* Charpentier, 1825: 4 .
 : 1992 - 3
 ; : 1993 - 1 .
1003. *Triplax rufipes* (Fabricius, 1781). 6 .
 : 1992 - 6 .
1004. *Dacne bipustulata* (Thunberg, 1781): 21 .
 : 1993/95 - 12
 , ; : 1993/ 95-9 .

Endomychidae

1005. *Mycetaea subterranea* (Fabricius, 1801): 1 .
 : 1992 - 1 .
1006. *Mycetina cruciata* (Schaller, 1783): 3 .
 : 1992 - 2 ; : 1994 -
 1 .
1007. *Endomychus coccineus* (Linnaeus, 1758) / , 1994.
 : 3 .
 : 1995 - 3 .

— Latridiidae

1008. *Latridius consimilis* Mannerheim, 1844: 2 .
 : 1993 - 2/0 .
1009. *Latridius brevicollis* (Thomson, 1868) / , 1991.
 : 2 .
 : 1993 - 2/0 ,
1010. *Enicmus fungicola* Thomson, 1868: 3 .
 : 1993 - 3/0 ,
1011. *Enicmus rugosus* (Herbst, 1793): 15 .
 - 1993 - 15/0 ,
1012. *Enicmus testaceus* (Stephens, 1830) / , 1991.
 : 1 .
 . 1987 - 1/0 ,

- 1013 *Enicmus histrio* Joy et Tomlin, 1910: 1 .
: 1993 - 1/0
- 1014 *Corticaria lapponica* (Zetterstedt, 1838) / , 1991.
: 2 .
: 1987 - 1/0 ; : 1993
- 1/0 .
1015. *Corticaria serrata* (Paykull, 1798) / , 1991.
: 1 .
: 1987 - 1/0 , -
1016. *Corticaria longicollis* (Zetterstedt, 1838) / , 1991.
: 2 .
: 1987 - 2/0 ,
1017. *Corticaria elongata* (Gyllenhal, 1827) / , 1991.
: 1 .
: 1987 - 1/0 .
1018. *Corticaria gibbosa* (Herbst, 1793): 2 .
: 1993 - 2/0 , ,
1019. *Corticarina truncatella* (Mannerheim, 1844): 1 .
: 1992 - 1/0 , ,
1020. *Corticarina fuscata* (Gyllenhal, 1827) / , 1991.
: 7 .
: 1987 - 2/0 ; : 1993
- 3/0 ; : 1992 - 2/0 .
- 1021 *Melanophthalma curticolis* (Mannerheim, 1844): 4 .
: 1993 - 4/0
- 1022 *Melanophthalma suturalis* (Mannerheim, 1844): 2 .
- 1993 - 2/0

Cisidae

1023. *Cis nitidus* (Fabricius, 1792) 3
: 1993 - 3
1024. *Cis jacquemartii* Mellie, 1848: 16
: 1993/95 - 16
1025. *Cis comptus* Gyllenhal, 1827: 5
: 1993 - 5
1026. *Cis hispidus* (Paykull, 1798): 14
: 1993 - 14
1027. *Cis boleti* (Scopoli, 1763): 4
: 1992/94 - 4
1028. *Cis fagi* Walth, 1839: 3
: 1993 - 3
1029. *Cis castaneus* Mellie, 1848: 1
: 1993 - 1
1030. *Ennearthron cornutum* (Gyllenhal, 1827): 2
: 1993 - 2
1031. *Sulcaxis affinis* (Gyllenhal, 1827): 12
: 1993 - 12
1032. *Ropalodontus perforatus* (Gyllenhal, 1813): 14
: 1993 - 14
1033. *Octotemnus glabriculus* (Gyllenhal, 1827): 6
: 1993 - 6
1034. *Octotemnus mandibularis* (Gyllenhal, 1813) / , 1994.

— Colydiidae

1035. *Colydium filiforme* Fabricius, 1792: 4
: 1995 - 4
1036. *Bitoma crenata* (Fabricius, 1755): 10
: 1993/95 - 10

— Mycetophagidae

1037. *Litargus connexus* (Geoffroy, 1785): 4
: 1992/93 - 4
1038. *Mycetophagus ater* (Reitter, 1879): 1
: 1992 - 1
1039. *Mycetophagus quadripustulatus* (Linnaeus, 1761): 11
: 1992/95 - 11
1040. *Mycetophagus multipunctatus* Fabricius, 1792: 6
: 1992/95 - 6
1041. *Mycetophagus populi* Fabricius, 1798: 1
: 1993 - 1
1042. *Typhaea stercorea* (Linnaeus, 1758): 3
: 1992/94 - 3

— Tenebrionidae

1043. *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767): 17
: 1992/95 - 17
1044. *Eledona agricola* (Herbst, 1783): 15
: 1993/95 - 15

1045. *Diaperis boleti* (Linnaeus, 1758): 14
: 1992/95 - 14
1046. *Pedinus femoralis* (Linnaeus, 1767): 1
: 1992 - 1
1047. *Opatrum sabulosum* (Linnaeus, 1761): 5
: 1993/94 - 5
1048. *Melanimon tibiale* (Fabricius, 1781): 4
: 1993/94 - 4
1049. *Crypticus quisquilius* (Linnaeus, 1761): 8
: 1993/94 - 8
1050. *Scaphidema metallicum* (Fabricius, 1792): 2
: 1993/94 - 2
1051. *Alphitophagus bifasciatus* (Say, 1823): 1
: 1992 - 1
1052. *Uloma culinaris* (Linnaeus, 1758): 2
: 1992/93 - 2
1053. *Uloma rufa* (Piller et Mitterpacher, 1783): 3
: 1993/94 - 3
1054. *Upis ceramboides* (Linnaeus, 1758): 3
: 1993/95 - 3
1055. *Tenebrio molitor* Linnaeus, 1758: 2
: 1992/93 - 2
()
1056. *Platydema dejeannii* Castelnau et Brulle, 1831: 2
: 1992 - 2

- 1057 *Alphitobius diaperinus* (Panzer, 1797): 1 .
: 1992 - 1
- 1058 *Pseudocistela ceramboides* (Linnaeus, 1758): 3 .
: 1993/94 - 3
1059. *Isomira murina* (Linnaeus, 1758) / , 1974.
1060. *Omophlus rufitarsis* (Leske, 1785) / , , 1980.
- Cerambycidae
1061. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758): 1 .
: 1987 - 1
1062. *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781): 8 .
: 1987 - 8
1063. *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758: 7 .
: 1987 - 7
1064. *Cerambyx scopolii* Fuessli, 1775: 1 .
: 1987 - 1
1065. *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758): 9 .
: 1987 - 9
1066. *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758): 6 .
: 1987 - 6
1067. *Xylotrechus rusticus* (Linnaeus, 1758): 4 .
: 1987 - 4
1068. *Clytus tropicus* Panzer, 1795: 1 .
: 1987 - 1
1069. *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758): 1 .
. 1987 - 1

1070. *Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1761): 1
: 1987 - 1
1071. *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758): 1
: 1987 - 1
1072. *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758): 2
: 1987 - 2
1073. *Menesia bipunctata* (Zoubkoff, 1829): 4
: 1987 - 4
1074. *Oberea erythrocephala* (Schrank, 1776) / , , 1991.
: 2
: 1987 - 2
- Chrysomelidae
1075. *Donacia semicuprea* Panzer, 1796 / , 1988.
: 8
: 1993 - 5 ; : 1994 - 3
1076. *Donacia aquatica* (Linnaeus, 1758): 5
: 1993 - 2 ; : 1994 - 3
1077. *Donacia bicolora* Zschach, 1788: 2
: 1994 - 2
1078. *Donacia vulgaris* Zschach, 1788: 3
: 1993 - 3
1079. *Lilioceris lili* (Scopoli, 1763): 2
: 1995 - 2
1080. *Lema cyanella* (Linnaeus, 1758): 4
: 1993 - 4
1081. *Oulema erichsonii* (Suffrian, 1841): 12
: 1993 - 8 , 1994 - 4
1082. *Oulema gallaeciana* (Heyden, 1870): 3
: 1992 - 3

1083. *Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758): 15 .
: 1992 - 6 ; : 1994 - 9
1084. *Coptocephala unifasciata* (Scopoli, 1763): 12 .
: 1993 - 4 , 1994 - 5 ,
1995 - 3 .
1085. *Pachybrachis hieroglyphicus* (Laicharting, 1781) / , 1988.
: 17 .
: 1993 - 17 .
1086. *Cryptocephalus sexpunctatus* (Linnaeus, 1758): 7 .
: 1994 - 2 , 1995 - 5
1087. *Cryptocephalus sericeus* (Linnaeus, 1758): 6 .
: 1994 - 6 .
1088. *Cryptocephalus nitidus* (Linnaeus, 1758): 2 .
: 1993 - 2 .
1089. *Cryptocephalus parvulus* O.F. Müller, 1776: 2 .
: 1993 - 2 .
1090. *Cryptocephalus decemmaculatus* (Linnaeus, 1758): 1 .
: 1993 - 1 .
1091. *Cryptocephalus moraei* (Linnaeus, 1758): 8 .
: 1993 - 2 , 1994 - 3 , 1995 -
3 .
1092. *Cryptocephalus vittatus* Fabricius, 1775: 1 .
: 1993 - 1 .
1093. *Cryptocephalus pini* (Linnaeus, 1758): 1 .
: 1995 - 1 .
1094. *Cryptocephalus ocellatus* Drapiez, 1819: 3 .
: 1995 - 3 .
1095. *Cryptocephalus exiguus* Schneider, 1792: 2 .
: 1993 - 2 .
1096. *Cryptocephalus fulvus* (Goeze, 1777): 5 .
: 1993 - 2 , 1995 - 3 .

1097. *Cryptocephalus pusillus* Fabricius, 1777: 9 .
: 1993 - 6 , 1994 - 3 .
1098. *Bromius obscurus* (Linnaeus, 1758): 3 .
: 1995 - 3 .
1099. *Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824): 4 .
: 1994 - 4 .
1100. *Chrysolina graminis* (Linnaeus, 1758): 3 .
: 1994 — 3 .
1101. *Chrysolina polita* (Linnaeus, 1758): 3 .
: 1993 - 3 .
1102. *Chrysolina sanguinolenta* (Linnaeus, 1758): 2 .
: 1993 - 2 .
1103. *Chrysolina varians* (Schaller, 1783): 14 .
: 1993 - 3 , 1994 - 8 , 1995
- 3 .
1104. *Chrysolina hyperici* (Forster, 1771): 7 .
: 1993 - 2 , 1994 — 5 .
1105. *Chrysolina geminata* (Paykull, 1799): 4 .
: 1994 — 4 .
1106. *Chrysolina fastuosa* (Scopoli, 1763): 14 .
: 1993 - 9 , 1994 — 5 .
1107. *Gastrophysa polygoni* (Linnaeus, 1758): 7 .
: 1993 - 7 .
1108. *Gastrophysa viridula* (De Geer, 1775): 4 .
: 1994 - 4 .
1109. *Phaedon cochleariae* (Fabricius, 1792): 12 . : 1993 - 8
, 1994 — 4 .
1110. *Hydrothassa marginella* (Linnaeus, 1758): 4 .
: 1993 - 4 .

1111. *Plagiodera versicolora* (Laicharting, 1781): 3 .
: 1995 — 3 .
1112. *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763): 7 .
: 1992 - 7 .
1113. *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758: 5 .
: 1992 - 5 .
1114. *Chrysomela saliceti* (Weise, 1884): 58 .
: 1993 - 25 . , 1994 - 15 . , 1995
- 18 .
1115. *Linnaeidea aenea* (Linnaeus, 1758): 4 .
: 1992 - 4 .
1116. *Phratora laticollis* (Suffrian, 1851): 4 .
: 1993 - 4 .
1117. *Phratora vitellinae* (Linnaeus, 1758): 14 .
: 1993 - 10 . , 1994 - 4 .
1118. *Galerucella nymphaeae* (Linnaeus, 1758): 6 .
: 1993 - 6 .
1119. *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799): 9 .
: 1993 - 9 .
1120. *Lochmaea capreae* (Linnaeus, 1758): 6 .
: 1993 — 6 .
1121. *Galeruca tanacetii* (Linnaeus, 1758) / . , 1988.
: 4 .
: 1994 - 4 .
1122. *Agelastica alni* (Linnaeus, 1758): 8 .
: 1993 — 5 . , 1994 - 3 .
1123. *Phyllobrotica quadrimaculata* (Linnaeus, 1758): 2 .
: 1993 - 2 .
1124. *Luperus longicornis* (Fabricius, 1781): 1 .
- 1993 - 1 .
1125. *Luperus xathopoda* (Schrank, 1781): 1 .
- 1995 - 1 .

1126. *Phyllotreta nemorum* (Linnaeus, 1758): 17 .
: 1993 - 10 , 1994 - 7 .
1127. *Phyllotreta striolata* (Fabricius, 1803): 7 .
: 1993 - 7 .
1128. *Aphthona lutescens* (Gyllenhal, 1813): 8 .
: 1993 — 8 .
1129. *Aphthona violacea* (Koch, 1803): 1 .
: 1993 - 1 .
1130. *Aphthona euphorbiae* (Schrank, 1781): 7 .
: 1992 - 2 , 1993 - 5 .
1131. *Aphthona nonstriata* (Goeze, 1777): 2 .
: 1993 - 2 .
1132. *Longitarsus tabidus* (Fabricius, 1775): 1 .
: 1993 - 1 .
1133. *Longitarsus lycopi* (Foudras, 1860): 2 .
: 1980 - 2 .
1134. *Longitarsus nasturtii* (Fabricius, 1792): 2 .
: 1993 - 2 .
1135. *Longitarsus parvulus* (Paykuli, 1799): 4 .
: 1993 - 4 .
1136. *Altica oleracea* (Linnaeus, 1758): 5 .
: 1993 - 5 .
1137. *Asiorestia interpunctata* (Motschulsky, 1859): 4 .
: 1993 - 4 .
1138. *Asiorestia ferruginea* (Scopoli, 1763): 7 .
: 1992 - 2 , 1993 - 5 .
1139. *Crepidodera fulvicornis* (Fabricius, 1792): 18 .
: 1993 - 10 , 1994 - 8 .
1140. *Crepidodera aurata* (Marsham, 1802): 17 .
: 1993 — 17 .

1141. *Mantura chrysanthemi* (Koch, 1803): 1 .
: 1993 - 1 .
1142. *Chaetocnema concinna* (Marsham, 1802): 5 .
: 1993 - 3 , 1994 - 2 .
1143. *Chaetocnema brevhiscula* (Faldermann, 1837): 2 .
: 1993 - 2 .
1144. *Dibolia cynoglossi* (Koch, 1803): 2 .
: 1993 - 2 .
1145. *Psylliodes dulcamarae* (Koch, 1803): 5 .
: 1993 - 5 .
1146. *Cassida viridis* Linnaeus, 1758: 9 .
: 1994 - 9 .
1147. *Cassida nebulosa* Linnaeus, 1758: 3 .
: 1994 - 3 .
1148. *Cassida flaveola* Thunberg, 1794: 1 .
: 1993 - 1 .
1149. *Cassida vibex* Linnaeus, 1767: 2 .
: 1993 - 2 .
1150. *Cassida rubiginosa* O.F. Müller, 1776: 4 .
: 1993 - 4 .
1151. *Cassida sanguinosa* Suffrian, 1844: 1 .
: 1993 - 1 .
1152. *Cassida denticollis* Suffrian, 1844: 3 .
: 1993 - 3 .
1153. *Cassida vittata* Villers, 1789: 6 .
: 1993 - 4 ,
1994 - 2 .