



Интересные виды *Coleoptera* и насекомых других отрядовъ, найденные въ 1904 и 1905 гг. въ Ямбургскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губ.

В. Баровскаго.

Экскурсируя лѣтомъ 1904—05 гг. въ окрестностяхъ города Ямбурга Спб. губ., я собралъ до 15.000 насекомыхъ разныхъ отрядовъ. Въ числѣ видовъ этого сбора оказалось довольно много рѣдкихъ; изъ нихъ восемь видовъ и одна разновидность *Coleoptera* являются новыми для фауны Спб. губ. Руководствуясь списками барона Остенъ-Сакена и Оберта, а также сообщениями В. В. Мазаракія, Ю. И. Бекмана и Г. Г. Якобсона, я считаю этими новыми видами для Спб. губ. слѣдующіе:

Carabidae.

Limodromus krynickii Sperk. 28. V. 904¹⁾, показанъ Seidlitz'омъ въ *Fauna Baltica: Norddeutschland (Königsberg), Schweden und Russland*; у Sahlberg'a въ его *Catalogus Coleopterorum Faunae Fennicae* не показанъ.

Agonum impressum Panz. V—VII. 904—05, много на каменистыхъ отмеляхъ; показанъ Seidlitz'омъ: *Schweden bis Finland, bei uns nicht häufig*; у Sahlberg'a не показанъ.

Bembidium tenellum Er. 30. V. 905, нѣсколько экз. Въ Финляндіи не найденъ и приводится у Sahlberg'a только для Русской Кареліи (западная часть Олонецкой губ., къ западу отъ Онежскаго озера и южная часть Кемскаго уѣзда Архангельской губ.); по Seidlitz'у, обыкновененъ въ Прибалтійскихъ губ. Въ нынѣш-

¹⁾ Всѣ виды, гдѣ мѣстонахождение и имя собирателя не указаны, пойманы мною по берегамъ рѣки Луги, въ окрестностяхъ Ямбурга.

немъ году Д. К. Глазунову удалось поймать нѣсколько экз. этого вида въ Лужскомъ уѣздѣ.

Georyssidae.

Georyssus crenulatus Rossi. 28. V. 904, 17 экз. Seidlitz: „in ganz Eur., bei uns nicht häufig“. Sahlberg приводитъ его для нѣкоторыхъ мѣстъ Финляндіи: Аландскіе о-ва, Або и Русская Карелія. Всѣ экземпляры этого вида пойманы мною по берегу рѣки Луги, у самой воды, на обнаженныхъ корешкахъ дерна: насѣкомья, покрытыя глиной, ползли вверхъ по корешкамъ, въ видѣ маленькихъ комочковъ.

Byrrhidae [Limnichidae].

Limnichus sericeus Duft 31 V. 905. Seidlitz: in Eur. bis Finland. bei uns selten; у Sahlberg'a показанъ только для Русской Кареліи.

Staphylinidae.

Othius fulvipennis F. 12—23. VI. 904; по Seidlitz'у, не найденъ въ Прибалтійскихъ губ.; Sahlberg приводитъ его для нѣкоторыхъ мѣстъ Финляндіи, между прочимъ для Выборгской губ.

Bledius longulus Er. 16. VI. 905, 2 экз.; по Seidlitz'у, попадаетъ не часто въ Прибалтійск. губ.; Sahlberg'омъ приводится только для Русской Кареліи.

Arpedium brachypterum Grav. 2 экз. 16. VII. 905; Seidlitz: in Eur. bis Schweden und Finland, bei uns nicht gefunden; Sahlberg: почти для всей Финляндіи.

Telephoridae.

Podabrus alpinus var. **annulata** Kiesw. 16. VI. 905; Seidlitz: Прибалтійск. губ., Швеція и Финляндія; Sahlberg приводитъ почти для всей Финляндіи.

Къ интереснымъ, но уже ранѣе встрѣчавшимся въ районѣ Сиб. губ. видамъ относятся слѣдующіе:

Carabidae.

Cicindela maritima Dej.; берегъ рѣки Россони, 24. VI. 904, 12 экз. Наблюденіе этого вида въ предѣлахъ Сиб губ. подтверждено еще въ прошломъ году В. В. Мазаракіемъ, который ловилъ этотъ видъ по тому же берегу рѣки Россони, почти при впадении ея въ р. Нарову, у деревни Саркюль. Въ Эстляндіи, на морскомъ берегу (Шмецке, Гунгербургъ), *C. maritima* встрѣчается нерѣдко; для губерніи С.-Петербуржской заслуживаетъ вниманія.

Omphron limbatus F. 28. V. 904, подъ щепкой, въ ямкѣ, сдѣланной имъ самимъ, на песчаномъ берегу р. Луги, у самой воды.

Carabus menetriesi Fisch. Найденъ въ трехъ экземплярахъ: 1 экз. 29. V. 904, по берегу р. Луги, и 2 экз. 18. VIII. 904 на моховыхъ, клюквенныхъ болотахъ въ лѣсу. Въ прошломъ году я сообщалъ уже, что видъ этотъ встрѣчается на моховыхъ болотахъ, такъ какъ 8—10 экз. были пойманы мною въ Гатчинѣ, Царскосельск. уѣзда, подъ мохомъ, покрывающимъ валуны у болотъ. Нахождение *Carabus menetriesi* Fisch. въ аналогичныхъ условіяхъ, на моховыхъ, поросшихъ клюквою болотахъ, подтверждается и сообщеніями Д. К. Глазунова, поймавшего нѣсколько экз. этого вида минувшимъ лѣтомъ въ Лужскомъ уѣздѣ въ такой же обстановкѣ.

Elaphrus uliginosus F. 4. VI. 904, 2 экземпляра.

Elaphrus jakovlevi Sem. 26. V—26. VI. 904—05, въ большомъ количествѣ (около 200 экз.) по песчанымъ берегамъ Луги, поросшимъ *Carex* и другими растущими у воды растеніями.

Clibanarius dorsalis Pontopp. 29. V. 904. Видъ этотъ, широко распространенный и обыкновенный въ Европѣ, весьма рѣдко встрѣчается въ коллекціяхъ по С.-Петербургу. Кромѣ свѣдѣній, помѣщенныхъ въ спискахъ барона Остенъ-Сакена (гор. Павловскъ, Царскосельск. у., найденъ Кушакевичемъ) и Оберта, видъ этотъ извѣстенъ лишь по одному экз. изъ Лужскаго уѣзда въ Университетской коллекціи братьевъ А. Г. и Г. Г. Якобсоновъ. Въ коллекціи В. В. Мазаракія имѣется экземпляръ, пойманный имъ въ г. Нарвѣ у паровой пристани, по ту сторону р. Наровы.

Badister sodalis Duft. 29. V. 904. Очень рѣдкій у насъ видъ; Seidlitz указываетъ его: „in Schwd. u. v. Oestr. bis Ostpr, v. Asm. bei Dorpat gef.“; у Оберта и въ каталогѣ Sahlberg'a не показанъ. Впервые былъ найденъ мною въ 2 экз. въ окр. Гатчины, 19. V. 904. Всѣ три экз. пойманы въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и *Car. menetriesi* Fisch., на поросшихъ клюквою болотахъ.

Lyperus aterrimus Payk. 29. V—4. VI. 904, нѣсколько экз.

Bembidium nitidulum Marsch. 30. V. 905.

„ *humerale* Strm. 12—16. VI. 905.

„ *8-maculatum* Goeze 30 V. 905.

„ *ruficolle* Panz. 20. VI—7. VII.

904—05, около 30 экз.

} Указаны только
въ каталогѣ
Оберта.

Gyrinidae.

Orectochilus villosus F. 29. VI. 904; 3 экз. подъ плавающими щепками.

Lampyridae.

Phosphaenus hemipterus Goeze. ♂ 8. VI. 904.

Telephoridae.

Podabrus alpina Payk. 6. VI. 905.

Absidia pilosa Payk. 20. VI. 904, нѣсколько экз.

Rhagonycha pallida F. 8. VI. 904.

„ *elongata* Fall. 4—16. VI 904, около 20 экз. на

МОЛОДЫХЪ СОСНАХЪ.

Malthinus flaveolus Payk. 8. VI—14. VII. 904, 6 экз.

Mordellidae.

Mordella maculosa Naev. 27. VI. 904.

Chrysomelidae.

Cryptocephalus pini L. 12. VI. 904.

„ *coryli* L. 29. V—4. VI. 905, 12 экз. ♂♂ и ♀♀.

„ *distinguendus* Schmid. 12 и 16. VI. 904, по 2 экз.

„ *6-punctatus* L. 29. V. 904.

„ *sanguinolentus* Scop. 29. V и 18. VI. 904, 5 экз.

„ *parvulus* Müll. 24. VI. 904.

„ *botnicus* L. 16 и 17. VI. 904, 3 экз.

„ *bilineatus* L. 20. VI. 905, около 20 экз.

„ *pusillus* F. 2. VII. 905.

„ *pusillus* var. *marschami* Weise. 2. VII. 905, показанъ для Лужск. у. В. В. Мазаракиемъ.

Lina lapponica L. 18. VI. 904, нѣсколько экз.

Zeugophora flavicollis Marsh. 17. VI. 904, 2 экз.

Lyperus longicornis F. 5. VII. 904, очень много на *Betula alba*.

Cerambycidae.

Xylotrechus pantherinus Saven. 16. VI. 905, на *Angelica sylvestris*. Въ замѣткахъ о жесткокрылыхъ Евр. Россіи (Русск. Энтомолог. Обзор., 1904, № 6, стр. 307 и 308) А. П. Семеновъ даетъ обстоятельное перечисленіе мѣстонахожденій этого рѣдчайшаго вида и заключаетъ, что онъ „принадлежитъ къ серіи насѣкомыхъ, находящихся въ стадіи вымиранія въ зап. Европѣ, распространенныхъ крайне спорадично въ Евр. Россіи и процвѣтающихъ лишь въ Сибири, именно въ восточной ея половинѣ“.

Pachyta lamed L. ♂ 16. VI. 905, на *Rosa canina*

Strangalia arcuata Pz. 13. VI. 905, на *Angelica sylvestris*.

Pogonocherus hispidulus Pill. 28. V. 904 и 16. VI. 905, на сосновыхъ дровахъ.

Phytoecia nigricornis F. ♀ 16. VI. 904, при кошени сачкомъ.

Coccinellidae.

Coccinella trifasciata L. 29. VI. 904 и 19. VII. 905.

Этимъ спискомъ заканчиваются виды *Coleoptera*, пойманные мною въ предѣлахъ Ямбургскаго уѣзда. Въ дополненіе считаю нелишнимъ упомянуть еще объ одномъ видѣ, являющемся новымъ для Спб. губ., но пойманнымъ мною 20. IV. 902. въ количествѣ 9 экз. уже въ ближайшихъ окрестностяхъ Спб. (деревня Автова, дамба). Видъ этотъ: *Campra contaminata* Sahlb.; мнѣ удавалось ловить его и прежде въ той же мѣстности по глинистому берегу канавъ вмѣстѣ съ *Philochtus biguttatus* Fabr. Sahlberg и Seidlitz показываютъ его только для Финляндіи.

Переходя къ другимъ отрядамъ, нахожу заслуживающими вниманія слѣдующіе виды:

Lyda erythrocephala Latr. 19. VI. 905.

Xiphodria camelus Latr. 14. VI. 904, 2 экз.

Abia sericea L. ♂ 16. VI. 904.

„ *candens* Konw. ♂ 19. VI. 905.

Cicadella sp. 16. VI. 904, нѣсколько экз.

Apterina pedestris Meig. (?). Безкрылая муха изъ сем. *Borboridae*, найденная мною въ 8 экз. 8. III. 905, въ окр. Спб., дер. Автова, дамба.

Въ заключеніе считаю долгомъ принести благодарность Ю. И. Бекману, Д. К. Глазунову, В. В. Мазаракію и Г. Г. Якобсону, содѣйствовавшимъ мнѣ при опредѣленіи перечисленныхъ насѣкомыхъ.

Отдѣльный оттискъ изъ „Трудовъ Русскаго Энтомологическаго Общества“, т. XXXVIII, стр. XXXVII—XLIII.

Напечатано по распоряженію Совѣта Русскаго Энтомологическаго Общества.
Апрѣль 1906 г. Редакторъ *Н. Я. Кузнецовъ*.