

Цена 25 коп.

выходит один раз
в квартал.

Год издания
третий.

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ
при Музее Тобольского Севера.

Адрес редакции:
г. Тобольск, Об-
щество Изучен.
Края при Музее
Тоб. Севера.

№ 3 1930

== Июль-Сентябрь ==

1930 № 3

СОДЕРЖАНИЕ: Из текущей работы Об-ва — Краеведение на новом этапе — Сергеев. Организационные формы и задачи краеведения. — Постановление НКП от 5 VIII-30 г. — Всех О.Н.О. РСФСР. — О новых оргформам и планустановках краевед. работы в Тобольском округе. — Постановление В.Ц.С.П.С. от 23/III-30 г. — Типовой устав Краеведческого кружка — Д. Чубинши. Огородничество в Обдорске — А. Эристов. Шаманство. — М. Коношилов. К вопросу о наделении сельских декабристов земель. — Самко, К. П. Заметки о скакунах и журавлях Тобольского края. 11-30.

Из текущей работы Общества.

Доклады экспедиций, работавших в Тобольском округе летом 1930 года.

Третьего июля на совместном заседании Об-ва с Окрпланом был заслушан доклад начальника изыскательной группы У.К.С. Леспрома В.С.Н.Х тов. Спецуро о результатах работы по подысканию места под постройку лесопильного завода и целлюлозной фабрики близ села Белогорского, Самаровского района.

Седьмого июля на заседании Президиума Окрисполкома, с участием представителей Об-ва, заслушан доклад начальника Ныдоямской экспедиции Комитета Северного Морского Пути — тов. Курялович об организации экспедиции летом 1930/31 года.

Седьмого октября на совместном заседании Об-ва с Окрпланом заслушан доклад старшего ассистента Гос. Лугового Института, тов. Барышникова по исследованию поймы р. Оби, на отрезке Сургут — Березов, для определения основных типов лугов, приблизительной их площади и хозяйственной ценности, в целях развития в данном районе крупного животноводческого хозяйства в форме совхозов и колхозов.

Восьмого октября на совместном заседании Окрплана с Обществом заслушан доклад начальника охото-экономической экспедиции Уралохотсоюза т. Виноцкого об обследовании охотхозяйства в пяти южных районах.

Десятого октября было заслушано сообщение начальников геологических экспедиций Г.Г.Р.У. т.т. Боч и Громова о работах экспедиций в районах рек Югапа (левый приток Оби в Сургутском районе) и Ковды (левый приток Иртыша в Кондинском районе. Задача экспедиций — изучение третичных и послетретичных отложений

Далее в деле № 329 имеются бумаги об отводе земли декабристам Аннеякову в Туринске в 1840 году, Повайло-Швейковскому и Башмакову в Курганском округе в 1842 году и Кюхельбекеру близ слоб. Смоленской в 3-х верстах от Кургана в 1845 году. Повайло-Швейковский и Башмаков были поселены на участках, ранее отведенных декабристам Нарышкину, Лихареву и после них Свистунову и Фохту. Как известно, декабристы Нарышкин и Лихарев были в 1837 г. отправлены из ссылки на Кавказ в действующую армию, о чем в деле имеются указания также, как и об отправке из Курганского округа на Кавказ в 1837 году декабристов Розена, Назимова и Лорера.

К. П. Самко.

Заметки о скакунах и жужелицах (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) Тобольской фауны. II⁶)

11.

Чрезвычайно интересным зоогеографическим фактом является нахождение в Тобольском округе *Cychrus* (in sp.) *rostratus* L., взятого А. Ф. Теплоуховым в долине р. Конды: путь от юрт Камских на р. Каме, притоке р. Вагиля, к Оусуна р. Пелыме, 26. VII. 1927. ♀ coll. m. Вид этот до сего времени не был известен из пределов Азии вообще, т. к. восточная граница его распространения проходила по Уралу (Г. Г. Якобсон. 1905)¹⁾. Ввиду того, что в Норвегии *C. rostratus* поднимается к северу до 70°25', а в Финляндии до 64°20'²⁾ поимка его у нас под 60° с. ш. не может рассматриваться как нечто невозможное.

Сличение нашего экземпляра с ♂ этого вида, имеющимся в моей коллекции из Калужской губ., не позволило найти между ними существенной разницы.

12.

К опубликованным уже мною (1927)³⁾ местонахождениям в Тобольском округе *Carabus* (*Pachycranion*) *schoënherrii* Fisch.-W.

⁶⁾ См. Бюллетень Общества Изучения Края при Музее Тобольского Севера, 1930, № 2, стр. 23-25. Справедливость требует отметить, что приводимые мною в указанной выше серии заметок *Carabus* (*Carabulus*) *ermaki* Lutshn. (под № 3) и *Carabus* (*Aulonocarabus*) *canaliculatus* M. Adams. (под № 6) в качестве новых для Тобольской фауны видов в действительности уже были отмечены И. Н. Шуховым (как раз те экземпляры, о которых он мне писал) в статье „Птицы Обдорского Края“ (Ежегодник Зоол. Музея Академии Наук, т. XX, 1915, стр. 167—237) на стр. 177, правда без всяких дат и подробностей.

¹⁾ Якобсон, Г. Г. Жуки России и Западной Европы. Изд. Аф. Девриена. СПб. 1905, стр. 206.

²⁾ Якобсон, Г. Г. loc. cit.

³⁾ Самко, К. П. К познанию энтомофауны Тобольского округа. I. Наиболее интересные насекомые, добытые под Тобольском во время экскурсий 1924-1927 г.г. I. Бюлл. Общ. Изуч. Края Тоб. Севера, 1927, № 1, стр. 13.

следует добавить (по материалам Музея Тобольского Севера) еще следующие: д. Алемасова, дуброва, 17.VIII. 1903 (coll. anon! ♀, д. Дурнынина, 1904 (coll. anon!) ♀, Тобольск, Архиерейская роща, 16. VI. 1928 (М. Тирунин!) ♂.

13.

Мои пятилетние наблюдения над экологией *Carabus* (s. str.) *menetriesi* Humm. в окр. Тобольска заставляют меня присоединиться к мнению Ю. М. Колосова (1929) ⁴⁾ об этом виде. Действительно, его нельзя считать вымирающим. Сравнительная редкость *C. menetriesi* в коллекциях зависит исключительно от того, что собирающие незнакомы с его экологией. Кочки моховых болот, растительный детрит по берегам рек—вот его обычная стадия. В этих местах всегда можно найти его и иногда в значительном количестве особей, что как раз наглядно иллюстрируется массовыми сборами Г. В. Олсуфьева (1917) ⁵⁾.

К указанным для окрестностей Тобольска данным необходимо добавить еще следующие: верховья р. Надежки, 31. V. 1928 (ipse!) ♀ coll. m., устье р. Надежки, 9. VI. 1928. (ipse!) ♀ coll. m.

14.

Не смотря на то, что у Г. Г. Якобсона (1905) ⁶⁾ для *Carabus* (*Eutelocarabus*) *conciliator* Fisch. W. отмечено «вся Сибирь до Камчатки и Южноуссурийского края», считаю не лишним привести даты коллекционного материала по этому виду из пределов нашего края, т. к. в литературе нет точных указаний на Тобольский округ. Я располагаю сейчас тремя экземплярами этого вида, происходящими из следующих пунктов: Тобольск, 23. V. 1923 (*В. Мальков!*) ♂ coll. Telyshev; река Конда, с. Летняя Пуща, 9. VI. 1928. (*З. Орлова*) 2♀♀ coll. m.

15.

Имеющийся в моем распоряжении материал по *Carabus* (*Pan-carabus*) *aeruginosus* Fisch.-W. позволяет дополнить существующие по Тобольскому округу указания (Самко. 1927) ⁷⁾ следующими датами:

forma typica—д. Соколовка, 1903 (coll. anon!) 2♀♀ (М) ⁸⁾, Березов, 8 и 27. VI. 1908 (*М. Лагин!*) 2♂♂ (М), юрты Кинтусовы на р. Салыме, 19. VII. 1911 (coll. anon!) ♂ (М), Обдорск, 19. VI. 1912 (*И. Шушов!*) 1 экз. (А), долина р. Ковды, путь от юрт Камских на р. Каме, притоке р. Вагиля, к Оусу на р. Пелыме, 26. VII. 1927 (*А. Теплоузов!*) ♂, Обдорск, берег р. Шайтанки, во мху,

⁴⁾ Колосов, Ю. М. Материалы к познанию энтомофауны Урала. XIV. Новые и интересные насекомые Среднего Урала. Записки Лесопромшл. ф-га УПИ, выв. 1 1929, стр. 99-100.

⁵⁾ Русск. Энт. Обзор. т. XVII, 1917.

⁶⁾ Якобсон, Г. Г. *ibidem*, стр. 239.

⁷⁾ Самко, К. П. *ibidem*, стр. 14.

⁸⁾ В обозначении коллекций приняты следующие сокращения: М—Музей Тобольского Севера, А—Зоол. Музея Академии Наук СССР, остальные экз. находятся в моей коллекции.

26. VI. 1928 (ipse!) ♂, с. Б. Атлым, под камнем на берегу р. Оби,
20. VI. 1928 (ipse!) ♀, Тобольск, двор Музея, 11 и 13 V. 1929
(*М. Тарунин!*) ♂ ♀ (М), сад Ермака, под камнем, 15. V и 16. VI.
1929 (ipse!) 2♀ ♀, 14. V. 1930 (ipse) ♀, завка Шапошникова, 1.
VI. 1929 (*М. Тарунин!*) ♀ (М), дуга р. Курдюмки, в яме, 23. V.
1930 (ipse!) ♀.

— var. *aereus* Fisch. W. — с Обдорса, VII. 1905 (*А. Ф. Дарионов!*)
♀ (М), д. Соколовка, 24. VII. 1908 (*В. Пигнатти!*) ♀ (М), с. Са-
марово, под мохом у ствола ели, 19 VI. 1928 (ipse!) ♂.

16.

Новинкой для фауны нашего края является находение под
Тобольском *Carabus* (*Phricoscarabus*) *glabratus* Payk. Мне известны
сейчас следующие даты поимки этого вида: д. Серякова, 1. VII.
1907 (*В. Пигнатти!*) ♂ coll. Mus. Tob., устье р. Надежки, V.
1922 (*Г. Кобяков!*) ♀ coll. m., юрты Полбугорные, 14. VI. 1928
(*Б. Кропоткин!*) ♀ coll. m. Кроме того у меня имеется ♀, привезенная
А. Ф. Теплоуховым из долины р. Конды: р. Кума, 29. VIII. 1926.

Поимка этого вида в Тобольском округе является интересным
фактом и для фауны Сибири, т. к. в последней он был известен по
Г. Г. Якобсону (1905)⁹⁾ лишь из Томской губ.

Тщательное сличение экземпляров тобольского происхождения
с особями из Житомира, Калуги, Самары, Ленинграда и др. мест
в моей коллекции заставляет признать за нашим краем наличие
типичной формы.

17.

Очень интересным фактом является поимка под Тобольском
Calosoma (*Callistiga*) *maderae dsungaricum* Gebl., взятого мною в
яме из под выемки земли для насыпи дороги у д. Запятиной, 26.
VI. 1926. ♀. Этот вид по St. Breuning¹⁰⁾ известен в
Западной Сибири из Акмолинска, Семипалатинска, берегов р. Ир-
тыша (старое указание Мочульского, относящееся к верховьям
Иртыша) и Черного Зайсана. Кроме того в моей коллекции имеется
♂ этого вида, пойманный в Ирбитском округе: с. Слободо-Туриц-
ское, 23. VII. 1927 (*А. Попов!*).

18.

В моей коллекции имеется ♂ *Leistus* (s. str.) *rufescens* Fabr.,
взятый мною под Тобольском у д. Запятиной в березовом лесу под
опавшей листвой, 29. VIII. 1929. Вид этот известен до сих пор в
Сибири лишь из Жигалинска на р. Виссе (J. Sahlberg. 1880)¹¹⁾
и Томской губ. (Г. Г. Якобсон. 1905)¹²⁾.

⁹⁾ Якобсон, Г. Г., *ibidem.*, p. 254.

¹⁰⁾ Breuning, Stephan, Dr. Monographie der *Calosoma* Web. I Teil. Sonderabdruck aus Koleopterologische Rundschau, Bd. XIII, 1927, p. 214.

¹¹⁾ Sahlberg, John. Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insektafauna. Coleoptera insamlade under expeditionerna till Obi och Jenessej 1876 och 1877. I. Kongl. Sven. Vet.—Akad. Handl. Bd. 17, № 4, 1880, p. 8.

¹²⁾ Якобсон, Г. Г. *ibidem.*, p. 259.

19.

Среди колеоптерологического материала, собранного мною под Обдорском во время поездки в 1928 г. имеется 3 ♂♂ и 4 ♀♀ *Miscodera arctica* Payk., взятых по берегу р. Шайтавки 25 и 26. VI и 23 и 29. VII. Вид этот в форме *erythrorus* Motsch. был известен в Азии лишь из Забайкалья, Якутской и Амурской обл. (Г. Г. Якобсон. 1905). ¹³⁾

20.

К указанным мною (1927) ¹⁴⁾ представителям р. *Chlaenius* Bon. (*tristis* Schall. и *sulcicollis* Payk.) тобольской фауны следует прибавить еще *Chlaenius* (*Pelasmus*) *costulatus* Motsch. Эта красивая жужелица имеется в коллекциях Музея Тобольского Севера из окр. Тобольска: берег р. Старый Тобол, 2. VI. 1927 (*М. Тарунин!*) ♀.

21.

Отмеченный Г. Г. Якобсоном (1905) ¹⁵⁾ в Сибири для Томской, Енисейской, Иркутской, Амурской обл., Забайкалья и Камчатки *Agonum* (s. str.) *quadripunctatum* Deg. найден мною под Тобольском: д. Сузгун, берег р. Иртыша, на приплесе под щеной, 26. VI. 1926. ♂.

22.

Среди тобольских *Amara* Bon. моей коллекции ¹⁶⁾, любезно просмотренных В. В. Лучником, оказались следующие виды, еще не указанные для нашей фауны:

Amara (in sp.) *similata* Gyll.—Панин Бугор, 15. VI. 1925. ♀, д. Защитина, 27. VI. 1926. ♀, сад Ермака, 5. VI. 1926. ♀

Этот вид был указан J. Sahlberg'ом (1880) ¹⁷⁾ для Тюмени, каковая дата приведена Г. Г. Якобсоном (1905) ¹⁸⁾ для б. Тоб. губ.

A. (in sp.) *ovata* Fabr.—Тобольск, на улице, 27. V. 1926. ♂, площадь, 29. V. 1926. ♂, д. Защитина, в яме, 27. VI. 1926. ♀

A. (in sp.) *aenea* Deg.—Кладбище, 22. V. 1926. ♂, д. Завальная, 8. V. 1927. ♀.

A. (in sp.) *eurynota* Panz.—Сад Ермака, 8. VI. 1925. ♀ д. Защитина, в яме, 26. VI. 1926. ♂. Толоконные горки, 2. VI. 1927. ♀.

A. (*Bradytus*) *majuscula* Charp.—Панин Бугор, 8 и 13. VIII. 1925. ♂ ♀.

A. (*Celia*) *ingenua* Duft.—Тобольск, на улице. 25. IV. 1927. ♀

A. (*C.*) *municipalis* Duft.—Казачий взвоз, на *Artemisia*, 19. IX. 1928. ♂

¹³⁾ Якобсон, Г. Г. *ibidem*, p. 277.

¹⁴⁾ Бюллетень Общ. Изуч. Края Муз. Тобольского Севера, 1927. № 1, стр. 6

¹⁵⁾ Якобсон, Г. Г. *ibidem*, p. 330.

¹⁶⁾ Все отмечаемые экземпляры собраны мною под Тобольском.

¹⁷⁾ Sahlberg, J. *ibidem*, p. 36.

¹⁸⁾ Якобсон, Г. Г. *ibidem*, p. 356.

A. (Cyrtanotus) convexiuscula Marsh.—Панин Бугор, 5. IX. 1925. ♂, правый берег р. Иртыша у городских Боев, 17. и 18. VII. 1927. ♂ ♀, сад Ермака, 30. V. 1926. ♀, Кавачий взвоз, на *Artemisia*, 19. IX. 1928. †.

A. (Percosia) equestris Duft.—д. Защитина, 30. IX. 1926. ♀. 23.

В 1880 г. John Sahlberg¹⁹⁾ указал для Тюмени и б. Енисейской губ. (Красноярск, Верстово, Полой, Енисейск) *Amara (Cyrtanotus) aulica* Panz. Г. Г. Якобсон (1905) подверг это указание сомнению и считал, что данные J. Sahlberg'a должны относиться к *A. fodinae* Mannh.²⁰⁾ Мои материалы содержат исключительно *A. aulica* Panz.²¹⁾, которая оказывается под Тобольском весьма нередкой. Я имею ее из следующих мест: Тобольск, улица, 9. VI. 1925. ♀²²⁾ сад Ермака, 27. V и 25. VI. 1925. 3 ♀ ♀, 5, 16, 18, 25, 29 и 30. V. 1926. 6 ♂ ♂ 9 ♀ ♀, 7. VI. 1927. ♂, Панин Бугор, 5. IX. 1925. ♀, 15. VII. 1927. ♀, Трехручейный песок на р. Иртыше, 15. VIII. 1925. ♀, д. Защитина, в яме, 26 и 27. VI. 1926. ♂ ♀, кладбище, 3. V, 1927 (*З. Орлова*) ♀.

Просматривая перечень географических пунктов нахождения *A. aulica*, приведенный у Г. Г. Якобсона (1905)²³⁾ легко убедиться, что восточной границей этого вида считается Уральский хребет, причем через южные уральские «ворота» он заходит уже и в Азию (Семиречье, Самарканд, Джунгария). Для Сибири *A. aulica* была указана в последнее время проф. С. Д. Лавровым (1927)²⁴⁾ (Окр. Омска), но под вопросом (?). В 1930 г. В. В. Внуковский²⁵⁾ подтвердил указание С. Д. Лаврова на нахождение этого вида под Омском.

Таким образом нахождение *A. aulica* Panz под Омском и Тобольском подтверждает правильность данных J. Sahlberg'a для Сибири. Было бы интересно проследить насколько далеко на восток и на север распространен этот вид.

24.

Фауне нашего округа свойственен и *Orphonus (Pardileus) calceatus* Duft., собранный мною под Тобольском: д. Защитина, в ямах из под выемки земля, 27. VI, 24. VII. и 1. X. 1926. ♂ 2 ♀ ♀, Панин Бугор, 1. VII. 1927. ♂.

25.

Для тобольской фауны представители р. *Anisodactylus* Dej. еще не отмечались. В настоящее время, разобравшись с частью материа-

¹⁹⁾ Sahlberg J. *ibidem*, p. 32.

²⁰⁾ Якобсон, Г. Г. *ibidem*, p. 362.

²¹⁾ Этот вид любезно определен В. Н. Лучицким.

²²⁾ Экземпляры, лишённые указания на сборщика, собраны мною.

²³⁾ Якобсон, Г. Г. *ibidem*, p. 361.

²⁴⁾ Лавров, С. Д., проф. Материалы к изучению энтомофауны окрестностей Омска. Труды Сибирского Института С.-Х. и Лесоводства. т. VIII, вып. 3, стр. 78.

²⁵⁾ Внуковский, В. В. Некоторые новые данные по энтомофауне Омского округа. Известия Западно-Сибирского Географического Общества, т. VII, 1930, стр. 185.

тов своей коллекции по группе *Harpalina*, я могу указать на следующие виды этого рода:

Anisodactylus (in sp.) *binotatus* Fabr.—окр. Тобольска, устье р. Надежки, под намывом, 20. VI. 1925 (ipse!) ♂, Панин Бугор, 24. VI. 1925 (ipse!) ♂, сад Ермака, 15. V, 1 и 7. VI. 1926 (ipse!) ♂ 2 ♀ ♀, Толоконные горки, в намыве, 23. VI. 1927 (ipse!) ♂, 25. VI. 1927 (ipse!) ♀, сад в городе, 12, 22. V. 1927 (ipse!) 3 ♂♂ 5 ♀ ♀

— var. *spurcaticornis* Dej.—сад Ермака, 30. V. 1926 (ipse!) ♂, 13. V. 1927 (ipse!) ♀

A. (in sp.) *signatus* Panz — Устье р. Надежки, под намывом, 19. VI. 1926 (ipse!) ♀

26.

Отмеченная в Западной Сибири для Семипалатинской и Акмолинской обл. (Г. Г. Яковсон. 1905)²⁶⁾ и с Ачаира, Омского округа (В. В. Внукровский 1930)²⁷⁾ *Lebia* (s. str.) *crux-minor* L. нередко встречается и под Тобольском. Я имею сейчас в своей коллекции следующие экземпляры этого вида, собранные мною: устье р. Надежки, в береговом намыве, 19. VI. 1926. ♀, Мостовой дог, 18. V. 1929. ♀, луга р. Курдюмки, 13. V. 1930. ♀.

27.

Dromius (*Dromiolus*) *sigma* Rossi, найденный J. Sahlberg'om (1880)²⁸⁾ в д. Спириной Самаровского района, встречен мною и под Тобольском: Толоконные горки, на затопленной разливом иве, 14, 20 и 28. V. 1927. 15 ♂♂ ♀ ♀ coll. m.

В капитальной сводке Г. Г. Яковсона (1905)²⁹⁾ при перечислении местонахождений *Dr. sigma* случайно пропущены даты указанной выше работы J. Sahlberg'a. Привожу их здесь в качестве дополнения к данным Г. Г. Яковсона: «Тобол. губ.: Артамонова на р. Тоболе, Спирина; Енисейская губ.: Енисейск, Анцаферова».

28.

Не отмеченный еще для нашей фауны *Dromius* (in sp.) *quadricollis* A. Mor. найден мною в Тобольске: сад Ермака, под корой ели, 6. X. 1925. ♀, 4. VI. 1929. ♀.

29.

Указанный в фауне Западной Сибири только для Томской губ. (Яковсон. 1905)³⁰⁾ *Cymindis* (s. str.) *macularis* Dej. взят мною в окр. Тобольска: д. Бекеревка, на затопленной иве, 14. V. 1926. ♀ coll. m.

²⁶⁾ Яковсон, Г. Г. *ibidem*, p. 397.

²⁷⁾ Внукровский, В. В. *ibidem*, p. 135.

²⁸⁾ Sahlberg, J. *ibidem*, p. 22.

²⁹⁾ Яковсон, Г. Г. *ibidem*, p. 400.

³⁰⁾ Яковсон, Г. Г. *ibidem*, p. 405.

Совершенно неожиданной находкой для Тобольского Севера является пойма под Обдорском *Polystichus connexus* Geoffr, взятого мною на берегу р. Шайтанки 24 и 26. VI. 1928, 2 ♀ ♀ coll. m. Этот вид, свойственный преимущественно средней и южной полосе Европейской части СССР, указан в Сибири лишь для Томской губ. и Акмолинской обл. (Г. Г. Яковлев, 1905)²¹⁾. Поймка его под Обдорском (66° 31' сев. шир.—полярный круг!!!) имеет выдающийся зоогеографический интерес.

²¹⁾ Яковлев, Г. Г. *ibidem*, p. 408.

Ответственный Редактор РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Тобрайгип. Уралполиграф. Зак. 304—30 г. Открыт № 648