

Итоги изучения жуужелиц подрода *Peryphus* Dejean рода *Bembidion* Latr. (Coleoptera, Carabidae) прибрежных и островных экосистем Западного Каспия

С.Т. Магомедова

[Magomedova S.T. Results of the study of ground beetles of the subgenus *Peryphus* Dejean of the genus *Bembidion* Latr. (Coleoptera, Carabidae) of coastal and island ecosystems of the Western Caspian]

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия.

E-mail: ecodag@rambler.ru

В прибрежных и островных экосистемах Западного Каспия обнаружено 66 видов жуужелиц рода *Bembidion*, относящихся к 27 подкладам. Ниже приводится список обнаруженных видов подклада *Peryphus* Dejean, 1821 с указанием их распространения.

B. persicum Menetries, 1832. Главный Кавказ, Малый Кавказ, Армянское нагорье, Талыш, Копетдаг, Тянь-Шань, горы Средней Азии.

B. atlanticum Wollaston, 1854. Горный Крым, Предкавказье, Главный Кавказ, Малый Кавказ, равнинная территория Казахстана, Туран, Копетдаг, Тянь-Шань, горы Средней Азии.

B. andreae Fabricius, 1787. Украина, включая Карпаты и Закарпатье, север и средняя полоса восточноевропейской равнины, Предкавказье, Главный Кавказ, Малый Кавказ, Армянское нагорье, Талыш, средняя полоса Западной Сибири, юго-западная Сибирь, Алтае-Саянская горная система, Средняя Сибирь.

B. subcostatum Motschulsky, 1850. Украина, включая Карпаты и Закарпатье, юг восточноевропейской равнины, Главный Кавказ, Малый Кавказ, Армянское нагорье, Талыш.

B. femoratum Sturm, 1825. Украина, включая Карпаты и Закарпатье, север, средняя полоса и юг восточноевропейской равнины, Горный Крым, Предкавказье, Главный Кавказ, Малый Кавказ, Армянское нагорье, Талыш, Урал, Северо-Западная Сибирь, средняя полоса Западной Сибири, равнинная территория Казахстана, Алтае-Саянская горная система, Средняя Сибирь.

B. distinguendum lindrothi De Monte, 1957. Главный Кавказ.

B. parallelipenne Chaudoir, 1850. Главный Кавказ, Малый Кавказ, Армянское нагорье, Талыш.

B. testaceum Duftschmid, 1812. Украина, включая Карпаты и Закарпатье, Горный Крым.