

Материалы по распространению некоторых видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в Дагестане

Г.М. Нахибашева¹, И.А. Белоусов², И.И. Кабак²,
Г.М. Абдурахманов¹

[Nakhibasheva G.M.¹, Belousov I.A.², Kabak I.I.², Abdurakhmanov G.M.
New data on the distribution of some ground beetle species in Dagestan
(Coleoptera, Carabidae)]

¹Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия.

E-mails: gugilica@rambler.ru, ecodag@rambler.ru

²Всероссийский НИИ защиты растений Россельхозакадемии, Санкт-Петербург, Россия. E-mails: ibelous@yandex.ru, ilkabak@yandex.ru

Виды, указанные в этом сообщении, указываются для Дагестана впервые. Данные по их распространению даны по современным каталогам и ревизиям (Kryzhanovskij et al., 1995; Fedorenko, 1996; Löbl, Smetana, 2003), а также по некоторым фаунистическим работам (Ишков, Кабак, 1994; Калюжная и др., 2000).

Bembidion (Asioperypus) kazakhstanicum Kryzhanovskij, 1979. Брянск, Кирова, Крайновка, о. Чечень. Описан из Восточного Казахстана, для России и Кавказа отмечается впервые.

Dyschirius auriculatus Wollaston, 1867. Брянск, Крайновка. Широко распространен в Области Древнего Средиземья. На смежных с Дагестаном территориях известен из Калмыкии.

Dyschirius humeratus Chaudoir, 1850. Брянск, о. Чечень. Широко распространен по западному и северному берегам Черного моря, Предкавказью, Средней Азии, известен из Восточного Закавказья и Калмыкии.

Oodes gracilis A. Villa et G.V. Villa, 1833. Весь равнинный Дагестан. Населяет всю Европу, кроме севера, Малую и Среднюю Азию, юг Западной Сибири и Казахстан. Ближайшие к Дагестану регионы, где отмечены находки этого вида, – Предкавказье, Калмыкия и Астраханская область.

Lachnocrepis prolixa Bates, 1873. Брянск, Крайновка, о. Тюлений. Редкий вид, ареал которого состоит из двух частей: первая простирается по степям и полупустыням от юго-востока Европы до Прибалхашья, вторая охватывает Дальний Восток России и Японские о-ва. Ближайшая к Дагестану находка известна в Астраханской области (Досанг, дельта Волги).

Cymindis (Neomenas) antonowi Semenov, 1891. Кирова, Крайновка, Семендер. Впервые приводится для России, до сих пор был известен только из Средней Азии, где распространен от юго-запада Туркмении до Южного Прибалхашья.

Trichis maculata Klug, 1832. О. Чечень. Вид имеет обширный ареал, охватывающий Пиренейский и Балканский полуострова, весь север Африки и юго-запад Азии на восток до Пакистана. Ближайшие к Дагестану известные находки вида известны в Иране и Туркмении. Для России указывается впервые.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ ГК НК-628П(5).