

Novæ Cerambycidarum Formæ e Fauna Eurasicæ.
Per N. N. PLAVILSTSHIKOV (Mosquæ).

Pogonochærus kuksha, sp. n.

Brunneo-piceus, variegatim cinereo-fusco-ochraceo tomentosus, tote corpore parce longèque setosus.

Capite dense brunneo-subpiceo tomentoso, dense crebreque punctato. Antennis longitudinem corporis vix superantibus, piceis, ab articulo tertio basi fuscis et albido annulatis (articulo quarto haud ultra medium fusco et albidi annulato); parce ciliatis.

Prothorace latitudine (ad basin) multo longiore, sat dense crebreque punctato, disco in medio depresso et sulcato, tuberculis duos longitudinalis, dense punctatis, non nitidis, instructo.

Scutello nigro velutino.

Elytris latitudine plus quam duplo ($2\frac{1}{2}$) longioribus, pone basin utrinque in tuberculum elevatis, longitudinaliter tricarinatis, apice truncatis, angulo externo dentatim producto, angulo interno subrotundato, punctis inter costas profunde impressis, seriatis, quarta elytrorum parte apicali haud punctata; macula sat magna, transversa, alba in dimidio basali

(inter costas) ornatis; fusco-æneo-ochraceo variegatim tomentosis, maculis nonnullis parvis brunneis signaturis (plus minusve seriatis); costa dorsali inferiore penicillis 4 (1 in parte basali, 3 pone medium) nigro velutinis inserta ornatis.

Tibiis femoribusque basi brunneo-ferrugineis.

Long. corp. 7 mm., lat. ad hum. 2.6 mm.

Habitat. Transcaucasia, Borshom, 12. iv. 1912 (1 spec. ♂ in coll. mea).

Primo aspectu *P. caucasicus*, Ganglb., similis, sed thoracis linea media latior sulcata, pone medium in tuberculum non elevata, tuberculis discalis dense punctatis, non nitidis, elytrorum angulo externo in spinam longam non producto, sed dentatim producto, angulo interno rotundato optime distinctus.

Ab *P. eugeniæ*, Ganglb., differt: colorem tomenti, elytris subtilius punctatis, apicem in spinam longam non productis, thoracis linea media in tuberculum nitidum non elevata, etc.

Strangalia (s. str.) *quadrifasciata caucasica*, subsp. n.

Ab *Strangalia quadrifasciata quadrifasciata* (L.), colorem elytrorum dilute lividis aut dilute-livide-ferrugineis discrepat!

Fasciæ elytrorum ut ab *Str. quadrifasciata quadrifasciata* (L.), tamen sæpe plus minusve obsoletæ aut divisæ:

1. Forma typica.—Fasciæ quatuor completæ.
2. Ab. *lederi*, Ganglb.—Fascia prima in maculis divisa, secunda disjuncta (colorem elytrorum *Str. maculata*, Poda, similis).
3. Ab. *suramensis*, Plav.—Fascia prima toto deficiente.
4. Ab. *recurvata*, nov.—Fascia prima completa, secunda suturam non attingente.
5. Ab. *disjuncta*, nov.—Fascia prima completa, secunda in maculis quatuor divisa.
6. Ab. *biinterrupta*, nov.—Fascia prima in maculis 5-6, secunda in maculis 4 divisa.

Habitat. Caucasus totus, in Ciscaucasia in partem montalem plus minusve rare, in Transcaucasia sæpe. (Examinavi circa 100 specimina in coll. mea, coll. Musei Zoologici Universit. Mosquensis, coll. Musei Caucasici Tiflisiensi.)

Evodinus interrogationis, L., ab. *quadripunctatus*, nov.

Elytris flavis, maculis quatuor punctiformis nigris; macula discali secunda deficiente.

Sibiria orient.: vall. fl. Batobij, distr. Viluj, gub. Jakutensis, 24. vi. 1916 (*P. Dravert!*, coll. mea).

Evodinus interrogationis, L., ab. *recurvatus*, nov.

Ut forma typica, sed fascia dorsali postice recurvata, rectilinea, ad bordo laterali non reflexa.

Sibiria: flum. Murbaj, distr. Kirensk, gub. Irkutensis, 14. vi. 1916 (*P. Dravert!*, coll. mea).

Evodinus interrogationis, L., ab. *anticeconfluens*, nov.

Fascia discali prolongata, scutello connexa.

Rossia eur. centr.: distr. Bogoroditzk, 7. v. 1911, 23. v. 1913, et distr. Tshernensis, gub. Tulaënsis (*A. Sopocjko!*).—Sibiria: Minusinsk; fl. Kondoma, Altaj, vi. 1913 (*Sobolevskij!*), Transbaicalia: Beresovka, 7–10. vi. 1915 (*D. Ogloblin!*).—Ural: pag. Metlino prope Ekaterinenburg, 20–22. vi. 1919 (*Kolosov!*).—11 specim. in coll. mea.

Evodinus interrogationis, L., ab. *posticeconfluens*, nov.

Fascia dorsali postice prolongata, cum macula apicalis connexa.

Sibiria centr. (*Staudinger!*), vall. fl. Batobij, gub. Jakutensis, 24. vi. 1916 (*P. Dravert!*).—3 specim. in coll. mea.

Evodinus interrogationis, L., ab. *confluens*, nov.

Elytris flavis, ut forma typica signaturis, sed macula marginali secunda cum fascia dorsali connexa.

Sibiria: Kuznetzkij Alatau, fl. Kondoma, vi. 1913 (*Sobolevskij!*), gub. Enissej.—Mongolia: circ. urb. Urga, vi. 1916 (*Blazhevitsh!*).

Evodinus interrogationis, L., ab. *lateralis*, nov.

Elytris flavis, fascia dorsali, linea marginali (in tertia prima, lata), maculis humerali, circascutellari et apicali nigris.

Sibiria: Minusinsk, 1. vii. 1910 (1 spec. in coll. mea).

Evodinus variabilis variabilis (Gehl.), ab. *quinquemaculatus*, nov.

Elytris flavis, sutura, maculis quatuor marginalibus, macula apicali nigris.

Sibiria: vall. fl. Batobij, gub. Jakutensis, 24. v. 1916 (*P. Dravert!*).

Strangalia (s. str.) *thoracica*, Creutz., ab. *pliginskii*, nov.

Corpore toto rufo-ferrugineo.

Sibiria or.: Vladivostok, 10. vi. 1910 (*V. Pliginskij!*, coll. mea).

Strangalia (s. str.) *thoracica*, Creutz., ab. *basalis*, nov.

Ut forma typica, sed elytris basi ferrugineis, femoribus anticis externe rufo-ferrugineis.

Rossia centr. : pag. Vatutinki, distr. Podolsk, gub. Mosquensis, viii. 1913 (ipse!, coll. mea).

Conspectus aberrationibus *Strangaliæ thoracicæ*, Creutz.

1. Ab. *basalis*, Plav.—Elytris basi ferrugineis, femoribus anticis externe rufo-ferrugineis. (Rossia centr.)
2. Ab. *ussurica*, Pic.—Corpore nigro, prothorace disco elytrisque flavis. (Siberia or.)
3. Ab. *domina*, Reitt.—Corpore rubro-aurantiaco, antennis (pars basalis excepta) abdomineque nigris. (Europa occ.)
4. Ab. *heros*, Reitt.—Corpore rubro-aurantiaco, capite, antennis presque totis, tarsis abdomineque nigris. (Eur. occ.)
5. Ab. *altaica*, Gebl.—Corpore rubro, capite, antennis articulis 1^o, 2^o, et 5^o-11^o nigris. (Siberia.)
6. Ab. *pliginskii*, Plav.—Corpore unicolore rufo-ferrugineo. (Siberia or.)

Strangalia (s. str.) *septempunctata*, F., ab. *panini*, nov.

Ut forma typica, sed prothorace nigro, elytris cum maculis quinque brunnescentibus: una suturali, una apicali, una discali (in tertia postica).

Bessarabia : distr. Soroki (coll. Panin=coll. mea).

Strangalia (s. str.) *septempunctata*, F., ab. *nigrithorax*, nov.

Prothorace unicolore-nigro, cetera ut forma typica.

Bessarabia (Panin, in coll. mea).

Strangalina attenuata, L., ab. *shushenicæ*, nov.

Fascia prima obsoleta, in maculis tribus disjuncta, fascia secunda recurvata, marginem non attinget.

Rossia : Ukraina, prope Konotop, vii. 1911 (ipse!, coll. mea).

Xylotrechus grumi, Sem., ab. *bimaculatus*, nov.

Elytris macula una albo-tomentosa ornatis.

Turkestan bor. : Perovsk, v. (*Schell!*, coll. mea).

Cyrtoclytus capra, Germ., ab. *inbasalis*, nov.

Fascia prima (in parte basali) elytrorum tota deficiens.

Mantshzhuria : st. Chandaohedzy, prov. Girinensis, 7. vii. 1913 (A. Alexandrov !, coll. mea).

Plagionotus pulcher, Bless., ab. *recurvatus*, nov.

Fascia prima deficiente, secunda recurvata, presque rectilinea, transversa.

Sibiria or. : Ussuri (coll. mea).

Plagionotus arcuatus, L., ab. *disjunctus*, nov.

Fascia tertia in maculis tribus disjuncta : una suturali (communalis), una marginali.

Transcaucasia : Tiflis (coll. mea).

Chlorophorus varius, Müll., var. *incanus*, nov.

Corpore cinereo aut incano aut eburneo tomentoso, fasciis elytrorum sæpe indistinctis, cetera et magnitudo formæ typicæ.

Ciscaucasia : pag. Labinskaja, 25. viii. 1913 (B. Zolotarevskij !).—Transcaucasia : Teliani prope Telav, 29. v., 20. vii. 1907 (Fursov !), Aresh (Shelkovnikov !), Shach-Tshinar, distr. Karjagin, 3–10. vii. 1912 (K. Satunin !).—Bessarabia : distr. Soroki, 14, 15. vii. 1911 (Panin, leg. !).—Specimina numerosa in coll. Musei Caucasici Tiflisiensi et mea.—Verisimiliter morpha.

Dorcadion (Compsodorcadion) rufifrons, Motsch.1. Ab. *zhuravlevi*, nov.

Ut forma typica, sed capite toto nigro.

Rossia mer. or. : circ. urb. Uralsk, 26. iv. 1911 (S. Zhuravlev !, ♂ et ♀ in coll. mea).

2. Ab. *indorsalis*, nov.

Vittis dorsalis (discalis) toto deficientibus.

Circ. urb. Uralsk, 26. iv. 1913 (S. Zhuravlev !, coll. mea).

3. Ab. *lividesuturatum*, nov.

Vitta suturali læte-pallida.

Rossia mer. or. : circ. urb. Orenburg (P. Vorontzovskij !), circ. urb. Uralsk, 24. iv. 1913 (S. Zhuravlev !). Specimina numerosa in coll. mea.