

Les Staphylinides recoltés par Mr. Nicolas Iconnicov dans le Pérou (Coleoptera, Staphylinidae).

Par N. N. Plavilstschikov,

Directeur du Laboratoire Biologique du Technikum de l'Industrie et de l'Économie de Plechanov à Moscou.

La présente liste est basée sur les matériaux, que Mr. N. Iconnicov a collectionné dans le Pérou (11° 3' S. — 75° 17' W. Greenw.), au 1.000—1.800 mètres d'altitude. Cette collection, déterminée par Mr. M. Bernhauer, se trouve dans le Musée Zoologique de l'Université de Moscou.

1. *Piestus (Ziroporus) bicornis* Cast. (1834). — 1800', 23. XI, 06, un seul exemplaire.
2. *Piestus* (s. str.) *pennicornis* Fauv. (1865). — 1000' 27. VIII, 06; 1 exemplaire.
3. *Leptochirus* (s. str.) *Kolbei* Bernh. (1903). — 1000' 29. VIII, 14. IX, 06.; 3 exemplaires. Espèce décrite de Bolivie.
4. *Leptochirus (Mesochirus) maxillosus* F. var. *bolivianus* Heller (1898). — 1000', 2. IX, 06; 4 exemplaires.
5. *Leptochirus (Mesochirus) tenuis* Bernh. (1903). — 1000', 29. VIII., 14. IX, 06; 9 exemplaires. Espèce décrite de Bolivie.
6. *Leptochirus iconnicovi* Bernhauer (in litteris?) — 1000', 29. VIII, 06; 1 exemplaire avec l'étiquette „cotype“.
7. *Lispinus brevicollis* Fauv. (1865). — 1000', 30. VIII, 06. L'habitat de cette espèce est assez étendu, on la rencontre à Guatemala, à Nicaragua, en Mexique.
8. *Osorius peruvianus* Bernh. (1908). — 1000', 27. VIII., 1. IX., 21., 22. X, 06; 7 exemplaires.
9. *Paederus mutans* Sharp (1876). — 1000', 25. IX., 9. X, 06; 2 exemplaires. Décrite de Bolivie.
10. *Paederus tridens* Sharp (1876). — 1000', 19. IX., 9. X., 3. XI, 06; 5 exemplaires.
11. *Cryptobius longicornis* Sharp (1876). — 1000', 23. IX, 06; un seul exemplaire.
12. *Xantholinus peruvianus* n. sp. (Bernhauer in litteris). — 1000', 13., 18. IX, 06; 3 exemplaires.
13. *Agerodes kraatzi* Kirsch (1865). — 68 exemplaires: 1000' — 29. IX., 13., 14., 15., 21., 26. X, 06; 1800' — 12., 13., 16., 17., 19., 21., 29. X, 06.

14. *Agerodes coeruleus* Motsch. (1858). — 1800', 19., 29. IX. 06; deux exemplaires.
15. *Agerodes semiviolaceus* Bernh. (1911) var. — 1000', 11. X. 06.; un seul exemplaire. La forme typique décrite de la Bolivie.
16. *Agerodes punctipennis* Bernh. (1906). — 1000', 4. XI. 06; un seul exemplaire. Espèce décrite de Venezuela.
17. *Agerodes peruvianus* Bernhauer (in litteris?). — 1800', 12. XI., 1. XII. 06; deux exemplaires.
18. *Eulissus chalybaeus* Mannh. (1830). — 1000', 3., 18., 19., 22. X. 06; 1800', 8., 28. X. 06; 7 exemplaires.
19. *Philonthus figulus* Er. (1839). — 1800', 21. XI. 06; 1 exemplaire.
20. *Philonthus longicornis* Steph. (1832). — 1000', 14. X. 06.; 1800', 19., 21. XI. 06; 4 exemplaires.
21. *Philonthus lopterus* Er. (1839). — 1800', 19. XI. 06; un seul exemplaire. La description originale a été basée sur l'individues indiqués comme provenant de Colombie.
22. *Chroaptomus flagrans* Er. (1839). — 1000', 4. IX. 06; 1800', 21. XI. 06; 4 exempl.
23. *Paederomimus aeneiceps* Sharp (1876). — 1000', 5. IX. 06; un seul exemplaire. Espèce décrite de fleuve des Amazones.
24. *Belonuchus frater* Bernh. (1906). — 1800', 7. IX. 06; 1 exemplaire.
25. *Belonuchus peruvianus* Fauvel (in litteris). — 1800', 23. XI. 06; 1 exemplaire.
26. *Belonuchus longiceps* Bernh. (1906). — 1800', 7., 17., 29. XI. 06, 7 exemplaires.
27. *Belonuchus iconnicoffi* * n. sp. (Bernhauer in litteris). — 1800', 9., 20. XI. 06; 2 exemplaires.
28. *Staphylinus ochropygus* Nordm. (1837). — 1000', 21. X. 06; 1 exemplaire. Habite: Brésil, Guyanes.
29. *Staphylinus fervidus* Sharp (1884) var. — 1000', 22. X. 06; un seul exemplaire. La forme typique a été décrite de Mexique.
30. *Phanolinus episcopus* Bernh. (1906). — Un seul exemplaire avec une date commune: „11° 3' S. — 75° 17' W. Greenw.“, Espèce décrite de Bolivie.
31. *Philothalpus anceps* Er. (1839). — 1000', 13. X. 06; 1 exemplaire.
32. *Styngetus langei* Bernh. (1905). — 1800', 16. XI. 06; 1 exemplaire.
33. *Brachydirus antennatus* Sharp (1876). — 1800', 11. XI. 06; un seul exemplaire. Espèce décrite de fleuve des Amazones.
34. *Brachydirus testaceus* Fabr. (1801). — 1000', 16., 24. IX., 16. X., 3. XI. 06; 4 exemplaires. Habitat de cette espèce: Guatemala, Venezuela, Colombie.
35. *Brachydirus aeneipennis* n. sp. (Bernhauer in litteris). — 1800', 13., 16. XI. 06; 3 exemplaires.
36. *Xanthopygus calidus* Er. (1859). — 1000', 9. X. 06; un seul exemplaire.
37. *Gastrisus opaculus* Sharp. (1884). — 1000', 13., 15., 21. X. 06; 6 exemplaires. Espèce décrite de Panama.
38. *Aleochara centralis* Sharp. — 1800', 13., 15., 17., 19. XI. 06; 5 exemplaires.
39. *Aleochara taeniata* Sharp. — 1000', 13. X. 06; 1800', 10. XI. 06; 6 exemplaires.
40. *Diestota angulicollis* Bernh. — 1000', 3. XI. 06; 1 exemplaire.

* rectius: iconnicovi.