

## Жужелицы трибы *Chlaeniini* (Coleoptera, Carabidae) Украины

А.В. Пучков

[Putchkov A.V. The ground beetles of the tribe Chlaeniini (Coleoptera, Carabidae) in Ukraine]

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, Киев,  
Украина. E-mail: putchkov@izan.kiev.ua

Эколого-фаунистические данные о большинстве видов трибы *Chlaeniini* фауны Украины с разной полнотой представлены в ряде работ (Петрусенко, Петрусенко, 1971; Эйдельберг и др., 1988; Ризун, 2003; Кириченко, Бабко, 2004; Сумароков, 2009, и др.) и обобщены в крупных сводках (Kryzhanovskij et al., 1995; Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 2003), в которых для республики указано 15 видов. Однако 4 известных из Украины вида (*Chlaenius costulatus*, *Ch. sulcicollis*, *Ch. tibialis*, *Ch. steveni*) в последней работе не указаны, а *Ch. inderiensis* приведен в ней ошибочно. По нашим данным, на территории Украины достоверно отмечено 18 видов из 4 родов: *Callistus* (1 вид), *Dinodes* (2), *Epomis* (1) и *Chlaenius* (14 видов из 5 подродов). Находки еще 3 видов (*Ch. quadrisulcatus*, *Ch. flavipes*, *E. circumscriptus*) возможны, но требуют подтверждений. До сих пор не проверены данные о распространении *Ch. terminatus*, хотя вид указан для большинства зон Украины (Петрусенко, Петрусенко, 1971). Видовое разнообразие трибы увеличивается как с севера на юг, так и с запада на восток. Если в степи зарегистрировано 15 видов из 4 родов, то в лесостепи – 13, в Полесье и Карпатах – по 8 видов соответственно из 3 и 2 родов. В Горном Крыму отмечены 11 видов из 4 родов. Пять видов распространены почти по всей территории Украины. Некоторые таксоны характерны только для отдельных регионов. Так, исключительно в лесной зоне отмечены *Ch. costulatus*, *Ch. tibialis*, а на юге Украины – *Ch. alutaceus*, *Ch. aeneocephalus*, *Ch. steveni*, *D. decipiens* и все виды рода *Epomis*. Представители трибы – типичные зоофаги с сумеречной или ночной активностью. Тип размножения весенне-летний, зимуют обычно имаго. Большинство видов (12) встречается редко, и только 6 видов (*Ch. nigricornis*, *Ch. nitidulus*, *Ch. tristis*, *Ch. vestitus*, *Ch. spoliatus*, *D. cruralis*) относительно обычны. Большинство видов тяготеет к берегам водоемов или к хорошо увлажненным биотопам (заболоченные участки, влажные луга). Только представители *Dinodes* и подрода *Trichochlaenius* рода *Chlaenius* населяют луговые и даже степные участки, хотя и мезофитного типа. Необходимо проведение дальнейших исследований по встречаемости некоторых таксонов трибы в основных регионах Украины, что позволит уточнить спорные границы их современного распространения в пределах республики, а также изучение биологических и экологических особенностей видов, для большинства которых они недостаточно известны.