



Новый для Россіи видъ златки — *Dicerca miranda* Reitt.  
(Coleoptera, Buprestidae).

**Влад. Баровскаго.**

Приобрѣтя изъ коллекціи умершаго члена Русскаго Энтомологическаго Общества Б. Л. Маковскаго экземпляръ златки безъ опредѣленія, я отнесъ его по виѣшнему виду къ подроду *Argante* Kiesw., руководствуясь при томъ, главнымъ образомъ, характерными для этого подрода четырьмя продольными бороздками на грудномъ щитѣ. Пересматривая, однако, въ этомъ году свою коллекцію златокъ, я при ближайшемъ опредѣленіи этого экземпляра усомнился въ правильности отнесенія его къ *Argante* Kiesw., такъ какъ противъ этого говорили признаки на послѣднихъ брюшныхъ сегментахъ, заставлявшіе отнести его къ подроду *Dicerca* in sp.; но и въ этомъ отношеніи мой экземпляръ не совмѣщалъ въ себѣ всѣхъ признаковъ, присущихъ послѣднему подроду; въ немъ не наблюдалось на концахъ надкрыліи, по ихъ внутреннему и виѣшнему краямъ, *ясныхъ* зубцовъ, — признаковъ, отмѣченныхъ Рейтеромъ въ его опредѣлительной таблицѣ видовъ *Dicerca* <sup>1)</sup> («Die Schwanzförmige Verlängerung der Flügeldecken ist an der Spitze mit deutlicher Innen- und Aussenecke»). Будучи вслѣдствіе этого поставленъ въ затрудненіе, къ какому же подроду отнести интересовавшій меня экземпляръ, я, просматривая въ той же опредѣлительной таблицѣ Рейттера подробное описаніе отдѣльных видовъ *Dicerca*, обнаружилъ, что авторъ въ описаніи новаго вида *Dicerca miranda* не настаиваетъ вовсе на вышеупомянутомъ признакѣ, ясной зубчатости концовъ надкрыліи, а говоритъ, что «внутренніе углы концовъ надкрыліи у него съ *очень* тонкимъ и *очень* маленькимъ шипообразнымъ

1) Reitter: Wien. Ent. Zeitg., XXIII, 1904, pp. 23—24.

зубцомъ» («Innenwinkel der Spitze mit einem *sehr* feinem und *sehr* kleinen Dornzähnen bewehrt»). Этотъ именно признакъ и былъ характеренъ въ моемъ экземплярѣ, вслѣдствіе чего у меня не оставалось сомнѣнія, что я имѣю дѣло съ новымъ видомъ *Dicerca miranda* Reitt., только-что описаннымъ Э. Рейттеромъ въ цитированной статьѣ по экземпляру, пойманному имъ самимъ въ Герцеговинѣ.

Видъ этотъ крайне интересенъ, такъ какъ составляетъ какъ-бы переходъ отъ *Dicerca* in. sp. къ *Argante* Kiesw. и въ то-же время по внѣшней своей формѣ очень походитъ на *Poecilonota variolosa* Раук., на что между прочимъ указываетъ и Рейттеръ. Интересенъ онъ также и потому, что является новымъ для фауны Россіи; до сихъ поръ изъ Россіи мнѣ извѣстны только два экземпляра: мой (♀) изъ Могилевской губерніи, 1896 г., и другой (♂) изъ Губерлинскихъ горъ Оренбургской губерніи, 1891 г., изъ коллекціи Сиверса, переданной въ Музей Имп. Академіи Наукъ. Послѣдній экземпляръ небольшой ♂ со слабо развитымъ зубцомъ на средней голени (признакъ, характеризующій ♂♂ рода *Dicerca*): у него на мѣстѣ зуба только слабое возвышеніе. Этотъ экземпляръ былъ признанъ Г. Г. Якобсономъ за новый видъ и по выходѣ въ свѣтъ опредѣлительной таблицы Рейттера для рода *Dicerca* отнесенъ Г. Г. также къ виду, описанному Э. Рейттеромъ подъ вышеприведеннымъ названіемъ *Dicerca miranda* Reitt.



Отдѣльный оттискъ изъ «Трудовъ Русскаго Энтомологическаго Общества»,  
т. XXXVII.

Январь 1906 г.

Редакторъ: Андрей Семеновъ.