

Белопятнистый усач *Monochamus scutellatus* (Say)

Страны распространения и возможного заноса:

Канада, США, Мексика. Возможен занос в Китай, импортирующей из США круглую древесину тсуги и псевдотсуги. Возможна интродукция в РФ.

Характерная подкарантинная продукция и пути распространения:

Возможен занос с крупномерными саженцами хвойных пород, «рождественскими деревьями» (преимущественно – североамериканскими видами рода *Abies*), включая: сосну (*Pinus* spp.), пихту (*Abies* spp.), ель (*Picea* spp.), лиственницу (*Larix* spp.), тсугу (*Tsuga* spp.), псевдотсугу (*Pseudotsuga* spp.), а также деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород.

Симптомы повреждений и методы диагностики:

Наличие на стволе летных отверстий не менее 5 мм в диаметре, буровой муки вблизи этих отверстий, а также поверхностных и уходящих вглубь древесины ходов личинок шириной не менее 5 мм, частично забитых буровой мукой.



Monochamus scutellatus
(фото Н. Schmidt; <http://bugguide.net/node/view/945049/bgimage>)



Monochamus scutellatus
(фото Н. Schmidt;
<http://bugguide.net/node/view/945048/bgimage>
)



Monochamus scutellatus
(фото М. Roth; <http://bugguide.net/node/view/57775/bgimage>)