Л. Ф. Боргаренко. Гельминты птиц Таджикистана. Кн. I. Цестоды. Душанбе, Дониш, 1981, цена 3 р. 60 коп.

Рецензируемый труд Л. Ф. Боргаренко представляет собой региональную сводку по ленточным червям птиц Таджикистана, основанную на большом оригинальном материале, собранном автором на протяжении более 20 лет. Изучению цестод птиц посвящено очень много работ отечественных и зарубежных авторов, однако обобщений по фауне цестод отдельных регионов далеко не достаточно; появление такой сводки применительно к территории Таджикистана весьма своевременно и актуально. Многие из цестод, паразитирующих у птиц, патогенны; заболевания, вызываемые ими, причиняют значительный ущерб птицеводческим и промысловым хозяйствам. Для выявления паразитологической ситуации отдельных районов прежде всего следует познать фауну данной территории или хозяйства, чтобы на ее основе строить научно обоснованные мероприятия по борьбе с заболеваниями. Этому и посвящен I том сводки «Гельминты птиц Таджикистана».

Для птиц Таджикистана автором установлено 216 видов цестод, из которых 158 для республики указываются впервые. Есть также виды, встреченные впервые в СССР. Автором описано 5 новых видов и совместно с А. А. и Л. П. Спасскими — 5 новых видов и 4 новых рода. Указываются распространение каждого вида по районам Таджикистана, хозяева, степень инвазии, локализация и наличие их в других республиках Средней Азии и в Казахстане. Для новых, впервые зарегистрированных в СССР и ранее недостаточно изученных видов цестод приводятся оригинальные описания и рисунки.

В конце книги опубликованы списки видов цестод по хозяевам, алфавитный указатель видов, перечисленных в книге, а также библиография.

В целом рецензируемая сводка дает хорошее представление о видовом составе фауны цестод птиц Таджикистана и в этом отношении весьма полезна.

Все же при тщательном знакомстве с текстом возникает ряд замечаний. Одним из недостатков можно отметить отсутствие хотя бы краткой характеристики фауны цестод птиц исследуемого региона. Цестоды птиц изучались во всех весьма разнообразных эколого-географических зонах Таджикистана в разные сезоны. Без анализа этого огромного фактического материала опубликованная работа во многом теряет свое значение как сводка. То, что экологический и зоогеографический анализы видового состава цестод будут даны «в одном из следующих томов этого издания», не спасает положения. То, что касается анализа фауны цестод, должно быть именно в томе по цестодам.

Слишком кратка и малоинформативна физико-географическая характеристика Таджикистана. Ссылки на литературные источники, где имеются подробные сведения, в данном издании неубедительны, поскольку они не для всех могут быть доступны, так как книга рассчитана (как следует из аннотации) на очень широкий круг читателей, включая ветеринарных работников и студентов.

Отсутствует и характеристика исследованной орнитофауны. Нужно было дать список исследованных птиц с указанием характера их пребывания в местах исследования (пролет, гнездовье, зимовка и т. д.). Тогда совершенно иначе воспринималась бы и систематическая часть книги.

Обращает на себя внимание плохое качество рисунков. В ряде случаев они ничего не дают для опознания вида (2—4, 11); в большинстве случаев рисунки слишком крупные, что не связано со сложностью изображения на них каких-то деталей морфологии (сколексы — на рис. 21, 65; членики — на рис. 61, 66а, 128а; яйца — на рис. 65, 116). Нередко один рисунок занимает целую страницу (114 — один сколекс!). За исключением очень немногих (17, 39, 51, 76), рисунки выполнены грубо, что, возможно, искажает соотношение размеров и топографию органов (например, 65а, 65б, 66б, 112а).

Все приведенные в алфавитном указателе ссылки на страницы неверны. То же относится и к «Оглавлению». В тексте есть ошибки и опечатки, которые можно было бы устранить при более тщательном редактировании.

Хочется высказать пожелание автору постараться избежать указанных недочетов в следующих томах сводки «Гельминты птиц Таджикистана», посвященных другим группам гельминтов.

И. Е. Быховская-Павловская