

КОРИЧНЕВЫЕ (ПУРПУРНЫЕ) ПОЛОСЫ (BROWN (PURPLE) BANDS)

Достаточно обычный вариант окраски. На раковине присутствуют две широкие полосы различных оттенков коричневого, иногда почти черного цвета, расположенные в верхней и нижней части оборота (1). Полосы могут быть организованы либо как прослойки пурпурного пигмента в верхней части остракума, ниже которых тянется в той или иной степени выраженный пигментный “шлейф” (2), либо занимать всю толщу раковины. В месте расположения полос раковина имеет обычную микроструктуру. Коричневые полосы обычно встречаются у *Littorina obtusata*, имеющих фоновую окраску с участием оранжевого пигмента. Реже признак наблюдается у желтых моллюсков и только в отдельных случаях - у литторин с желто-пурпурной и депигментированной раковиной¹. Изменчивость признака проявляется в изменении интенсивности окраски полос (вплоть до полной депигментации), их ширины, редукции отдельных полос, слиянии и распространении полос на всю или часть поверхности раковины. У желто-оранжевых *Littorina obtusata*, депигментация полос приводит к появлению своеобразного варианта окраски, внешне выглядящего как желтые особи с двумя продольными оранжевыми полосами (3). Рисунок из пятен белого или пурпурного пигмента, если он присутствует, всегда формируется вне зоны расположения полос.

Обозначения: $\text{П}_{2\text{пур}}, \text{В}^{\text{P}}$



RGB: $81_{\pm 35}: 50_{\pm 23}: 23_{\pm 20}$



¹ – Интересно отметить, что у *Littorina saxatilis* признак всегда ассоциирован с бело-пурпурной фоновой окраской.