

**Таксономический состав, распространение и  
морфологическое разнообразие жуков-дровосеков рода  
*Paraclytus* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae)**

**А.И. Мирошников**

[Miroshnikov A.I. Taxonomic composition, distribution, and morphological variety of longicorn beetles of the genus *Paraclytus* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae)]

Сочинский национальный парк, Россия. E-mail: miroshnikov-ai@yandex.ru

В недавно опубликованном каталоге жуков-дровосеков Палеарктики под редакцией Лёбля и Сметаны (Löbl and Smetana, 2010) приведено 8 видов рода *Paraclytus* Bates, 1884: *P. sexguttatus* (Adams, 1817), *P. raddei* (Ganglbauer, 1882), *P. reitteri* (Ganglbauer, 1882), *P. excultus* Bates, 1884, *P. apicicornis* (Gressitt, 1937), *P. primus* Holzschuh, 1992, *P. shaanxiensis* Holzschuh, 2003 и *P. emili* Holzschuh, 2003. Анализ литературных сведений и изучение обширного коллекционного материала (в том числе типового) позволили по крайней мере вдвое увеличить число известных видов этого рода (с учетом описываемых в настоящее время новых видов из Китая), установить спектр важных морфологических особенностей его представителей, определить центр наибольшего видового разнообразия, уточнить распространение некоторых форм. К наиболее существенным признакам имаго, на основе которых сделаны выводы о принадлежности тех или иных таксонов к роду *Paraclytus*, относятся строение и окраска члеников усиков, строение переднеспинки, в том числе наличие боковых бугров и характер покрова из волосков, строение вершины надкрылий и особенности ее покрова, характер рисунка и окраска надкрылий, строение генитального аппарата самца и некоторые другие. Кроме указанных выше видов в данном роде на наш взгляд следует рассматривать описанные из Китая *Anaglyptus tibetanus* Pic, 1914, *A. jii* Holzschuh, 1992, *A. helenae* Holzschuh, 1993, *A. irenae* Holzschuh, 1993, *A. scolopax* Holzschuh, 1999, *A. (Aglaophis) ochrocaudus* Gressitt, 1951. Судя по литературным сведениям, весьма вероятно, что в его состав входит также китайский *Anaglyptus (Aglaophis) albiventris* (Gressitt, 1937). *Anaglyptus luteofasciatus* Pic, 1905 из Греции, рассматриваемый некоторыми исследователями в составе рода *Paraclytus*, относится все же к роду, в котором он описан. За пределами Палеарктики представители рода *Paraclytus* пока неизвестны, но их нахождение вполне возможно на севере Индокитая.