

Новый видъ *Scymnus* изъ С.-Петербургской губерніи  
(Coleoptera, Coccinellidae).

В. Баровскаго (С.-Петербургъ).

*Scymnus jacobsoni*, sp. n.

Oblongo-ovalis, convexiusculus, ater, albo-pubescent, aequaliter punctatus; callo humerali valde evidente. Os, palpi tarsique flavescentes, elytra nigra, maculâ oblongâ postmedianâ rubrâ notata. Prosternum sat latum, lineis parallelis marginem anticum longe non attingentibus. Latitudo pronoti longitudine suâ paulo magis quam duplo major. Metasterni linea mediana impressa prae abdomine in  $\frac{1}{6}$  longitudinis suaе in carinulam humilem transit. Linea femoralis segmenti primi abdominis apicem segmenti non attingit, atque implena est, i. e. arcus externus tertia suâ parte basali oblitteratus. Long. 2,5 mm.

Rossia sept.: Petropolis.

Продолговато-овальный, кзади немнога съуженный, черный, довольно густо покрытый бѣловатыми волосками, равномерно пунктированный, съ яснымъ плечевымъ бугромъ. Ротъ, пальцы и лапки желтоватые, первый членикъ сяжекъ значительно събѣтлѣе окрашенъ, чѣмъ послѣдующіе. На каждомъ надкрыльѣ по одному продолговатому красному пятну ниже средины; пятна приближены къ наружному краю надкрылий. Переднегрудка довольно широкая, съ параллельными, не доходящими до края линіями. Ширина грудного щита немнога больше, чѣмъ въ два раза, его длины. Линія на заднегруди, начинаясь почти со средины, на  $\frac{1}{6}$  своей длины переходитъ въ маленький киль, которымъ и кончается. Бедрятая линія первого брюшного сегмента, начинаясь отъ основанія, не доходитъ до вершины его; она не полная, т. е. виѣшия дуга сглаживается къ концу приблизительно на  $\frac{1}{3}$ .

По таблицѣ J. Weise (Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren, Coccinellidae, Mödling, 1885) этотъ видъ ближе всего подходитъ къ *Scymnus levaillanti* Muls., но многимъ отличается отъ послѣдняго.

Эта интересная находка сдѣлана А. Г. Якобсономъ въ ближайшихъ окрестностяхъ С.-Петербурга, именно на Лахтинской дорогѣ (отъ Елагина о-ва до Лахты) 18. VIII. 1890, и сохраняется въ коллекціи зоологического кабинета СПб. Университета. Составляя списокъ *Coccinellidae* С.-Петербургской губерніи, я при пересмотрѣ этой коллекціи обнаружилъ въ ней этотъ видъ *Scutellus*, опредѣленный какъ „*biguttatus* M u l s.?“—Называю его въ честь Г. Г. Якобсона, не отказавшаго мнѣ въ содѣйствіи при выясненіи этой формы.

---