



0-883-3/3357

Revisio specierum palaearticarum Coccinellidarum generis Exochomus Redtb.

V. Barovsky.

[Баровский, В. Обзоръ палеарктическихъ видовъ рода Exochomus Redtb. (Coleoptera, Coccinellidae)].

(Представлено 1-го Апрѣля 1920 г.).

Exochomus kiritshenkoi sp. n.

Hemisphaericus, configuratione corporis late ovali, niger, nitidus, ore, mento, toto sincipite (in ♂ toto capite et marginibus anterioribus lateralibusque pronoti), palpis articulo ultimo apice excepto, antennis, pronoti margine laterali externo peranguste in parte anteriore circum angulos anticos late limpido, pedibus, limbo angusto et lateribus sterniti 2-i abdominalis nec non tribus ultimis sternitis flavo-rufis. Pronotum valde transversale, longitudine media plus quam duplo latius, minutissime rugulosopunctatum, lateraliter et infra obscure pubescens, angulis anticis lobiformiter valde prominentibus, a capite sat distantibus, apice subacutis, latitudine maxima (in medio sita) non minore quam elytrorum basis. Scutellum nigrum. Elytra rubra, minutissime denseque punctulata, nigro 4-maculata (1, 1, 1, 1), puncto 1-o; omnium minimo, nonnihil post tuberculum humerale paulo interiorius sito, 2-o ad finem primi trientis longitudinis elytrorum prope suturam, 3-o ad finem secundi trientis prope marginem lateralem, 4-o ad finem tertii quadrantis prope suturam positis; puncto 3-o post punctum primum, puncto 4-o post punctum secundum in lineis rectis positis, quibus omnibus inter se subaeque

distantibus; epipleuris longitudinaliter impressis, fortiter punctulato-rugosis aureoloque pubescentibus, in triente anteriore lateribus subparallelis, dein sensim angustatis. Subtus corpus totum cum pedibus longe aureolo-pubescentis. Sternitum abdominale primum lineis femoralibus late semicircularibus manifeste delineatis. Unguiculi in duobus trientibus basalibus crassioribus subrectis, longius a basi dentem subacutangulum formantes, toto triente apicali tenui, arcuato.

Long. 5,2 mm., lat. 3,8 mm.

Prov. Heptapotamica: Kutemaldy ad angulum occidentalem lacus Issyk-kul (A. KIRITSHENKO, 3. VIII. 1910 leg.); prov. Maracandica (Samarkand): angustiae Jori in montibus Zeravshanensibus (A. FEDTSHENKO, 2. V. 1869 leg.); prov. Syrdariensis: vallis fl. Talas (E. FISCHER, 29. IV et VI. 1906 leg.); Persia septentrionalis: Shahrud (H. CHRISTOPH, leg.).—8 specimina (2 ♂, 6 ♀: 3 in coll. Mus. Zool. Petrop., 5 in coll. auctoris).

Exochomus kirgizorum sp. n.

Ovalis, convexus, niger, subtiliter punctulatus, pubescens, ore, prothorace, mesopleuris, pedibus, sternitisque abdominalibus duobus ultimis rufo-testaceis, elytris cyaneis, capite in ♂ rufo-testaceo, in ♀ nigro. Elytra subtilius quam pronotum punctulata et pubescentia, limbo laterali humerum amplectente, sed vix callum humerale introrsum superante; epipleuris ascendentes, punctulato-rugosis. Unguiculi basi indistincte dentati.

Long. 3—3,5 mm., lat. 2,2—2,6 mm.

Turkestan: prov. Syrdariensis: Perovsk (J. BAECKMANN, 20—29. IV. 1 et 5. V. 1905 leg.; G. SUMAKOV, 23. V. 07 leg.).—9 specimina (coll. auctoris).

Primo aspectu *Ex. semenovi* WSE¹⁾ simillimus, sed minor convexitate et minus oblongus, elytris minutissime rugulosis, minus profunde sparsiusque punctatis, limbo laterali humerum amplectente, sed vix callum humerale introrsum superante; pronoto antrorum magis angustato, angulis anticis prothoracis a capite longius distantibus magisque rotundatis.

1) Cl. auctor, cuius originale hujus speciei specimen ante oculos habeo (coll. P. SEMENOV-TIAN-SHANSKII, nunc in Mus. Zool. Petrop.), de elytrorum pilositate mirum in modum in descriptione sua nullam fecit mentionem.

Exochomus mongol sp. n.

Oblongo-ovalis, niger, tarsis, antennarum palporumque basibus picecentibus, nitidus, minutissime punctatus, interspatiis punctorum quam puncta ipsa multo majoribus; subtus pilis albidis minutissimis nitidisque dense obtectus. Elytra bis rubromaculata (1, 1): macula 1-a subrotunda lateribus laceratis post callum humeralem posita, ab hoc spatio diametro suo longitudinali aequali separato (i. e. multo posterius quam in *Ex. quadripustulato* L.), maxime parte sua interius sita; 2-a in medio secundi trientis longitudinis elytrorum prope suturam posita, spatio ipsa macula paulo breviore a sutura separata, oblique ovata, quam prima nonnihil minore. Unguiculi in duobus trientibus basalibus subrectis, dilatatis, ante initium trientis apicalis dentem subacutangulum formantibus, toto triente apicali tenui, arcuato. Species primo aspectu *Ex. quadripustulato* (L.) similis.

Long. 4 mm., lat. 3 mm.

Mongolia: Teraldzhi, fl. Kerulen, prope lacum Dalaj-nor (V. SOLDATOV in exped. cl. G. POTANINI, 12. VI. 1899 leg.).— Specimen unicum, ♀ (coll. P. SEMENOV-TIAN-SHANSKII, nunc in Mus. Zool. Petrop.).

Unguiculos similiter atque in *Ex. mongol* m. formatos habent etiam *Ex. undulatus* WSE. et *Ex. kiritshenkoi* m.; ceterarum specierum unguiculi regulariter arcuati basi magis incrassati intusque magis ad basin, haud procul a medio longitudinis incisi sunt; in *Ex. quadripustulato* L., *Ex. melanocephalo* ZUBK., *Ex. flavi-pede* THUNB., *Ex. uropygiali* MULS. et *Ex. puniceipenni* SEM. prae incisura dente valido acutangulo armati; in *Ex. pubescenti* KÜST., *Ex. anchorifero* ALL., *Ex. semenovi* WSE. et *Ex. kirgizorum* m. prae incisura dente indistincto rotundato praediti.

Quae signa genus *Exochomum* L. REDTB. in tria subgenera dividendum esse indicant. Facilioris conspectus causa tabulam synopticam, quae sequitur, addo.

Tabula synoptica specierum palaearcticarum generis *Exochomus* REDTB.

I (II, III). Unguiculi dente valido basali instructi....

..... Sbg. **Exochomus** L. REDTB. 1843 s. str.

1 (4). Pronotum glabrum.

- 2 (3). Elytra nigra rufo-maculata aut rufo-picta
..... 1. **Ex. quadrimaculatus** (L. 1758).
- 3 (2). Elytra unicolora, nigra vel coeruleo reluentia...
..... 2. **Ex. flavipes** (THUNB. 1784)¹⁾.
- 4 (1). Pronotum dense pilosum.
- 5 (6). Pronotum flavum, solum medio macula vel vitta
nigra aut fusca notatum; elytra glabra, nigra vel
coeruleo reluentia.. 3. **Ex. melanocephalus** (ZUBK. 1833).
- 6 (5). Pronotum nigrum; elytra dense pilosula, punicea,
· rufa vel rufo-flava.
- 7 (8). Elytra punicea unicoloria.. 4. **Ex. puniceipennis** SEM. 1900.
- 8 (7). Elytra rufa, vel rufo-flava, apice nigra
..... 5. **Ex. uropygialis** MULS. 1853.
- II (I, III). Unguiculi dente indistincto basali instructi.
..... Sbg. **Parexochomus** n.
- 1 (6). Pronotum et elytra sat dense pilosula.
- 2 (3). Elytra aut nigra, aut rufo-marginata, aut ad apicem
rufo-maculata..... 6. **Ex. pubescens** KÜST. 1848.
- 3 (2). Elytra metallica, unicoloria, coerulea aut coeruleo-
viridia.
- 4 (5). Elytra limbo laterali vix callum humerale intror-
sum superante..... 7. **Ex. kirgizorum** BAR. 1919.
- 5 (4). Elytra limbo laterali humerum omnino amplectente,
introrsum basin medianam superante
- 8. **Ex. semenovi** WSE. 1887.
- 6 (1). Pronotum et elytra glabra, flava, nigro picta.....
..... 9. **Ex. anchorifer** ALL. 1870.
- III (I, II). Unguiculi dente subacutangulo post medium
instructi Sbg. **Anexochomus** n.
- 1 (4). Pronotum unicolor nigrum vel rufescens; elytra
nigra, rufo-maculata vel rufo-picta.
- 2 (3). Elytra fasciis rufis vel pictura alia rufa ornata;
forma corporis fere rotunda
- 10. **Ex. undulatus** WSE. 1878.
- 3 (2). Elytra maculis quattuor rufis ornata; forma corporis
ablongo-ovalis..... 11. **Ex. mongol** BAR. 1919.

1) *Ex. minutus* KRAATZ (1878) = *Pentilia egena* MULS. — W. HUBENTHAL,
Ergänzungen zur Thüringer Käferfauna. IV, 1 Nachträge in D. E. Z. 1908,
p. 270.

- 4 (1). Pronotum angulis anticis translucidis, vel margine antico angulisque anticis rufo-flavis; clytra rufa nigro-maculata 12. **Ex. kiritshenkoi** BAR. 1919.



Fig. 1.

- a. *Unguiculi* subgeneris **Exochomus** s. str.
b. " " **Parexochomus** BAR.
c. " " **Anexochomus** BAR.

Subgen. I. **Exochomus** (REDTB.) LENG 1908¹⁾.

1. *Ex. quadripustulatus* (L.) 1758.
2. *Ex. flavipes* (THUNB.) 1784.
3. *Ex. melanocephalus* (ZUBK.) 1833.
4. *Ex. uropygialis* MULS. 1853.
5. *Ex. puniceipennis* SEM. 1900.

Subgen. II. **Parexochomus** BAR. 1919.

6. *Ex. pubescens* KÜST. 1848.
7. *Ex. anchorifer* ALL. 1870.
8. *Ex. semenovi* WSE. 1887.
9. *Ex. kirgizorum* BAR. 1919.

Subgen. III. **Anexochomus** BAR. 1919.

10. *Ex. undulatus* WSE. 1878.
11. *Ex. kiritshenkoi* BAR. 1919.
12. *Ex. mongol* BAR. 1919.

Sbg. **Exochomus** (REDTB.) LENG. 1908.

1. **Ex. quadripustulatus** (L.).

- Coccinella 4-pustulata*, L. Faun. Suec. p. 159. 499.—Id. Syst. Nat., p. 585. 43.
" *lunulata*, ZSCHASH, Mus. Lesk. p. 12. 217.
" *4-verrucata*, F. Ent. Syst. 1. p. 288. 104.—Id. Syst. Eleuth. t. 1,
p. 381. 136.
" *cassidioides* DONOV. Nat. Histor. t. 7, p. 74, pl. 343, fig. 3.
" *varia*, SCHRANK, Faun. Boic. 1. p. 466.

1) LENG, CHARLES W. Notes on Coccinellidae III. Journ. New York Entomolog. Soc. Vol. XVI, 1908, p. 33.

Chilocorus 4-verrucatus, STEPH. Syn. t. 4, p. 375. 5.

Exochomus 4-pustulatus, REDTB. Tent. 15. 1.

"	"	MULS. Hist. Nat. de Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 172.
"	"	KÜST. Käf. Europ. III. 94.
"	"	KRAATZ, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, p. 191, 194.
"	"	CROTCH, Rev. Coccin. p. 193.
"	"	WEISE, Best. Tab. 1879, p. 132; 1885, p. 52.
"	"	GANGLB. Käf. Mitt. Europ. III, 2, p. 284.
"	"	REITTER, Faun. Germ. 134.
"	"	ЯКОВСОНЪ, Жуки Россіи и Зап. Европы, стр. 991.

„Convexus, niger, lunula elytrorum humerali, pustula pone medium limboque postico abdominis rubris“.

Длина превышаетъ ширину; черный, переднеспинка по переднему и боковому краямъ нерѣдко съ темно-красной каемкой. Надкрылья съ болѣе или менѣе глубокимъ продольнымъ вдавленіемъ немнога за боковымъ краемъ, черные; каждое надкрылье съ двумя красными пятнами: одно — лунообразное, огибающее снаружи плечевой бугорокъ, причемъ задняя его часть, пригнутая къ плечу шире, чѣмъ передняя, другое — обыкновенно поперечное, расположено за срединой надкрылья, ближе къ шву, чѣмъ къ наружному краю. Нижняя сторона насѣкомаго черная, передняя часть епиплевръ, за исключениемъ чернаго бокового края, конецъ и боковые края брюшка красные.

Длина 3—5,5 мм.

Распространеніе: Европа, Азія, Африка.

- a. Надкрылья совершенно черныя..... ab. *marchicus* REINECK¹⁾.
- b. Плечевое пятно отсутствуетъ..... ab. *disilotus* n.
- c. Второе пятно отсутствуетъ; плечевое нормально.....
..... ab. *bilunulatus* WSE.
- d. Второе пятно отсутствуетъ, между плечевымъ и боковымъ краемъ появляется еще пятно.. ab. *omostictus* n.
- e. Оба пятна на каждомъ надкрыльи увеличены; плечевое распространяется къ боковому краю, немного не доходя до него или доходя до него совершенно; второе увеличено, круглое или четырехугольное, неправильной формы. Южная Европа, Кавказъ, Персія
..... subsp. *distinctus* BRÜLLE.

1) REINECK — D. E. Z. 1912, p. 744.

- f. Плечевое пятно увеличено, продолговато-четырехугольное занимаетъ при основаніи немнога болѣе половины ширины надкрылья и обыкновенно заключаетъ въ себѣ небольшое черное пятнышко на плечевомъ бугоркѣ; передній край переднеспинки, а часто и большія рѣзко ограниченныя пятна на переднихъ углахъ переднеспинки красныя или красно-желтые.— Кавказъ, Сицилія (Ludy) (*quadriguttatus* Fleisch. Wien. Ent. Ztng. XIX, p. 118).
..... subsp. *ibericus* Motsch.
- g. Надкрылья съ шестью красными пятнами: помимо двухъ нормальныхъ на каждомъ надкрыльи имѣется еще третье—или между плечевымъ пятномъ и швомъ (ab. *sexpustulatus* Kr.), или на $\frac{2}{3}$ длины надкрылья по боковому его краю (ab. *marginipustulatus* n.), или же между плечевымъ пятномъ и боковымъ краемъ (ab. *hexasticus* n.).—Южная Европа, Персія.....
..... subsp. *sexpustulatus* Kraatz.
- h. Какъ e, но оба пятна широко слиты; „одно общее, большое, различной формы черное пятно, идущее приблизительно отъ одного плеча къ другому, распространяясь за средину, равно какъ и узкая боковая каемка, внезапно расширяющаяся на $\frac{2}{3}$ своей длины и доходящая расширенной до конца надкрылья“.— Далмація, Греція, Кавказъ (*reitteri* Schneid.).
..... subsp. *koltzei* Wse.
- i. Верхняя сторона какъ у недоокрасившихся экземпляровъ красновато-желто-рыжая съ нѣсколько болѣе блѣдными, болѣе или менѣе ясными нормальными пятнами (*haemotideus* Costa, Faun. Nap. 62, t. 2, fig. 1; *unicolor* Schaufuss.)— Южная Европа, Персія.....
..... subsp. *floralis* Motsch.
- j. Какъ i, но плечевое пятно раздѣлено на два (какъ у *sexpustulatus* Kr.), переднеспинка съ бѣлыми боковыми краями и бѣлымъ же переднимъ краемъ.— „In frondibus Cedri libani in alpe Baruk Libani“.....
..... ab. *cedri* I. Sahib.

2. Ex. *flavipes* THUNB.

Coccinella nigromaculata GOEZE, Ent. Beitr., p. 248.

“ *testudinaris* FOURK. Ent. par. 1, p. 151. 27.

“ *aurita* SCRIBA. Journ., p. 276. 159.

“ *nitidula*, var. SCHÖNCH. Syn. Ins. t. 2, p. 194. 121.

“ *nigriceps* WIEDEM. Neue Exot. Käf. in Germ. Mag. t. 4, p. 183. 99 (♀).

“ *humeralis* TOWNS, Voy. t. 3, p. 167, pl. 2, f. 1.

“ *specularis* BON. Spec. Faun. Subalp. p. 180, pl. 30, f. 30.

Exochomus auritus REDTB. Tent. p. 15. 2.

“ “ MULS. Hist. Nat. de Col. de Fr. (Sécuripalpes), p. 176.

“ “ Küst. Käf. Eur. III. 95.

“ *collaris* Küst. Käf. Eur. XVII. 100 (pars).

“ *pyrenaeus* KRAATZ, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, p. 194 (♀).

“ *nigromaculatus* GOEZE, Crotch, Rev. Coccin. p. 192.

“ “ WSE, Best. Tab. 1879, p. 134; 1885, p. 54.

“ *flavipes* THUNB. GANGLB. Käf. Mitt. Eur. III, 2, p. 984.

“ “ RTTR. Faun. Germ. III, p. 134.

“ “ ЯКОВСОНЪ, Жуки Россіи и Зап. Евр., стр. 991.

„Niger, nitidus, subtilissime punctatus, thoracis, lateribus, abdomine pedibusque aurantiis“.

Длина чаще превосходитъ ширину; черный, голова и эпимеры среднегруди у ♂ красно-желтые, у ♀—черные. Переднеспинка съ широкими боковыми красно-желтыми краями, которые рѣзко отграничены отъ черной средины, закруглены къ срединѣ (не прямые) или вытянуты въ видѣ тупого угла. Нижняя сторона черная, брюшко и ноги красно-желтые; иногда надкрылья имѣютъ слабый металлический отблескъ; у некоторыхъ ♀ надкрылья матовые (по мнѣнію KRAATZ'а¹) и WEISE²)—горная форма)—*collaris* Küst., *pyrenaeus* KRAATZ.—Эта форма встрѣчается у насъ въ Россіи не только въ горахъ, мнѣ лично попадалась и въ нашей низменной Петроградской губерніи.

Длина 2,5—4,5 мм.

Распространеніе: Европа, почти вся, кроме крайняго съвера, Азія, Африка съ островами, Суматра (Baly), Австралия (Fry).

a. „Черный цвѣть на переднеспинкѣ распространенъ въ сильной степени. Надкрылья коричневые или красновато-черные; по окраскѣ очень напоминаетъ *Ex. 4-pustulatus* L. var. *floralis* MOTSCH.—Вднѣ (Lepriens)⁴.....ab. *hipponensis* PIC.

1) KRAATZ, G. Berl. Ent. Zeitschr. XVII. 1873, p. 194.

2) WEISE, J. Best. Tab. 1879, p. 134.

- b. Переднеспинка красно-желтая съ одной срединной черной линіей.— С.-З. Африка: Сенегаль (*russi-collis* MULS.)..... subsp. *troberti* MULS.
- c. Переднеспинка и голова одноцвѣтныя, желто-красныя.— Южная Европа, Азія, Африка (*xanthoderus* FAIRM.)... subsp. *nigripennis* ER.

3. **Ex. melanocephalus** ZUBK.

Coccinella melanocephala ZUBK. Bull. Soc. Imp. N. de Moscou VI. 1833, p. 339.

Exochomus nigromaculatus GOEZE, WEISE, Best. Tab. 1879, p. 134.

„ *melanocephalus* ZUBK. WEISE, Best. Tab. 1885, p. 54.

„ „ „ Яковсонъ, Жуки Россіи и Зап. Евр. 1915,
стр. 991.

„ Caput nigrum. Pronotum flavum, macula nigra, a margine postico usque ad marginem anticum paulatim angustata ornatum. Elytra cyanea, nitida, tenuiter punctata. Pedes flavi“¹⁾.

Меньше чѣмъ предыдущій, длина болѣе ширины, черный, переднеспинка красно-желтая, съ черной или темной, суживающейся къ переди срединной полоской, красно-желтые бока не рѣзко отграничены отъ этой черной срединной полоски; голова и переднеспинка довольно густо покрыты мелкими волосками. Надкрылья черные съ синимъ или сине-зеленымъ отливомъ, покрыты мелкими едва замѣтными короткими волосками (эти волоски значительно тоньше и короче, чѣмъ на головѣ и переднеспинкѣ); волоски надъ плечами гуще и нѣсколько болѣе длинны. Переднегрудь, ноги и послѣдніе стерниты брюшка красновато-желтые.

Длина 2,5—2,8 мм.

Распространение: Южная Россія—Ѳеодосія (Ретовский), почти весь Южный берегъ Крыма, Туркестанъ, Сирія.

4. **Ex. uropygialis** MULS.²⁾

Brumus uropygialis MULS. Crotch, Rev. Cocc. p. 194.

„ *Ovalis, niger, pubescens*. Elytra flavo-rufa, ad apicem macula

1) „La tète est noire. Le corslet est fauve, avec une tache noire, qui commence au bord postérieur et qui remonte en se retrécissant vers le bord antérieur. Les élytres sont bleus, brillants, finement ponctués. Les pieds sont fauves“.

2) MULSANT, E. Opuscules Entomologiques, T. III, Lyon 1853 in „Supplément, a la Monographie des Coléoptères trimères sécuripalpes“, p. 68.

suborbiculari nigrescente ornata, fere partem octavam suturae tegente¹⁾.

Довольно большой, овальный, черный, густо покрытый довольно короткими волосами. Надкрылья желто-рыжія, имѣющія на концѣ почти круглое, черноватое пятно, едва занимающее по своей длини восьмую часть шва; тѣло слабо выпуклое. Голова и щупики черные. Антенны темные. Переднеспинка черная, тупо и слабо закругленная и возвышающаяся отъ края къ сторонамъ; немного сильнѣе загнутая кзади отъ основанія и по срединѣ, въ 1 и $\frac{1}{3}$ раза шире своей длины. Щитикъ маленький, черный. Надкрылья слабо выпуклы, кзади сводчаты, желто-рыжія, каждое изъ нихъ имѣетъ на своемъ концѣ полукруглое пятнышко, эти пятна при сложенныхъ вмѣстѣ надкрыльяхъ составляютъ почти круглое черноватое или почти черное пятно, занимающее по своей длини почти восьмую часть длины надкрылій (по шву). Нижняя часть тѣла и ноги черные. Бедрьные линіи представляютъ правильные дуги, занимающія $\frac{2}{3}$ длины сегмента.

Длина 4,5 мм., ширина 3,3 мм.

Распространение: Сѣверная область Индіи (колл. Дей-ролля) (MULSANT); Кашмиръ: Кулу (Ростъ).

5. *Ex. puniceipennis* SEM.²⁾.

Synonyma nulla.

„Major, angustior, breviter ellipticus, summâ latitudine suâ 1,35 longior, niger, elytris saturate puniceis, parum nitidus“.

Довольно большой, узкій, короткоэллиптическій, длина въ 1,35 раза больше ширины, черный, надкрылья насыщенно-пунцоваго цвѣта, нѣсколько блестящій. Голова сплошь покрыта довольно длинными прилегающими темно-серыми волосами. Переднеспинка сильно поперечная, по срединѣ болѣе чѣмъ въ два раза шире своей длины, вся довольно сильно пунктирована и покрыта довольно частыми прилегающими некороткими

1) „Ovale; noir; pubescent. Elytres d'un jaune roux, ornées à l'extremité d'une tache suborbiculaire noirâtre, couvrant à peine le huitième de la suture“.

2) SEMENOV, A. Coleoptera asiatica nova, XI. Hora Soc. Ent. Ross. T. XXXIV, 1900, p. 684.

темно-серыми волосками, боковой ея край довольно сильно расширенъ и нѣсколько загнутъ, съ ясно выраженнымъ, хотя и тупо закругленными задними углами и лопастеобразными сильно выдающимися и въ достаточной мѣрѣ отстоящими отъ головы и нѣсколько острыми на вершинѣ передними. Ширина надкрылій у плечей немного превосходитъ ширину основанія переднеспинки, наибольшая ширина надкрылій приходится у средины и едва меньше ихъ длины (1,1), на вершинѣ надкрылья, сложенные вмѣстѣ, слегка заострены, въ верхней своей части равномерно и умеренно выпуклы, къ вершинѣ же постепенно и на большемъ протяженіи покаты, густо едва морщинисто пунктированы, съ очень слабымъ блескомъ, покрыты очень короткими, но явственными, серыми пыльцеобразными волосками, у бѣкового края, ясно распластанного не вертикально, но косо покаты, этотъ край при взглядѣ на него сбоку около средины явственно на большомъ протяженіи слабо вырѣзанъ. Ениплевры продольно вдавленныя, сильно точечно морщинистыя, въ рѣдкихъ волоскахъ, въ передней своей трети широкія и съ почти параллельными краями, далѣѣ постепенно съужены. Снизу все тѣло съ ногами покрыто длиннымъ, прилегающимъ, довольно обильнымъ серымъ пушкомъ. Первый брюшной стернитъ съ широко полукруглыми бедренными линіями, достигающими почти послѣдней его четверти. Коготки съ сильнымъ зубцомъ при основаніи.

Длина 4,4 мм., ширина 3,25 мм.

Распространеніе: Восточная Бухара — пров. Гискарь, верхнее теченіе рѣки Карагатъ (Е. Вильбергъ, 1898); западная оконечность плоскогорья Алай, рѣка Кизиль-су, 8100 м. (Федченко! 21 VII. 1871); Искандеръ-Куль, Мура-Пассъ (Д. Глазуновъ! 1892).

Subgen. **Parexochomus** BAR. 1919.

6. **Ex. pubescens** Kust.

Platynaspis flavilabris Motsch. 1849, Bull. Soc. Nat. Moscou 3, p. 155.

" " " Muls., Spécies de Coccin. p. 947.

" *pubescens* Kust. Crotchi, Rev. Coccin., p. 196.

Exochomus pubescens Kust. Weise, Best. Tab. 1879, p. 182; Id. 1885, p. 54.

" " " Яковсонъ, Жуки Россіи и Зап. Евр. стр. 991.

" *Ater, nitidus, punctulatus, subtilissime griseo-pubescent;*
thorace lateribus infraque, pedibus quoque vitellinis".

Черный, блестящий, пунктированный, покрытый очень тонкими сърыми волосками; переднеспинка съ боковъ и снутри, ноги и конецъ брюшка желтые. Форма тѣла круглая, длина почти равна ширинѣ. Переднеспинка или черная съ красно-желтыми боковыми краями, или красно-желтая съ чернымъ срединнымъ пятномъ у основанія, или наконецъ совсѣмъ безъ пятенъ — желтая (экз. приводимый у Сротчнъ изъ Персіи¹⁾); переднегрудь, ноги и послѣдніе стерниты брюшка красно-желтые. Переднеспинка и надкрылья покрыты очевь тонкими, но относительно длинными и ясными волосками.

Длина 3 мм.

Распространение: Испанія, Алжиръ, Тунисъ, Египетъ; Сирія, Персія; Закаспійская область; Закавказье (Эривань).

- a. Надкрылья черные, на концѣ съ поперечнымъ желто-краснымъ пятномъ (*apicatus* FAIRM. 1884²⁾, *apicalis* WSE 1885)³⁾ ab. *gestroi* FAIRM. 1875⁴⁾
b. Надкрылья черные, окаймлены красно-желтой полоской по всему боковому краю (*circumcinctus* J. SAHLB. 1903)⁵⁾ ab. *Iugubrivestis* MULS. 1853⁶⁾

7. *Ex. anchorifer* ALL.

Exochomus 4-pustulatus L. var. *ericae* CROTCHN, Rev. Coccin. 1874, 193.

Chilocorus nigropictus FAIRM. Petites Nouv. Entom. 1876, № 162, p. 94.

" *picturatus* FAIRM. l. c.

Exochomus nigropictus FAIRM. Annales de la Soc. Ent. Fr. 1880, p. 31; Comptes Rendu de Seances de la Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXX.

" *picturatus* FAIRM. l. c.

" *anchorifer* ALL. BEDEL, L., L'Abeille XXVIII, № 3, p. 52.

" " " Яковсонъ, Жуки Россіи и Зап. Евр., стр. 991.

" *Brevissime ovatus*, sat convexus, niger, sat nitidus, prothoracis capitisque margine antico anguste pallidis, elytris rufis,

1) BEDEL, L. Note sur la synonymie etc. dans la Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XXXIV.

2) Description de Coléoptères recueillis par le baron BONNAIRE en Algérie. Comptes Rendus des Seances de la Soc. Ent. de Belgique, 1884, p. LXX.

3) Best. Tab. 1885, p. 54.

4) Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 540.

5) O: F. V. S. XLV. 1903, n° 18, p. 36.

6) Opusc. Entom. III, 1853, p. 66.

anguste nigro-marginatis, vitta suturali ante medium transversim dilatata, post medium maculiformi ampliata, apice late expansa nigra, et utrinque macula subbasilaris et macula post medium sita, ad marginem extensa nigris; prothorace elytris valde angustiore, angulis posticis late rotundatis, anticis subacutis, impressis; scutello parvo, acuto; elytris anguste marginatis, ad humeros angulatis, subtilissime vix perspicue dense punctulatis⁴.

Почти круглый, выпуклый, блестящий, черный. Голова свѣтлая также какъ и передній край переднеспинки; надкрылья желтые съ узкой черной каемкой, шовъ черный; передъ срединой довольно большое, нѣсколько прямоугольное, попечерное пятно, за срединой по бокамъ шва соединяясь съ нимъ расположены два черных пятна, направленные нѣсколько внизъ и въ стороны. Переднеспинка ясно уже надкрыльй, съ широко закругленными задними углами и заостренными передними; щитикъ небольшой, квадрат заостренный. Надкрылья съ очень узкой боковой каемкой, съ нѣсколько выступающими передними углами, очень мелко, но довольно густо пунктированы.

Длина (3) 4,5—5 мм.

Распространение: Сѣверная Африка — Алжиръ.

8. *Ex. semenovi* Wse.¹⁾.

Synonyma nulla.

Breviter ellipticus, sat convexus, niger, ore, prothorace elyt-risque subtiliter punctulato et pubescente, pedibus segmentisque abdominalibus tribus ultimis rufo-testaceis, elytris aut cyaneis aut viridi-coeruleis, evidenter granulato alutaceis, subtiliter punctatis, epipleuris fere planis, unguiculis basi leviter dentatis.

Эллиптический, немного выпуклый (значительно болѣе плоский, чѣмъ *Ex. 4-pustulatus* L.), черный, покрытый мелкими сѣроватыми волосками, которые на мелко пунктированныхъ головѣ и переднеспинкѣ болѣе длинны и часты. Передняя часть головы, переднегрудь, переднеспинка, ноги и три послѣдние брюшные стернита красновато-желтые. Щитикъ маленький трехугольный, блестящий, темный. Надкрылья васильково-синія или синевозеленые, мелко шагренированы и пунктированы, съ матовымъ блескомъ, покрыты сверху сѣроватыми очень тонкими и мел-

1) WEISE, I. Neue sibirische Chrysomeliden und Coccinelliden. — Wiegmanns Archiv für Naturgeschichte LIII, 1857, p. 211.

кими, мельче чѣмъ на головѣ и переднеспинкѣ волосками; эпиплевры покрыты болѣе густыми и длинными волосками, въ первой своей трети почти прямые, очень слабо наклонены внутрь, далѣе къ концу съуживаются и наклонъ ихъ становится сильнѣе. Бедрѣнныя линіи полукруглые, достигаютъ трехъ четвертей стернита. Коготки при основаніи съ очень слабымъ и неяснымъ зубцомъ.

Длина 3,5—4,5 мм.

Распространеніе: Монголія — озеро Курлыкъ - Норъ (Роворовскій и Козловъ).

9. *Ex. kirgizorum* Bar.

См. выше.

Subgen. *Anexochomus* Bar. 1919.

10. *Ex. undulatus* Wse.

Synonyma nulla.

„Niger, nitidus, confertim subtilissime punctulatus, coleopteris fasciis duabus rotundatis maculisque 2 pone medium ad latus rufis; thorace coleopteris fere dimidio angustiore“.

Овальный, мелко пунктированный, съ матовыми блескомъ, черный; каждое надкрылье съ однимъ дважды зигзагообразно вырѣзаннымъ поперечнымъ краснымъ пятномъ, начинающимся немного отступая отъ щитика и доходящимъ до наружного края, здѣсь, продолжаясь вдоль него на одну треть, круто заворачиваетъ внутрь и кзади, охватывая, такимъ образомъ, почти четырехугольное черное пятно; другое зубчатое пятно расположено на $\frac{2}{3}$ длины надкрылья, ближе къ наружному краю и также идетъ отъ наружного края къ шву параллельно первымъ двумъ. Голени, лапки и два послѣднихъ брюшныхъ стернита темно-красные.

Длина 3,5—5 мм.

Распространеніе: Дагестанъ, Тифлисъ, Теберда (Богдановъ-Катьковъ)¹⁾, Сыръ-Дарынская область, Персія, Сирія.

Основной цвѣтъ надкрылій красный, въ передней ихъ части передъ срединой расположена черная, довольно широкая, поперечная перевязь, идущая къ бокамъ, но не достигающая бокового края, эта перевязь по срединѣ, на швѣ, по переднему

1) „Извѣстія Кавказскаго Музея“.

своему краю вытянута къ щитику въ видѣ остроконечнаго языка; съ противоположной стороны т. е. по заднему краю она какъ бы немного выхвачена, образуя небольшую выемку; позади средины надкрылій съ каждой стороны расположено по 2 или по 3 черныхъ пятна: первое изъ нихъ поперечное у бокового края сейчасъ же за срединой, второе продолговатое (идущее вдоль шва) немного далѣе позади первого, почти у самаго шва; третье, часто отсутствующее, поперечное, на самой вершинѣ надкрылій; два послѣднихъ въ большинствѣ случаевъ соединены между собою.—Ташкентъ ab. 7-maculatus Wse.

11. **Ex. kiritchenkoi** Bar.

См. выше.

12. **Ex. mongol** Bar.

Тоже.

