



V. Barovskij (Petrograd).

Species nova generis *Drilus* Oliv. e Persia septentrionali (Coleoptera, Cantharididae).

В. Баровский (Петроград).

Новый вид рода *Drilus* Oliv. из северной Персии (Coleoptera, Cantharididae).

*Drilus iljini*, sp. n.

♂. Oblongo-ovalis, piceo-niger, pilis aureolis nonnihil erectis obsitus. Os, palpi, articulus secundus antennarum serratarum, farsi antici, unguiculi omnes, articulationes pedum segmentumque anale flavo-rufi, antennae et tarsi intermedii et postici obscuriores. Prothorax longitudine sua duplo latior, angulis posticis obtusis, nonnihil rotundatis, basi quam elytrorum basis angustior, duabus impressionibus fortibus ad lineam medianam signatus, densius quam elytra pilis aureolis obsitus, praesertim vero in angulis posterioribus fortiter punctatis, ubi pili quasi fasciculos seu penicillos latera versus eminentes efficiunt. Elytra leviter punctata, solum vestigia striarum punctatarum irregularium praebentia, pilis aureolis, qui in marginibus lateralibus densiores sunt, sparsim obsita. Long. 6 mm.

Persia septentrionalis: Hassan-Kiadch (B. Iljin 27. IV. 1916 leg.). Specimen unicum (coll. auctoris).

A speciebus jam cognitis proximeque affinibus facile distinguitur: a *D. fulvitaris* Baudi angulis posterioribus prothoracis aliter formatis, a *D. longulo* Kiesw., cui proxime affinis, latitudine prothoracis, cujus basis elytrorum basi multo angustior est, a *Dr. novoathonio* Sum. (cujus typus et duo mares in collectione mea habeo) latitudine majore, structura angulorum posteriorum prothoracis, colore antennarum pedumque, nec non colore longitudineque pilorum.

Смоляно-черный, продолговато-овальный, покрытый несколько приподнятыми золотистыми волосками. Рот, щупики, второй членик шлосидных антенн, передние лапки, коготки остальных, сочленения ног и анальный сегмент желто-красные; антенны и остальные две

пары лапок темнее. Переднеспинка в два раза шире своей длины, с тупыми, несколько закругленными задними углами, в основании уже основания надкрылий, с двумя сильными вдавлениями по бокам срединной линии, гуще чем надкрылья покрыта золотистыми более длинными, чем на последних, волосками, особенно в сильно пунктированных задних углах, где эти волоски выступают в стороны как бы кисточками. Надкрылья слабо пунктированные, блестящие, лишь со следами неправильных точечных бороздок, покрытые редкими золотистыми волосками, которые по боковому краю расположены гуще. Длина 6 мм.

Легко отличается от известных уже видов: от *Dr. fulvitaris* Vaudé задними углами переднеспинки, от *Dr. longulus* Kiesw., рядом с которым должен быть поставлен, шириной переднеспинки, основании которой значительно уже основания надкрылий; от *Dr. novonathoni* Sum.—большой шириной (по отношению к длине), строением задних углов переднеспинки, цветом антенн и ног, а также длиной и цветом покрывающих насекомое волосков.