



# МАТЕРИАЛЫ КЪ ФАУНѢ

Н. Н. Богдановъ-Катьковъ (Петроградъ).

Къ фаунѣ Coccinellidae Кубанской области.

N. Bogdanov-Katjkov (Petrograd).

Contribution à la faune des Coccinellides de la province  
de Kubanj.



Отд. отт. изъ „Записокъ Музея Природы и Истории Черноморского  
Побережья Кавказа“, вып. I, 20 Августа 1916 года.

# МАТЕРИАЛЫ КЪ ФАУНѢ.

Н. Н. Богдановъ-Катьковъ (Петроградъ).

Къ фаунѣ Coccinellidae Кубанской области.

N. Bogdanov-Katjkov (Petrograd).

Contribution à la faune des Coccinellides de la province de Kubanj.

Настоящій списокъ составленъ на основаніи матеріаловъ собранныхъ мной, моими друзьями С. Г. Крыжановскимъ<sup>1</sup> и С. М. Кожевниковымъ, а также различными воспитанниками 1-й Екатеринодарской мужской гимназіи, занимавшимися энтомологіей подъ руководствомъ преподавателя природовѣденія Ф. В. Андерсона. Данный списокъ касается божьихъ коровокъ преимущественно Кубанской области и отчасти Черноморской губерніи. Онъ далеко не полонъ и заслуживаетъ опубликованія только вслѣдствіе отсутствія соотвѣтствующей литературы.

\* <sup>1)</sup>) *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* L.

Анапское ш. VII, 910 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Этотъ видъ не рѣдокъ въ нѣкоторыхъ мѣстостяхъ Евр. Россіи. На Кавказѣ онъ былъ тоже найденъ и извѣстенъ изъ Черноморской, Тифлисской, Елизаветпольской и Эриванской губ. и обл. Терской и Дагестанской. Въ Куб. обл. онъ несомнѣнно будетъ найденъ и въ другихъ мѣстахъ.

<sup>1)</sup> Звѣздочкой отмѣчены виды впервые указываемыя для Кубанской области.

\* *Stethorus punctillum* Ws.

Тонельная VII. 1910 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Пока этотъ видъ на Кавказѣ находили только въ Черноморской и Тифлисской губ. и въ Тальшѣ, но нужно думать, что онъ распространенъ у насъ болѣе широко.

Со временемъ въ Кубанской области будутъ найдены также слѣдующіе виды: *Pullus auritus* Thunb. (уже указанъ для Черноморской и Тифлисской губ.), *P. argutus* Muls. (извѣстенъ изъ Тифлисской и Елисаветпольской губ. и Дагестана). *P. suturalis* Thunb. (извѣстенъ изъ Южной Россіи и Закавказья). *Diomus rubidus* Motsch. (найденъ въ Южной Россіи и Закавказьѣ).

\* *Scymnus frontalis* Fabr.

Маркохтъ VIII. 1911 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Видъ этотъ широко распространенъ по Европейской Россіи. На Кавказѣ извѣстенъ изъ Черноморской, Кутаисской, Тифлисской, Эриванской и Елисаветпольской губерній.

Изъ другихъ представителей этого рода слѣдуетъ ожидать еще: *S. apetzi* Muls., *S. interruptus* Goeze., *S. rubromaculatus* Goeze. А также со временемъ въ Куб. обл. будутъ вѣроятно найдены *Nephus bipunctatus* Kug., *N. crucifer* Fleisch.

\* *Hyperaspis reppensis* Herbst.

Медвѣдовская 24. VII. 913 (И. Зубченко).

Этотъ видъ извѣстенъ изъ Ю. Россіи, а на Кавказѣ былъ найденъ въ Тифлисской, Дагестанской и Эриванской губ.

Изъ другихъ представителей этого рода на первыхъ порахъ въ Куб. обл. слѣдуетъ ожидать также *H. campestris* Herbst. (Черноморская губ.).

\* *Oxynocheirus erythrocephalus* Fabr.

Екатеринодаръ 913 (Максимовъ).

На Кавказѣ найденъ пока только въ Елисаветпольской губ. и Дагестанской обл., но будетъ найденъ вѣроятно и въ другихъ мѣстахъ Кавказа.

\* *Hippodamia tredecimpunctata* L.

Эпчикъ VIII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Могилки 8.V. 1912 (Ф. Андерсонъ и Н. Богдановъ-Катьковъ).

Анапское ш. VI. 913 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Екатеринодаръ 4. V. 910 (Н. Горскій).

Подкова V. 913 (В. Михайловъ).

Этотъ видъ широко распространенъ по Европейской Россіи, въ Закавказье водится *subsp. signata* Fald., а въ Предкавказье указанъ только для Черноморской губерніи.

Въ Куб. обл. можно ожидать еще *Anisosticta flavidollis* J.

\* *Semiadalia notata* Laich.

Анапское ш. VII. 910 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Эта божья коровка водится также въ Тифлисской и Черноморской губ. Кромѣ того можно ожидать *S. undecimnotata* Schneid. (уже указана для Черноморской, Тифлисской губ. и Донской обл.)

\* *Adonia variegata* Goeze.

Анапа VII. 910 (Ф. Андерсонъ).

Анапское ш. 1909 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Могилки 8.VI. 912 (Ф. Андерсонъ и Н. Богдановъ-Катьковъ).

Медвѣдовская VII. 913 (И. Зубченко).

Полтавская 912 (П. Подолякъ).

Теберда 14.VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ.)

Джемагатъ 1.VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Новороссийскъ 8 VI. 1910 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Этотъ видъ широко распространенный по Кубанской области попадается при кошении часто въ большомъ количествѣ. На Кавказѣ былъ найденъ въ Черноморской, Терской, Тифлисской, Эриванской губерніи и въ Талышѣ.

Несомнѣнно въ Куб. обл. будетъ найдена *Aphidecta oblitterata* L. (найдена уже въ Терской, Кутаисской и Тифлисской губ. и на Ю. Россіи).

*Bulaea lichatschovi* Humm.

Анапа VII. 910 (Андерсонъ).

Екатеринодаръ 1912 (Педино).

Подкова. V. 1912 (Н. Горскій).

Пашковская 18. V. 1910 (Чайченко).

Медвѣдовская VII. 913 (И. Зубченко).

Полтавская (П. Подолякъ).

Маркохтъ 8. VII. 913 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Анапское ш. VI. 913 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Могилки 17. VI. 912 (Ф. Андерсонъ и Богдановъ-Катьковъ).

Теберда 1915 (С. Крыжановскій).

Джемагатъ VI. 915 (С. Кожевниковъ)

Баталпашинскъ VI. 915 (Н. Богдановъ Катьковъ).

Новсррессійскъ 1916 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Это одна изъ самыхъ обычныхъ въ нашей области божьихъ коровокъ. Она водится повсюду въ Ю. Россіи и уже констатирована въ Тифлисской, Елизаветпольской, Дагестанской, Эриванской, Бакинской, въ Талышѣ.

\* *Adalia bipunctata* L.

Екатеринодаръ 1912 (Возіановъ).

Теберда VII. 1915 (С. Крыжановскій).

Могилки 6. VI. 1916 (Н. Богдановъ-Катьковъ и Ф. Андерсонъ).

Анапское ш. 1911 (Н. Черкасовъ).

Новороссийскъ VI. 1912 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Распространеніе этой божьей коровки очень велико отъ Швеціи и Норвегіи до Закавказья и возможно до Персіи. На Кавказѣ этотъ видъ уже былъ найденъ въ Черноморской, Терской, Тифлисской, Дагестанской, Бакинской губ и въ Тальшѣ.

\* *A. bipunctata L. v. quadripustulata Scop.*

Эпчикъ VIII. 915 (С. Крыжановскій).

\* *Coccinella septempunctata L.*

Екатеринодаръ 1910 (Е. Паласовъ).

Подкова (Задунайскій)

Славянская (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Полтавская (П. Подолякъ).

Теберда VII. 915 (С. Крыжановскій).

Баталпашинскъ VI. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Анапское ш. VI. 913 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Анапа VII. 910 (Ф. Андерсонъ).

Медвѣдовская VII. 913 (И. Зубченко).

Джемагатъ VII. 915 (С. Крыжановскій).

Могилки <sup>2)</sup> 8. VI. 912 (Ф. Андерсонъ и Н. Богдановъ-Катьковъ).

Новороссийскъ VI. 912 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Это самая обычная божья коровка и на Кавказѣ встрѣчается рѣшительно вездѣ.

\* *C. quinquepunctata L.*

Теберда VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Баталпашинскъ VI. 916 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Анапское ш. VI. 911 (Н. Черкасовъ).

Извѣстно, что этотъ видъ встрѣчается какъ въ Предкавказье такъ и въ Закавказье хотя для Куб обл. еще не былъ указанъ.

<sup>2)</sup> Мѣстность близъ станицы Царской Майкопскаго отд.

\* *C. undecimpunctata* L.

Екатеринодаръ VI. 1910 (В. Михайловъ).

*C. hieroglyphica* L.

Анапское ш. VI. 911 (Н. Черкасовъ).

Екатеринодаръ VI. 910 (В. Михайловъ).

Этотъ видъ уже былъ указанъ для Куб. обл., а изъ другихъ мѣстъ Кавказа пока неизвѣстенъ.

\* *C. de septimpunctata* L.

Пер. Мухинскій VI. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Аулъ Сентинскій VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Учкулакъ VIII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Клухоръ VIII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Джемагатъ VII. 915 (С. Крыжановскій).

Для Кавказа уже показанъ до сихъ поръ изъ Кутаисской, Тифлисской, Елизаветпольской, Эриванской и Талыша

\* *C. quatuordecimpustulata* L.

Эпчикъ VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Видъ широко распространенъ по Кавказу и Россіи.

\* *C. sinuatomarginata* Fald.

Анапа VII. 910 (Ф. Андерсонъ).

Медвѣдовская (И. Зубченко).

Полтавская 1913 (П. Подолякъ).

Назальникъ-колъ VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Теберда VII. 95 (С. Крыжановскій).

Амгата VII. 915 (С. Крыжановскій).

Джемагатъ VII. 915 (Богдановъ-Катьковъ).

Могилки VI. 912 (Ф. Андерсонъ и Богдановъ-Катьковъ).

Анапское ш. VI. 911 (Богдановъ-Катьковъ).

Встрѣчается въ Ю. Россіи. На Кавказѣ указанъ

для Тифлисской и Эриванской губ. Въ Куб. обл. очень обычень; вѣроятно распространенъ по всему переднему Кавказу.

\* *C. conglobata* L.

Теберда 14. VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

\* *Halyzia sedecimguttata* L.

Этикъ VII-915 (Н. Богдановъ-Катьковъ)

Съ Кавказа этотъ видъ уже показанъ; известны экземпляры изъ Кутаисской, Тифлисской губ. и Талыша.

\* *Vibidia duodecimguttata* Poda.

Анапское ш. VI. 912 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Показанъ также изъ Черном., Тифлис., Кутаисской губ. и Талыша.

Несомнѣнно со временемъ въ Куб. обл. будетъ найдена *Sospita vigintiguttata* L., указанная для Черноморской губ.

\* *Thea vigintiduopunctata* L.

Могилки 8. VI. 912 (Ф. Андерсонъ и Н. Богдановъ-Катьковъ).

Анапское ш. VI. 912 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Анапа VII. 910 (Ф. Андерсонъ).

Екатеринодаръ V. 910 (Б. Розановъ).

Подкова 17. VI. 913 (С. Амбарцумовъ).

Кругликъ (Б. Розановъ).

Теберда VII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Баталашинскъ VI. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Красногорка VI. 915 (С. Крыжановскій).

Тонельная VI. 1912 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Очень не рѣдкій въ Кубанской области видъ; встрѣчается во многихъ мѣстахъ Россіи и найденъ въ Черноморской, Терской, Тифлисской, Елизаветпольской и Дагестанской.

Нужно ожидать еще нахождение въ Кубанской области *Calvia decemguttata* L., показанную для Черноморской, Тифлисской губ. и Талыша а такъже С. quatuordecimguttata L.

\* *Propylaea quatuordecimpunctata* L.

Медвѣдовская VII. 913 (И. Зубченко).

Анапа VII. 910 (Ф. Андерсонъ).

Екатеринодаръ (И. Максимовъ).

Теберда VII. 915 (С. Кожевниковъ).

Могилки 8. VI. 912 (Ф. Андерсонъ и Богдановъ-Катьковъ).

Новороссійскъ VII. 911 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Видъ этотъ широко распространенъ по Кавказу, для Куб. обл. еще не былъ указанъ, но бывшія у меня материалы не оставили сомнѣнія, что *P. 14—punctata* L. встрѣчается рѣшительно повсюду въ области.

Слѣдуетъ ожидать нахожденія въ Куб. обл. еще *P. rosti* Ws описанную изъ Зап. Кавказа.

\* *Anatis ocellata* L.

Аулъ Даутъ VIII. 915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

*A. ocellata* L. широко распространена въ Европейской Россіи, Сибири, Западной Европѣ, но для Кавказа она была неизвѣстна. Возможно что этотъ видъ будетъ найденъ и въ другихъ мѣстахъ Кавказа.

Слѣдуетъ ожидать въ Куб. обл. также *Platynaspis luteorubra* Goeze.

\* *Chilocorus bipustulatus* L.

Теберда VII. 915 (С. Крыжановскій).

Могилки 8. VI. 912 (Ф. Андерсонъ и Богдановъ-Катьковъ).

*Ch. bipustulatus* L. широко распространенъ по Кавказу и не былъ найденъ едвали не въ одной только въ Куб. обл.

\* *Exochomus quadrípustulatus* L.

Муруджу 20. VII. 915 (С. Крыжановский).

На Кавказъ найденъ былъ только въ Эрив. губ., но судя по его широкому распространенію будетъ найденъ и во многихъ другихъ мѣстахъ Кавказа.

*E. undulatus* Ws.

Теберда 14. V. 1915 (Н. Богдановъ-Катьковъ).

Досихъ поръ этотъ видъ былъ указанъ лишь для Сиріи, Сырдарьянской обл., Дагест. и Тифл. губ.

Новороссійскъ 9. VIII. 916.



---

---

Первая Новороссійская тип. Н. Преображенского.

1916.