

Отд. отт. изъ П-го тома „Материаловъ къ познанію фауны юго-зап. Россіи“, изд. Кіевск. Орнитологич. Общ. имени К. Ф. Кесслера.

Описаніе новаго вида рода *Coccinella* изъ окрестностей Кіева.

Ф. Добржанскій (Кіевъ).

Description a new species of the genus *Coccinella* from the neighbourhood of Kiev.

By F. Dobrzhansky (Kiev).

Coccinella lutshniki, sp. n.

Ut *Coccinella 11-punctata* L. var. *tripunctata* L., sed major, magis rotundata, epimerae mesothoracis metathoracisque nigrae.

Тѣло округленно—ovalное, довольно сильно выпуклое, почти полушаровидное. Нижняя сторона черная, не исключая эпимеръ средне- и заднегруди. Ноги черные, въ рѣдкихъ желтоватыхъ волоскахъ. Ротовыя части черные, усики буроватые. Передній край переднегруди прямой. Переднегрудь съ двумя ясными килевыми линіями, доходящими до ея передняго края. Голова черная съ двумя желтыми продолговатыми пятнами посерединѣ и небольшимъ желтымъ пятномъ подъ каждымъ глазомъ. Переднеспинка черная съ желтымъ четырехугольнымъ пятномъ въ переднихъ углахъ. Такой же формы и величины пятна находятся и въ переднихъ углахъ переднегруди. Надкрылья и эпиплевры при жизни кроваво-красные, послѣ смерти темно-пурпуровые; ихъ рисунокъ состоитъ изъ небольшого чер-

наго прищитковаго пятна и нѣсколько большаго у середины каждого надкрылья. Надкрылья пунктированы равномѣрно, нѣсколько сильнѣе, чѣмъ переднеспинка, безъ утолщенія и бороздки вдоль бокового края. Форма надкрылій скатъ ихъ похожи на таковые у *Coccinella 7-punctata* L., но вершины ихъ немноголѣбо заострены. Длина 6,3 мм., ширина 4,7 мм.

2 экземпляра этого вида найдены въ наносахъ разлива рѣки Днѣпра подъ Киевомъ 9. IV. 1917 среди громаднаго числа другихъ Божихъ коровокъ—одинъ В. А. Александропскими, другой—мною.

Выше описанный видъ наиболѣе похожъ на *Coccinella 11-punctata* L. var. *tripunctata* L. и, повидимому, долженъ стоять въ системѣ рядомъ съ нею. Однако отъ названной формы новый видъ отличается черными эпимерами средне- и заднегруди, болѣе округленной формой тѣла и большей величиной. Отъ *Coccinella distincta* Fal d. новый видъ отличается кромѣ цвѣта эпимеръ также тѣмъ, что у него пятна въ переднихъ углахъ переднегруди и переднеспинки одинаковы по величинѣ и формѣ, а также формой тѣла, похожей на *Coccinella 7-punctata* L. Отъ послѣдняго вида *Coccinella lutshniki* Dobrzh. наиболѣе отличается отсутствіемъ утолщенія и бороздки вдоль бокового края надкрыльй.
