

**МАТЕРИАЛЫ
СЕДЬМОГО СЪЕЗДА
ВСЕСОЮЗНОГО
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА**

Часть первая

1974

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВСЕСОЮЗНОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН СССР

МАТЕРИАЛЫ
СЕДЬМОГО СЪЕЗДА
ВСЕСОЮЗНОГО
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

Часть первая

Общая энтомология.

Физиология, биохимия и биофизика.

Медицинская и ветеринарная энтомология

Ленинград
1974

Academy of Sciences of the USSR
THE SEVENTH CONGRESS OF THE ALL-UNION
ENTOMOLOGICAL SOCIETY

ABSTRACTS

First part

General entomology. Physiology, biochemistry and biophysics.
Medical and veterinary entomology

Leningrad, 1974

Редакционная коллегия:

Ю. С. Балашов, М. С. Гиляров, В. А. Заславский, О. А. Катаев, И. М. Кержнер (ответственный редактор), О. Л. Крыжановский, В. И. Кузнецов, Г. С. Медведев, Ю. А. Песенко, В. П. Семьянов, Е. С. Сугоняев, В. И. Тобиас, В. П. Тыщенко

К ФАУНЕ КОКЦИНЕЛЛИД (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE)
ОСТРОВА САХАЛИНА

В.Н.Кузнецов

(Биолого-почвенный институт Дальневосточного научного центра АН СССР, Владивосток)

В результате обработки собранного нами материала и просмотра коллекционных фондов Зоологического института АН СССР и Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР для фауны Сахалина установлено 23 вида кокцинеллид.

В лесных биоценозах на древесно-кустарниковой растительности обитают: *Scymnus abietis* Payk., *Chilocorus kuwanae* Silv., *Adalia conglomerata* L., *Coccinella nivicola* Muls., *Calvia quatuordecimguttata* L., *Halyzia sedecimguttata* L., *Harmonia axyridis* Pall., *Anatis halonis* Lew., *A. ocellata* L., *Neomysia gebleri* Crotch и *N. oblongoguttata* L.

На высокотравной и луговой растительности обычны: *Hippodamia tredecimpunctata* L., *Coccinella septempunctata* L., *C. trifasciata* L., *Coccinula quatuordecimpustulata* L. и *Prolytaea quatuordecimpunctata* L. Здесь же редко встречаются *Epilachna vigintioctomaculata* Motsch., *Hippodamia septemmaculata* Deg., *Adonia amoena* Goeze, *Coccinella sachalinensis* Ohtō, *C. ainu* Lew., *C. hieroglyphica* L. На болотах обитают: *Anisosticta bitriangularis* Say, *Hippodamia septemmaculata* и *H. tredecimpunctata*.

В зоогеографическом отношении фауна кокцинеллид Сахалина представлена 8 транспалеарктическими, 7 голарктическими, 2 транссибирскими, 2 уссурийско-японо-китайскими, 2 уссурийско-островными, 1 китайско-японским и 1 эндемичным видом (*Coccinella sachalinensis*).

ЖУКИ-ЛИСТОЕДЫ (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

К.З.Куленова

(Институт зоологии АН Казахской ССР, Алма-Ата)

Обширные сборы листоедов, проведенные в Зап. Казахстане в 1969-71 гг., дали возможность установить видовой состав и выявить особенности распространения и стациальной приуроченности видов. К настоящему времени в фауне листоедов Зап.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
1. Общая энтомология	5
2. Физиология, биохимия и биофизика	152
3. Медицинская и ветеринарная энтомология	199

Примечание. Указатель авторов к I-й и 2-й частям помещен в конце 2-й части.