

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ *

- 1(8). Переднегрудь без горловой лопасти.
- 2(3). Мандибулы направлены вниз под прямым углом к продольной оси головы (рис. 48). Боковые лопасти наличника выступают вперед в виде бугров или рожков. Тело удлиненное, вальковатое, голова едва уже переднеспинки I. *Niponiinae*.
- 3(2). Мандибулы направлены вдоль продольной оси головы. Наличник без боковых выступов.
- 4(5). Верхняя губа и мандибулы полностью или почти полностью прикрыты наличником. Тело удлиненное, вальковатое, голова заметно уже переднеспинки II. *Trypeticinae*.
- 5(4). Верхняя губа и мандибулы свободные, видны сверху.
- 6(7). Усики причленены к самому краю лба (рис. 47; часто в особой выемке этого края). Усиковые ямки расположены в передних углах переднегрудки, реже перед передними тазиками; если они приближены к срединному килю, то не заходят на него, а переднеспинка с продольными вдавлениями по бокам. Надкрылья без дорсальных бороздок или только со следами их. Тело овальное или цилиндрическое, маленькое III. *Abracinae*.
- 7(6). Усики причленены под краем лба. Усиковые ямки расположены перед передними тазиками и почти всегда заходят на срединный киль переднегрудки. Надкрылья обычно с дорсальными бороздками, если без них, то хотя бы с прищитковой бороздкой. Тело всегда более или менее овальное, переднеспинка без глубоких продольных вдавлений IV. *Saprininae*.
- 8(1). Переднегрудь с хорошо обособленной горловой лопастью, прикрывающей снизу голову.
- 9(14). Стебелек усиков не расширен и не уплощен; редко (у некоторых тропических форм) он расширен, но тогда голени с явственными шпорами.
- 10(11). Усиковые ямки расположены посредине боков переднегрудки перед тазиками; горловая лопасть с щелевидными продольными вырезками для вкладывания жгутиков. Передние голени обычно с немногими крупными зубцами. Верхняя губа со щетинконосными порами V. *Dendrophilinae*.
- 11(10). Усиковые ямки расположены в передних углах переднеспинки или под ними; горловая лопасть без вырезок для вкладывания жгутиков.
- 12(13). Верхняя губа со щетинконосными порами. Передние голени с многочисленными мелкими шипиками VI. *Tribalinae*.
- 13(12). Верхняя губа без щетинконосных пор. Передние голени обычно с немногими крупными зубцами VII. *Histerinae*.
- 14(9). Стебелек усиков расширен и уплощен или сильно угловатый. Голени без шпор или с едва заметными шпорами. Мирмекофильные (реже — в тропических областях — термитофильные) формы VIII. *Hetaerinae*.




Рис. 47. Голова *Abraeus globosus* (Hoffm.).

* Подсемейства, не встречающиеся в Палеарктике, в таблицу не включены.