



Purpuricenus kaehleri [L.] patří k našim nejkrásnějším broukům. Využíjí se v celé řadě listnatých dřevin. V Čechách již téměř vyhynul. Foto M. Chlumský



VZÁCNÉ NÁLEZY NĚKOLIKA DRUHŮ TESARIKŮ
 Nahofe vlevo: *Obrium cantharinum* [L.]. Využívá se v suchých osikových a topolových větvích nebo slabších kmíncích. Larva žije pod kůrou a před kuklením vstupuje do dřeva, kde vyhlodává kukelní komůrku. Vpravo: *Rhopalosiphum spinicornis* Abeille je jeden z našich nejvzácnějších tesariků. Zatím byl u nás chytán pouze jednotlivě a náhodně, např. smýkáním, sklepáváním, sedící na trávě apod. Vyskytuje se většinou v dubových nebo dubohabrových lesích. Uprostřed: Tesariček *Pronocera angusta* (Kriechb.) se nachází zřídka ve smrcinách, hlavně v Čechách. Imago lze nejčastěji najít na okrajových větvích mladších smrcin, kde probíhá pravděpodobně zralostní žír. Larva se využívá pod kůrou v horních částech suchých smrků a před kuklením vstupuje do dřeva. Dole vlevo: *Lioderus kollari* Rdtb. Larva se využívá pod kůrou a kuklí se v hákovité komůrce ve dřevě. Je nočním druhem, ale bývá nacházen i ve dne na květech. Vpravo: *Saperda perforata* (Pall.) patří k našim nejkrásnějším tesaričkům. Napadá hlavně oslabené nebo odumírající osikové kmeny, kde se pod kůrou využívá larva. Kuklí se v mělké komůrce ve dřevě, výjimečně též pod kůrou

Milan Sláma, foto M. Chlumský

