

Н. Н. Плавильщиковъ (Москва).

Новый видъ рода *Agapanthia* Serv. изъ Бухары
(Coleoptera, Cerambycidae).

(Изъ Зоологического музея Московского Университета).

N. N. Plavilstshikov (Mosquae).

De nova specie generis *Agapanthia* Serv. e Buchara (Coleoptera,
Cerambycidae).

(Museo Zoologico Universitatis Mosquensis).

Agapanthia (s. str.) *jacobsoni*, sp. n.

Corpo latissime, nigra, vittis medianis capite thoracisque albo, vittis lateralis thoracis flavescenti tomentosis, capite thoracisque pilis longis, erectisque nigris obsitis, sterno sat longe denseque griseo-flavescenti piloso, abdomine nigro piloso; elytris uniformiter cinereo tomentosis, in triente basali nigro pilosis, epipleuris albo tomentosis. Antennis corpore toto $1\frac{1}{4}$ longioribus, articulo 1° nigro, apice ferrugineo, levissime punctato, in dimidio basali dense albido pubescente, 3° — 11° rufescens, apice nigris, dense albido pubescentibus, 12° toto rufescente, albido tomentoso. Capite sat late, crebre punctato; prothorace latiore, lateribus in dimidio anteriore forte angustato, fortiter crebreque punctato. Elytris latissimis, parallelis, apice rotundatis, fortiter irregulariterque punctatis. Abdomine levissime punctato.

Long. 15,5 mm., lat. 5,5 mm.

Habitat: Buchara occid., fl. Amu-Dar'ja, prope urb. Tshardzhuij, 10. V. 1914 (N. Plavilstshikov!). Singulum individuum (verisimiliter ♀) in coll. mea.

A. kirbyi Gyl 11h. et *A. detrita* Krt. affinis, corpore formam et colorem facillime distinguenda. Meritissimo entomologo rossico G. G. Jacobson dedicata.

Тѣло широкое, слабо выпуклое, черное, покрыто мелкими черными, на надкрыльяхъ пепельно-сѣрыми волосками.

Голова черная, крупно пунктирована, покрыта черными волосками, более длинными на лбу; на темени узкая продольная полоска, покрытая белыми волосками.

Переднеспинка сильно поперечная, кпереди сужена значительно сильнее, членъ кзади, съ грубой, местами сливающейся пунктировкой; въ передней части ея по краямъ имѣется по небольшому довольно глубокому, косому вдавлению, по серединѣ ея продольная полоска, густо покрытая белыми волосками, полоска на боковомъ краю покрыта желтоватыми волосками; сверху она покрыта рѣдкими и длинными черными волосами, снизу волоски мельче и гуще.

Щитокъ полукруглый, густо покрытъ желтовато-белыми волосками.

Надкрылья очень широкія, въ длину они только въ два раза больше, членъ вмѣстѣ въ ширину, почти параллельныя, къ вершинѣ слабо сужены и вмѣстѣ округлены; пунктировка ихъ глубокая и крупная, точки часто сливаются между собой; они покрыты нѣжными и короткими волосками сѣровато-блѣлаго цвета, у основанія кромѣ того имѣются длинные, стоячіе черные волоски, не заходящіе за ихъ первую треть. Эпиплевры густо покрыты белыми волосками.

Брюшко черное, слабо блестящее, съ нѣжной и рѣдкой, едва замѣтной пунктировкой; боковые края сегментовъ покрыты рѣдкими лежачими волосками сѣроватаго цвета, посерединѣ сегментовъ разбросаны рѣдкіе, более короткіе волоски. Грудь густо покрыта длинными желтовато-сѣрыми волосками.

Усики на $\frac{1}{4}$ длиннѣ тѣла, довольно толстые, къ концу слабо уточнены. 1-ый членникъ черный, на вершинѣ рыжеватый, его первая половина густо покрыта белыми волосками; 2-ой членникъ черный; 3-ій и 4-ый членники сѣвернорыжіе, ихъ послѣдняя третья черная, покрыта черными волосками, двѣ первыхъ трети густо покрыты белыми волосками; послѣдний членникъ весь рыжій, покрытъ белыми волосками; остальные членники рыжіе съ белымъ волосянымъ покровомъ въ первой половинѣ и черные съ черными волосками во второй половинѣ; на 3—6-мъ членникахъ имѣются отдѣльные рѣдкіе, длинные черные волоски.

Ноги рыжевато-черные, густо покрыты сѣроватыми волосками; бедра крупно пунктированы, на нихъ отдѣльные длинные черные волоски.

Длина 15,5 мм., ширина 5,5 мм.

Западная Бухара: р. Аму-Дарья, близъ города Чарджуй, 10. V. 1914 (Н. Плавильщикова!). Одинъ экземпляръ (повидимому ♀) въ моей коллекціи.

Agapanthia jacobsoni легко отличима отъ всѣхъ остальныхъ видовъ этого рода благодаря своимъ широкимъ и короткимъ над-

крыльямъ. Отъ близкихъ къ ней *A. kirbyi* Gyll. и *A. detrita* Kraatz она отличается, помимо формы надкрыльевъ, волосянымъ покровомъ, окраской усиковъ, пунктировкой переднеспинки и надкрыльевъ и проч.

Для большей ясности я даю краткую опредѣлительную табличку для нея и сосѣдніхъ видовъ.

1 (2). Первый членикъ передней лапки короче двухъ слѣдующихъ члениковъ вмѣстѣ; членики эти короткіе, въ длину едва больше, чѣмъ въ ширину. Надкрылья на вершинѣ косо срѣзаны внутрь, ровно покрыты желто-рыжими волосками. Первый членикъ усиковъ черный, покрытъ черными волосками, крупно пунктированъ; 3-ій, 5-ый и 6-ой членики съ пучками черныхъ волосъ на концѣ. Длина 15—24 мм.— Южная Европа, Кавказъ.

A. kirbyi Gyll.

2 (1). 1-ый членикъ передней лапки длиннѣе или такой же длины, какъ два слѣдующихъ членика вмѣстѣ; членики эти длинные, въ длину гораздо больше, чѣмъ въ ширину. Надкрылья на вершинѣ вмѣстѣ закруглены.

3 (4). 1-ый членикъ усиковъ, кромѣ вершины, покрытъ бѣлыми волосками, очень мелко пунктированъ; волосяной покровъ остальныхъ члениковъ бѣлый въ первой ихъ половинѣ и черный во второй половинѣ; послѣдній членикъ рыжій. Волосяной покровъ надкрылій сѣровато-бѣлого цвѣта; черные стоячіе волоски имѣются только въ первой ихъ трети, преимущественно же у ихъ основанія. Щитокъ полукруглый. Длина 15,5 мм.— Зап. Бухара: Чарджуй.

A. jacobsoni, sp. n.

4 (3). 1-ый членикъ усиковъ крупно пунктированъ, черный, покрытъ черными волосками съ густыми желтыми волосками на наружномъ краю у основанія; остальные членики усиковъ покрыты желтыми волосками. Волосяной покровъ надкрылій желтаго цвѣта; черные стоячіе волоски на нихъ доходятъ до ихъ седины. Щитокъ квадратный. Длина 17—20 мм.— Туркестанъ.

A. detrita Krtz.