

Г. Суворовъ (Петроградъ).

Новые виды родовъ *Dorcadion* и *Compsodorcadi*on  
(Coleoptera, Cerambycidae).

G. Suvorov (Petrograd).

Espèces nouvelles des genres *Dorcadion* et *Compsodorcadi*on  
(Coleoptera, Cerambycidae).

*Dorcadion demokidovi*, sp. n.

♂. Лобъ достаточно сильно выпуклый, часто и грубо пунктированный; черезъ весь лобъ и темя проходитъ ясная продольная борозда; по сторонамъ этой борозды лобъ въ густыхъ коричневато-бархатистыхъ пятнахъ, а на темени пролегаютъ бѣлыя, достаточно широкія полосы, не достигающія передняго края переднеспинки; остальная часть темени въ густомъ черно-бархатистомъ покровѣ; само темя сильно выпукло. Усики крѣпкіе и толстые, на  $\frac{1}{4}$  не достигающіе вершины надкрылій; 1-ый членникъ ихъ красноватый, только вершина его нѣсколько затмнена; 2-й и 3-й до  $\frac{3}{4}$  своей длины тоже красноватые; остальные членники черные.

Переднеспинка квадратная, достаточно выпуклая; передній край прямо обрѣзанъ, задній нѣсколько округленъ и плотно прилегаетъ къ основанию надкрылій; очень грубо морщинисто пунктирована, съ тонкою, линейною, бѣлою срединною полосой, съ небольшими бархатистыми пятнами по сторонамъ; остальная часть поверхности почти совсѣмъ голая, съ крѣпкими, достаточно оstryми боковыми шипами, направленными прямо въ стороны.

Щитокъ треугольно-вытянутый, густо покрытый бѣлыми волосками.

Надкрылья овальныя, съ правильно закругленными плечами, съ основаниемъ равнымъ основанию переднеспинки, съ достаточно широкою бѣлою, по наружному краю ровною шовною полосой; вдоль этихъ шовныхъ полосъ пролегаетъ широкая черная бархатистость; остальная поверхность надкрылій совсѣмъ голая, съ двойнымъ пун-

киромъ: очень тонкимъ, частымъ и грубымъ, разбросаннымъ. У основания надкрылій два очень короткихъ вдавленія: одно плечевое, другое спинное; плечевое ребро у основанія ребристо-морщинисто, далѣе къ вершинѣ достаточно рѣдко, но грубо пунктировано. Краевая бѣлая полоса въ очень рѣдкихъ бѣлыхъ волоскахъ вершина надкрылій красноватая.

Ноги крѣпкія и толстые, красноватыя и только вершины члениковъ лапокъ темноватыя; густо покрыты бѣлыми прилегающими волосками.

Низъ тѣла черный, очень тонко пунктированъ, покрытъ скудною волосистостью.

♀. Въ  $1\frac{1}{2}$  раза крупнѣе ♂, съ сильно закругленно-расширенными надкрыльями, съ наибольшою шириной посерединѣ, съ едва достигающими середины надкрылій усиками. Бархатистая полоса, пролегающая вдоль шва, много шире, чѣмъ у ♂; такая же густая черная бархатистость имѣется и въ основаніи надкрылій; остальная поверхность надкрылій не гола, какъ у ♂, а покрыта густыми, темными волосками. Спинное вдавленіе достигаетъ середины надкрылій, плечевое почти достигаетъ вершины ихъ; плечевое вдавленіе въ основной половинѣ въ крупныхъ и частыхъ бугоркахъ и у самаго основания покрыто зачаточной бѣлой полоской. Плечевое ребро въ остальной половинѣ сильно морщинисто-буристо.

♂ дл. 12 мм., шир. 5 мм.; ♀ дл. 15 мм., шир. 7 мм.

Мукузанъ, удѣльное имѣніе Сигнахскаго уѣзда, Тифлиской губ., 11. IV. 1914 (К. Э. Демокидовъ!).

### *Dorcadion dobroviljanskii*, sp. n.

Опредѣляется легко при помощи приложенной таблички, по сравненію съ *D. scabricolle* Dalm.:

1 (2). Переднеспинка грубо и часто пунктирована, съ небольшими, тупыми, но крѣпкими боковыми шипами, направленными прямо въ сторону. Щитокъ маленький треугольный, на вершинѣ закругленный. Надкрылья густо-черно-бархатисты, съ шовной линейной бѣлой полосою, по краямъ ровною, и съ такою же плечевой, вдвое болѣе широкою; наружная краевая бѣлая полоса по внутреннему краю ровная, столь же широкая, какъ и шовная. Ноги красноватыя, лапки буро-красноватыя. Дл. ♂ 12—15 мм., шир. 4—5,5 мм. — Закавказье.

### *D. scabricolle* Dalm.

2 (1). Переднеспинка въ рѣдкомъ, но грубомъ пунктире, съ болѣе крѣпкими и болѣе острыми боковыми шипами, направленными

также прямо въ сторону. Щитокъ вдвое большій при тѣхъ же размѣрахъ жука, треугольный, на вершинѣ закругленный. Надкрылья между шовной и плечевой полосою совсѣмъ голы, очень тонко пунктированы, въ силу чего представляются нѣсколько матово-черными; шовная и плечевая бѣлые полосы по краямъ очень неровныя, въ очень скучныхъ волоскахъ, почти одинаковой ширины; наружная въ такихъ же рѣдкихъ бѣловатыхъ волоскахъ, по вну треннему краю неровная, какъ-бы изѣденная, у вершины сливающая съ плечевой. Всѣ ноги красноватыя. Дл. ♂ 12 мм., шир. 4,5 мм. — Эриванская губ.: сел. Куки.

*D. dobroviljanskii*, sp. n.

***Dorcadion goktshanum*, sp. n.**

*D. goktshanum*, sp. n., весьма схожъ съ *D. maljuzhenkoi* Рис, чѣмъ видно изъ прилагаемой таблички:

1 (2). Шипы переднеспинки значительно крѣпче, достаточно остры. Щитокъ съ замѣтно выпуклыми боковыми сторонами, съ совсѣмъ острою вершиною. Надкрылья ♂ коричнево-бархатистыя, на вершинѣ не имѣютъ бѣлой полосы; надкрылья ♀ свѣтло-сѣро-бархатистыя. ♂ дл. 12 мм., шир. 5 мм. — Кавказъ, Елизаветполь.

*D. maljuzhenkoi* Рис.

2 (1). Шипы переднеспинки маленькие, совсѣмъ тупые. Щитокъ съ прямолинейно сходящимися къ вершинѣ боковыми сторонами и на вершинѣ закругленный. Надкрылья всегда съ ясною, короткою, бѣлою полосой на вершинѣ; у обѣихъ половъ черно-бархатистыя. ♂ дл. 11 мм., шир. 4,5 мм.; ♀ дл. 15 мм., шир. 6 мм. — Озеро Гокча.

*D. goktshanum*, sp. n.

***Dorcadion armenum*, sp. n.**

Болѣе всего схожъ съ *D. sulcipenne* Кѣтз.

Лобъ и темя съ яснымъ продольнымъ килемъ; по обѣимъ сторонамъ киля на темени широкія коричневато-бархатистыя полосы.

Переднеспинка поперечная, почти квадратная, съ короткими, тупыми, но очень крѣпкими боковыми шипами; срединная бѣлая полоса широкая, по обѣимъ сторонамъ ея расположены очень широкія коричневато бархатистыя полосы, боковыя стороны ея не покрыты бархатистымъ покровомъ, скучно волосисты и тонко пунктированы.

Щитокъ треугольный, на вершинѣ закругленный; поверхность его вдавлена.

Надкрылья коричневато-бархатистыя, съ узкою, линейною, бѣлою шовною полосой; вдоль этой полосы пролегаетъ густая, широкая, коричневато-бархатистая полоса. Надкрылья съ двумя ясными продольными вдавленіями: плечевымъ, достигающимъ почти вершины надкрылій, и спиннымъ, доходящимъ до половины ихъ.

Ноги крѣпкія, толстые, красноватыя, покрытыя тонкими, достаточно длинными, прилегающими волосками.

♂ дл. 12 мм., шир. 5 мм.

Закавказье: озеро Гокча, VI. 1902 (Елачичъ!).

*Dorcadion borodini*, sp. n.

1-й и 2-ой членики усиковъ совсѣмъ красные, 3-ій и 4-ый на вершинѣ черноваты, остальные буроваты; 1-ый по длини равенъ 2-ому и 3-ему, взятымъ вмѣстѣ.

Переднеспинка поперечная, въ 1 $\frac{1}{2}$  раза шире своей длины, съ короткими, но крѣпкими боковыми шипами, съ широкою срединою бѣлою полосой и съ очень широкими боковыми бѣлыми полосами.

Надкрылья съ правильно закругленными плечами, съ боковыми сторонами, постепенно расширяющимися до средины и также постепенно суживающимися къ вершинѣ. Плечевая бѣлая полоса очень широкая, почти въ четыре раза шире основной полосы; спинная полоса у основанія надкрылій соединяется съ плечевой полосою, втрое уже ея и не достигаетъ вершины надкрылій; шовная полоса на вершинѣ соединяется съ плечевой.

Всѣ ноги сплошь красныя, только основанія члениковъ лапокъ темноваты.

♂ дл. 10,5 мм., шир. 3,5 мм.

Ставропольская губ.: станица Прасковея (Д. Н. Бородинъ!).

*Dorcadion karsense*, sp. n.

Лобъ густо покрытъ буровато-бѣлыми, прилегающими волосками; чрезъ весь лобъ, темя и средину переднеспинки пролегаетъ тонкая срединная борозда; по сторонамъ продольной борозды темени пролегаютъ широкія коричневато-бархатистыя полосы; остальная поверхность темени въ густыхъ буровато-бѣлыхъ, прилегающихъ волоскахъ. Усики толстые, крѣпкіе, не достигающіе вершины надкрылій на  $\frac{1}{3}$  ихъ длины; 1-ый членикъ красноватый, очень толстый, по длини равный длини послѣдующихъ двухъ; остальные членики совсѣмъ черные.

Переднеспинка поперечная, почти квадратная; поверхность ея съ двумя широкими, коричневато-бархатистыми полосами, служащими продолженіемъ бархатистыхъ полосъ темени; остальная поверхность

въ густыхъ буровато-бѣлыхъ волоскахъ. Шипы крѣпкіе, достаточно острые, направленные прямо въ стороны.

Надкрылья овальныя, съ наибольшею шириной посерединѣ, сильно выпуклые, съ двумя широкими плечевыми и спинными буровато-бѣлыми полосами, сливающимися между собою у основания и на вершинѣ надкрылій; шовная полоса достаточно широкая, по наружному краю неровная, вдвое уже спинной и плечевой полосъ, которая почти одной и той же ширины; краевая буровато-бѣлая полоса очень широкая, покрывающая всю подогнутую часть надкрылій.

Ноги очень крѣпкія, толстые, красноватыя, густо одѣты буровато-бѣлыми прилегающими волосками.

♂ дл. 12 мм., ширина 5 мм.

Окрестности крѣпости Карса.

### *Dorcadiion scabricolle elisabethpolicum*, subsp. n.

Этотъ подвидъ — локальная форма, водящаяся въ окр. Елисаветполя. Отличается отъ типичнаго *D. scabricolle* Dal m. меньшей величиной, болѣе широкими бѣлыми полосами надкрылій и двумя короткими бѣлыми полосками у ихъ основания, которыхъ у типичнаго *scabricolle* Dal m. совсѣмъ нѣтъ или онѣ представлены зачаточными точками.

*D. scabricolle* Dal m.: ♂ дл. 10—16 мм., шир. 3,5—5 мм.

*D. scabricolle elisabethpolicum* Suvor: ♂ дл. 10—13 мм., шир. 3,5—4 мм.

### *Dorcadiion euxinum*, sp. n.

♂. Лобъ сильно выпуклый, грубо, но рѣдко пунктированный; темя плоское, съ срединною бѣлою полосой и съ двумя коричнево-бархатистыми пятнами по ея сторонамъ; чрезъ весь лобъ и темя пролегаетъ тонкая борозда. Усики достаточно толстые, едва достигающіе середины надкрылій, черные, 1-ый членикъ по длини почти равенъ 3-му.

Переднеспинка поперечная, почти квадратная, сильно выпуклая, съ срединною бѣлою полосой, достаточно грубо, но рѣдко пунктированная, съ небольшими, тупыми, но очень крѣпкими въ основаніи боковыми шипами, направленными прямо въ стороны. Щитокъ нормально треугольный, на вершинѣ закругленный; покрытъ бѣлыми прилегающими волосками.

Надкрылья достаточно выпуклы, съ круто закругленными плечами, съ боковыми сторонами параллельными до средины, далѣе постепенно съуживающимися къ вершинѣ, съ широкимъ и правильнымъ вершиннымъ закругленіемъ; густо-черновато-бархатистыя. Пле-

чевая бѣлая полоса широкая, по внутреннему краю неровная, въ основной половинѣ въ мелкихъ густо-черныхъ бархатистыхъ пятнахъ; спинная вдвое ужѣ плечевой, передъ вершиною съ нею сливающаяся, покрытая въ основной половинѣ черно-бархатистыми пятнами; шовная бѣлая полоса втрое ужѣ плечевой, линейная, по наружному краю ровная; краевая бѣлая полоса очень широкая, по внутреннему краю ровная, въ основной половинѣ въ мелкихъ бархатисто-черныхъ пятнахъ.

Ноги достаточно крѣпкія и толстые, красноватыя, въ густыхъ бѣлыхъ прилегающихъ волоскахъ.

♂ дл. 11,5 мм., шир. 4 мм.

Новороссійскъ, V. 1909 (Н. Н. Богдановъ - Катьковъ!).

*Dorcadion daratshitshagi*, sp. n.

Весьма схожъ съ предыдущимъ видомъ; отличія видны изъ слѣдующей таблички:

1 (2). Основаніе переднеспинки по ширинѣ замѣтно много меньше основанія надкрылій; отъ прямоугольныхъ плечевыхъ закругленій, боковыя стороны надкрылій до средины параллельны; спинная бѣлая полоса въ густыхъ бархатисто-черныхъ пятнахъ; бархатистость надкрылій черновата; ноги красноваты.

*D. euxinum*, sp. n.

2 (1). Основаніе переднеспинки по ширинѣ равно ширинѣ основанія надкрылій; боковыя стороны надкрылій отъ ихъ основанія, правильно закругляясь, имѣютъ наибольшую ширину посерединѣ; спинная бѣлая полоса пятенъ не имѣетъ; бархатистость надкрылій свѣтло-коричневая; ноги еще болѣе красныя. ♂ дл. 11 мм., шир. 4 мм.

Эриванская губ.: Дарачичагъ (Д. М. Малюженко!).

*D. daratshitshagi*, sp. n.

*Dorcadion kagyzmanicum*, sp. n.

Лобъ достаточно выпуклый, въ густыхъ желтоватыхъ волоскахъ. Темя въ такихъ же желтоватыхъ волоскахъ, съ двумя свѣтло-коричневато-бархатистыми пятнами. Усики по длини достигаютъ  $\frac{2}{3}$  длины надкрылій; 1-ый ихъ членникъ красноватый, остальные буроватые.

Переднеспинка совсѣмъ квадратная, сильно выпуклая, передній и задній края прямо обрѣзаны; съ короткими, тупыми, но крѣпкими въ основаніи боковыми шипами; густо покрыта свѣтло-коричневатою бархатистостью, съ широкою бѣлою полосой.

Щитокъ большой, треугольный, на вершинѣ острый, густо покрытый желтовато-бѣлыми волосками.

Надкрылья овальныя, слабо выпуклые, съ правильно закругленными плечами, съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки,

съ наибольшею шириной посерединѣ. Поверхность въ густомъ свѣтло-коричневатомъ бархатистомъ покровѣ, съ широкою, линейною шовною полосой, вдоль которой пролегаетъ густая темно-коричневатая бархатистая полоса, пропадающая у вершины.

Ноги достаточно крѣпкія, красноватыя; густо покрыты тонкими бѣлыми прилегающими волосками.

♂ дл. 11 мм., шир. 3,8 мм.

Карсская обл.: Кагызманъ.

У всѣхъ видовъ *Compsodorcadios* группы *C. cephalotes* B. Jak. усики черные. Различаются они слѣдующимъ образомъ:

1 (4). Шипы переднестинки острые, очень длинные, направленные прямо въ стороны.

2 (3). Плечевая бѣлая полоса надкрылій очень широкая, по внутреннему краю ровная; спинная состоитъ изъ ряда удлиненныхъ бѣлыхъ полосокъ. Усики почти достигаютъ вершины надкрылій.  
♂ дл. 23 мм., шир. 7,5 мм.

Балхашъ, IV. 1886 (А. М. Никольскій).

***C. cephalotes* B. Jak.**

3 (2). Плечевая бѣлая полоса надкрылій еще шире, спинная отсутствуетъ. Усики много короче, кончаясь на  $\frac{2}{3}$  длины надкрылій.  
♂ дл. 23 мм., шир. 8,2 мм.

Тургайская обл.: Калмакъ, 12. V. 1912 (колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

***C. turgaicum*, sp. n.**

4 (1). Шипы переднеспинки много короче, но очень крѣпкие въ основаніи. Усики длинные, едва не достигающіе вершины надкрылій.

5 (6). Плечевая бѣлая полоса надкрылій очень широкая, по краю ровная; спинная состоитъ изъ ряда достаточно крупныхъ, бѣлыхъ пятенъ. За плечевыми закругленіями надкрылья не сдавлены.  
♂ дл. 21 мм., шир. 7 мм.

Алтай: Чарь-Чурбану, сел. Таубинское, 22. V. 1910 (А. Г. Яковсонъ!).

***C. alexii*, sp. n.**

6 (5). Плечевая бѣлая полоса надкрылій состоитъ только изъ ряда маленькихъ бѣлыхъ пятенъ; только у вершины надкрылій эти пятна сливаются въ довольно короткую бѣлую полосу; спинная бѣлая полоса совсѣмъ отсутствуетъ. Шипы переднеспинки много длиннѣ и острѣ, чѣмъ у предыдущаго вида; за плечевыми закругленіями надкрылья сильно сдавлены. ♂ дл. 21 мм., шир. 7 мм.

Акмолинская обл.: озеро Улу-Куль, 21. V. 1912 (Мальцевъ!).

***C. akmolicum*, sp. n.**