

179

20. Febr. 1905

Deutsche
Entomologische Zeitschrift

herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft

in Verbindung mit dem

Deutschen Entomologischen National-Museum.

Jahrgang 1905.

Erstes und zweites Heft

ausgegeben Februar und September 1905.

Preis für Nichtmitglieder der Gesellschaft: 20 Mark.

Mit einer Beilage:

Dr. W. Horn: Systematischer Index der Cicindeliden.

Preis für Nichtmitglieder der Gesellschaft: 3 Mark.

Redakteure: Prof. Dr. G. Kraatz und J. Weise.

London.

O. E. Janson,

24 Great Russel Str.

Berlin 1905.

Nicolaische Verlags-

Buchhandlung R. Stricker.

Paris.

P. Klincksieck,

52 Rue des Écoles.

U. 4173

Продолжение № 1.

Für den Inhalt der in dieser Zeitschrift veröffentlichten
Aufsätze sind die Herren Autoren allein verantwortlich, die
Deutsche Entomologische Gesellschaft ist es in keiner Weise.

D. Red.

Index
Allgem
-
Das De
-
Berhan
- Neue
- Neue
Gabriel
- Admi
Gebien
Gerhard
der Gr
- Nebe
- In Em
- In An
Händlir
Hartman
- Ein ne
v. Haupt
Heller, L
Hintz, E
- Clie
- Laend
Horn, Dr
von Vo
- Pagan
- Zwei
- Die Ga
- Zur Be
Hintz
- Eine
*) H
Septembe

Deutsche
Entomologische Zeitschrift

herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft

in Verbindung mit dem

Deutschen Entomologischen National-Museum.

Jahrgang 1905.

Erstes Heft (S. 9—176)

ausgegeben Februar 1905.

Preis für Nichtmitglieder des Vereins: 10 Mark.

Redacteurs: Dr. G. Kraatz und J. Weise.

London.	Berlin 1905.	Paris.
O. E. Janson, 24 Great Russel Str.	Nicolaische Verlags- Buchhandlung R. Stricker.	P. Klincksieck, 52 Rue des Écoles.

Deutsche Entomologische Gesellschaft.

49

Inhalts-Uebersicht des Jahrgangs 1905, Heft I,
der Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

	Seite
Allgemeine Angelegenheiten. I	172—173
Das Deutsche Entomologische National-Museum	170—171
Bernbauer, Dr. M.: Neue exotische Staphyliniden	9—21
Gabriel-Neifse: Drei neue Varietäten	141—142
— <i>Adonia variegata</i> Goeze var. <i>macrostigma</i>	142
Gebien, H.: Bemerkungen zu Klug's: Insekten Madagaskars	22—23
Handlirsch, A.: Nekrolog für Dr. Friedrich Moritz Brauer	173—174
v. Haupt: Nekrolog für Georg Maximilian von Hopffgarten	174—176
Heller, Dr. K. M.: Zehn neue Käfer aus Neu-Guinea	65—76
Horn, Dr. med. W.: Ein zweiter Beitrag zur Cicindeliden-Fauna von Vorder-Indien (incl. Ceylon)	59—64
— <i>Pogonostoma septentrionale</i> Fleut. subsp. <i>simplex</i> (nov. var.).	64
— Zwei neue Ostafrika-Cicindeliden	143—144
— Die Gattungen <i>Oxygonia</i> und <i>Odontochila</i>	145—149
— Zur Kenntnis der Cicindeliden-Fauna von Kamerun und seiner Hinterländer. II.	150—152
— Eine neue <i>Derocrania</i> (<i>Tricondyla</i>) aus Vorder-Indien	152
— Ueber die Verwandtschaft der <i>Cicindela</i> -Formen: <i>hybrida</i> L., <i>songorica</i> Mannerh., <i>transbaicalica</i> Motsch., <i>Przevalskii</i> Dokht. und <i>tricolor</i> Ad.	153—158
— Die Gattung <i>Megacephala</i>	159
— <i>Cicindela excisilabris</i> (nov. spec.)	160
Hubenthal, W.: <i>Phryganophilus ruficollis</i> F. var. nov. <i>Rosti</i> aus Japan	57—58
Koltze, W.: Bestand der Coleopteren-Sammlung von W. Koltze in Hamburg im Juni 1904	55—56
Ohaus, Dr. Fr.: Beiträge zur Kenntnis der Ruteliden	81—99
Weise, J.: Neue afrikanische Chrysomeliden und Coccinelliden	33—54
— Ueber die Gattung <i>Sigrisma</i> Fairm.	54
— Ueber <i>Balyana</i> Pér.	56
— Synonymische Bemerkung	58
— Chrysomeliden aus Yola	77—80
— <i>Asbecesta laeta</i> aus Westafrika	80
— <i>Protorina plagiata</i> var. <i>croatica</i> Ws.	80
— Zweites Verzeichnis der Hispinen und Cassidinen aus Vorder- Indien	113—129
— Aufzählung mexicanischer Hispinen	130—135
— <i>Tetropium Gabrieli</i> Weise n. sp.	136
— Ueber Coccinellen	137—138
— Coccinelliden aus Erythraea	139—140
— <i>Chilocorus Reinecki</i>	140

(Fortsetzung der Inhalts-Uebersicht auf der dritten Seite des Umschlags.)

Ento

Deuts

Deuts

Ums. 4173

Preis

Dr. W.

Preis

Redakte

London.

O. E. Janson

24 Great Russell S

Drei neue Varietäten

beschrieben von Gabriel-Neifse.

1. *Adalia bipunctata* L. var. *similata* n.

Im Anfang September 1903 hatte ich das Glück, auf Schloß Wernfels die Gastfreundschaft meines alten lieben Freundes und Kriegskameraden, des Professors Louis Braun München und seiner lebenswürdigen Familie genießen zu dürfen. Schloß Wernfels liegt im Hügellande Mittelfrankens in der Nähe des Städtchens Spalt auf vorspringender Bergnase, umgeben von Obst- und Hopfengärten.

Da meine lieben Wirte meiner Sammlertätigkeit alle Teilnahme widmeten, wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, daß sich zwischen den großen Fenstern des Schlosses und deren Rahmen Käfer angesiedelt haben. Als ich nachsah, fand ich eine zu Tausenden zählende Menge der *Adalia bipunctata* L., die sich hier, obgleich sonniges und sehr warmes Wetter herrschte, anscheinend schon zur Winterruhe in dichten Massen festgesetzt hatten.

Eine willkommene Gelegenheit für mich, die Varietäten dieses Tieres zu sammeln. Ich fand außer den häufigen Formen *bipunctata* L. und *semirubra* Ws. noch var. *Herbsti* Ws., *perforata* Marsh., *6-punctata* L., *4-maculata* Scop., *marginata* Rossi und 2 Stück, welche in den Weiseschen 1885 erschienenen Bestimmungstabellen der Coccinelliden nicht beschrieben sind. Das eine Stück ist eine Uebergangsform der var. *pantherina* L. zu der weiter unten beschriebenen var. *similata*. Bei ersterem ist die hintere Hälfte der Flügeldecken schwarz mit je drei roten Makeln, einer runden hinter der Mitte, einer länglichen am Seitenrande und einer dritten, welche die Spitze einnimmt. Das Schildchen ist dunkel, neben ihm zwei kurze dunkle Strichel. Aus der Mitte der schwarzen Querbinde entspringt auf jeder Flügeldecke eine kurze, breite, vorn geteilte schwarze Längslinie, mit der Richtung auf die Basis zu; sie erreicht mit der vorderen Aufsenecke die Schulter; die innere ist nach dem Schildchen hin gerichtet, ohne es zu erreichen. Bei dem zweiten Stück, welches ich *similata* nenne, überdecken die von der Mitte der schwarzen Querbinde nach vorn ziehenden breiten schwarzen Längslinien mit der äußeren Ecke die Schulter und erreichen die Basis der Flügeldecken. Die inneren Ecken erweitern sich gegen die Naht hin. Es entsteht so eine Zeichnung, welche das Tier einer *Coccinella 10-punctata* L. v. *10-pustulata* L.

äußerst ähnlich macht. Die Flgd. des Tieres sind schwarz und zeigen 5 rothe Makeln: 1 mondformig, am Seitenrande unterhalb der Schulter; 2 mondformig, innerhalb der Schulter, die konvexe Seite nach außen (die der linken Flügeldecke ist in der Mitte schmal unterbrochen); 3 halbrund am Seitenrande, hinter der Mitte; 4 in gleicher Höhe mit 3, neben der Naht; 5 die Spitze einnehmend. 1, 3 und 5 sind durch den roten Seitensaum miteinander verbunden.

2. *Micraspis 16-punctata* L. var. *primita* m.

Diese Varietät ist von Weise in seinen Bestimmungstabellen ebenfalls nicht erwähnt. Sein Punkt 4 der Flügeldecken ist hier vollständig in zwei Punkte aufgelöst. Jede Flügeldecke zeigt neun schwarze Punkte: 1, 2, 1, 2, 2, 1. Die Punkte 2 und 7 sind durch eine feine schwarze Linie verbunden, welche zwischen Punkt 4 und 5 hindurchläuft, ohne dieselben zu berühren.

3. *Podabrus alpinus* Payk. var. *ruficeps* m.

Das Tier unterscheidet sich von der Stammform sehr wesentlich durch den ganz roten Kopf und seine Farbe, welche nicht den gelbbraunlichen Ton zeigt, sondern ausgesprochen rot ist, ähnlich wie bei *Cantharis Erichsoni*.

Das Tier ist rot. Flügeldecken schwarz; nur am Seitenrande von der Basis bis zur Mitte schmal rot gesäumt. Hinterbrust und Abdomen schwarz; letzteres mit breitem rotem Seitenrande und hellen Segmenträndern. Tarsen sind dunkel.

Ein ♀ Stück wurde im Juni 1902 in Finkenkrug bei Berlin gefangen. Ein zweites ebenso gefärbtes Stück, dessen Hinterkopf nur sehr schwach angedunkelt ist, sah ich in der Sammlung des Hrn. Reitter in Paskau. Es stammt aus den Beskiden.

Adonia variegata Goeze var. *macrostigma*.

Die Punkte 3 und 5 beider Flügeldecken sind unter sich, mit der Naht und dem gemeinschaftlichen Flecke am Schildchen zu einer großen fünfeckigen, gemeinsamen schwarzen Makel vereint, welche jederseits zwischen Punkt 3 und 5 eingeschnürt und vorn geradlinig bis zum Schildchen verengt ist. Ihr Hinterrand ist neben der Naht auf jeder Decke in einem Bogen ausgeschweift. Punkt 1 und 2 fehlen.

(Schema der Punkte nach Weise's Bestimmungstabellen.)

Ich fing diese schöne Varietät Anfang Oktober 1904 am Strande der Insel Vilm bei Rügen.

Gabriel.

Deutsche

Zwei

Ci

Bennigsen P
longiore, dentibus
eriditer grossius
subtilis sed aequ
non rotundato se
juncto-marginali m
extrema apicali e
lambdam brevissim
ibus emittente et
stricto; prosteron
lateraliter sparsim
brunnescentibus,
laete cyprascen
tis lateraliter cypr
et metasterni et
supra 3 maragd
elytris inter nar
palpis naxillaribus
♂♂: Ueber
(a Prof
Das einzige
hat das 7. bis 1
genug 3 Mitt
Die Art ist
dals der system
nicht ganz so
Gattungen, we
Charaktere hi
schriebene Ar
sogenannten
collis Boh.)
Gleichzeitig