

179

20. Febr. 1905

Deutsche
Entomologische Zeitschrift

herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft

in Verbindung mit dem

Deutschen Entomologischen National-Museum.

Jahrgang 1905.

Erstes und zweites Heft

ausgegeben Februar und September 1905.

Preis für Nichtmitglieder der Gesellschaft: 20 Mark.

Mit einer Beilage:

Dr. W. Horn: Systematischer Index der Cicindeliden.

Preis für Nichtmitglieder der Gesellschaft: 3 Mark.

Redakteure: Prof. Dr. G. Kraatz und J. Weise.

London.

O. E. Janson,

24 Great Russel Str.

Berlin 1905.

Nicolaische Verlags-

Buchhandlung R. Stricker.

Paris.

P. Klincksieck,

52 Rue des Écoles.

U. 4173

Продолжение № 1.

Für den Inhalt der in dieser Zeitschrift veröffentlichten Aufsätze sind die Herren Autoren allein verantwortlich, die Deutsche Entomologische Gesellschaft ist es in keiner Weise.

D. Red.

Index
Allgem
-
Das De
-
Berhan
- Neue
- Neue
Gabriel
- Admi
Gebien
Gerhard
der Gr
- Nebe
- In Em
- In An
Händlir
Hartman
- Ein ne
v. Haupt
Heller, L
Hintz, E
- Clie
- Laend
Horn, Dr
von Vo
- Pagan
- Zwei
- Die Ga
- Zur Be
Hintz
- Eine
*) H
Septembe

Deutsche
Entomologische Zeitschrift

herausgegeben

von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft

in Verbindung mit dem

Deutschen Entomologischen National-Museum.

Jahrgang 1905.

Erstes Heft (S. 9—176)

ausgegeben Februar 1905.

Preis für Nichtmitglieder des Vereins: 10 Mark.

Redacteurs: Dr. G. Kraatz und J. Weise.

London.	Berlin 1905.	Paris.
O. E. Janson, 24 Great Russel Str.	Nicolaische Verlags- Buchhandlung R. Stricker.	P. Klincksieck, 52 Rue des Écoles.

Deutsche Entomologische Gesellschaft.

49

Inhalts-Uebersicht des Jahrgangs 1905, Heft I,
der Deutschen Entomologischen Zeitschrift.

	Seite
Allgemeine Angelegenheiten. I	172—173
Das Deutsche Entomologische National-Museum	170—171
Bernbauer, Dr. M.: Neue exotische Staphyliniden	9—21
Gabriel-Neifse: Drei neue Varietäten	141—142
— <i>Adonia variegata</i> Goeze var. <i>macrostigma</i>	142
Gebien, H.: Bemerkungen zu Klug's: Insekten Madagaskars	22—23
Handlirsch, A.: Nekrolog für Dr. Friedrich Moritz Brauer	173—174
v. Haupt: Nekrolog für Georg Maximilian von Hopffgarten	174—176
Heller, Dr. K. M.: Zehn neue Käfer aus Neu-Guinea	65—76
Horn, Dr. med. W.: Ein zweiter Beitrag zur Cicindeliden-Fauna von Vorder-Indien (incl. Ceylon)	59—64
— <i>Pogonostoma septentrionale</i> Fleut. subsp. <i>simplex</i> (nov. var.)	64
— Zwei neue Ostafrika-Cicindeliden	143—144
— Die Gattungen <i>Oxygonia</i> und <i>Odontochila</i>	145—149
— Zur Kenntnis der Cicindeliden-Fauna von Kamerun und seiner Hinterländer. II.	150—152
— Eine neue <i>Derocrania</i> (<i>Tricondyla</i>) aus Vorder-Indien	152
— Ueber die Verwandtschaft der <i>Cicindela</i> -Formen: <i>hybrida</i> L., <i>songorica</i> Mannerh., <i>transbaicalica</i> Motsch., <i>Przevalskii</i> Dokht. und <i>tricolor</i> Ad.	153—158
— Die Gattung <i>Megacephala</i>	159
— <i>Cicindela excisilabris</i> (nov. spec.)	160
Hubenthal, W.: <i>Phryganophilus ruficollis</i> F. var. nov. <i>Rosti</i> aus Japan	57—58
Koltze, W.: Bestand der Coleopteren-Sammlung von W. Koltze in Hamburg im Juni 1904	55—56
Ohaus, Dr. Fr.: Beiträge zur Kenntnis der Ruteliden	81—99
Weise, J.: Neue afrikanische Chrysomeliden und Coccinelliden	33—54
— Ueber die Gattung <i>Sigrisma</i> Fairm.	54
— Ueber <i>Balyana</i> Pér.	56
— Synonymische Bemerkung	58
— Chrysomeliden aus Yola	77—80
— <i>Asbecesta laeta</i> aus Westafrika	80
— <i>Protorina plagiata</i> var. <i>croatica</i> Ws.	80
— Zweites Verzeichnis der Hispinen und Cassidinen aus Vorder- Indien	113—129
— Aufzählung mexicanischer Hispinen	130—135
— <i>Tetropium Gabrieli</i> Weise n. sp.	136
— Ueber Coccinellen	137—138
— Coccinelliden aus Erythraea	139—140
— <i>Chilocorus Reinecki</i>	140

(Fortsetzung der Inhalts-Uebersicht auf der dritten Seite des Umschlags.)

Ento

Deuts

Deuts

Ums. 4173

Preis

Dr. W.

Preis

Redakte

London.
O. E. Janson
24 Great Russell S

äußerst ähnlich macht. Die Flgd. des Tieres sind schwarz und zeigen 5 rothe Makeln: 1 mondformig, am Seitenrande unterhalb der Schulter; 2 mondformig, innerhalb der Schulter, die konvexe Seite nach außen (die der linken Flügeldecke ist in der Mitte schmal unterbrochen); 3 halbrund am Seitenrande, hinter der Mitte; 4 in gleicher Höhe mit 3, neben der Naht; 5 die Spitze einnehmend. 1, 3 und 5 sind durch den roten Seitensaum miteinander verbunden.

2. *Micraspis 16-punctata* L. var. *primita* m.

Diese Varietät ist von Weise in seinen Bestimmungstabellen ebenfalls nicht erwähnt. Sein Punkt 4 der Flügeldecken ist hier vollständig in zwei Punkte aufgelöst. Jede Flügeldecke zeigt neun schwarze Punkte: 1, 2, 1, 2, 2, 1. Die Punkte 2 und 7 sind durch eine feine schwarze Linie verbunden, welche zwischen Punkt 4 und 5 hindurchläuft, ohne dieselben zu berühren.

3. *Podabrus alpinus* Payk. var. *ruficeps* m.

Das Tier unterscheidet sich von der Stammform sehr wesentlich durch den ganz roten Kopf und seine Farbe, welche nicht den gelbbraunlichen Ton zeigt, sondern ausgesprochen rot ist, ähnlich wie bei *Cantharis Erichsoni*.

Das Tier ist rot. Flügeldecken schwarz; nur am Seitenrande von der Basis bis zur Mitte schmal rot gesäumt. Hinterbrust und Abdomen schwarz; letzteres mit breitem rotem Seitenrande und hellen Segmenträndern. Tarsen sind dunkel.

Ein ♀ Stück wurde im Juni 1902 in Finkenkrug bei Berlin gefangen. Ein zweites ebenso gefärbtes Stück, dessen Hinterkopf nur sehr schwach angedunkelt ist, sah ich in der Sammlung des Hrn. Reitter in Paskau. Es stammt aus den Beskiden.

Adonia variegata Goeze var. *macrostigma*.

Die Punkte 3 und 5 beider Flügeldecken sind unter sich, mit der Naht und dem gemeinschaftlichen Flecke am Schildchen zu einer großen fünfeckigen, gemeinsamen schwarzen Makel vereint, welche jederseits zwischen Punkt 3 und 5 eingeschnürt und vorn geradlinig bis zum Schildchen verengt ist. Ihr Hinterrand ist neben der Naht auf jeder Decke in einem Bogen ausgeschweift. Punkt 1 und 2 fehlen.

(Schema der Punkte nach Weise's Bestimmungstabellen.)

Ich fing diese schöne Varietät Anfang Oktober 1904 am Strande der Insel Vilm bei Rügen.

Gabriel.

Deutsche

Zwei

Ci

Bennigsen P
longiore, dentibus
eriditer grossius
subtilis sed aequ
non rotundato se
juncto-marginali m
extrema apicali e
lambdam brevissim
ibus emittente et
stricto; prosteron
lateraliter sparsim
brunnescentibus, a
laete cyprascen
tis lateraliter cypr
et metasterni et
supra 3 maragd
elytris inter mar
palpis nuchillarib
♂♂: Ueber
(a Prof
Das einzige
hat das 7. bis 1
genug 3 Mitt
Die Art ist
dals der system
nicht ganz so
Gattungen, we
Charaktere hi
schriebene Art
sogenannten
collis Boh.)
Gleichzeitig