

Deutsche
Entomologische Zeitschrift.

Herausgegeben von der
Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

— Jahrgang 1913.

Heft V.

(Mit 40 Textfiguren.)

Preis für Nichtmitglieder Mk. 3.50.

Redaktionskommission:


Dr. Fr. Ohaus.

Prof. Dr. R. Heymons. Dr. K. Grünberg.

P. Kuhn t.

Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker
Berlin W 57, Potsdamer Straße 90.

Berlin, 30. September 1913.



Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1913.

(Heft I: 31. Januar, Heft II: 31. März, Heft III: 31. Mai, Heft IV: 31. Juli
Heft V: 30. September, Heft VI: 30. November; Beiheft: 15. Dezember.)

Allgemeines.

	Seite
Mitgliederliste	I
Verzeichnis der Gesellschaften, wissenschaftlichen An- stalten usw., deren Veröffentlichungen wir erhalten.	XVIII
Vereinsangelegenheiten	94, 218
Aus den Sitzungen	95, 219, 337, 472, 581, 715
Aus der entomologischen Welt	101, 226, 343, 474, 581, 721
Oblata und Desiderata	112, 226, 348, 484, 597, 727
Vorgeschlagene Mitglieder.	114, 238, 350, 486, 600, 730, Beiheft 234

Rezensionen und Referate.

Aulmann, G., Psyllidarum Catalogus	230
Blunck, H., Das Geschlechtsleben von <i>Dytiscus marginalis</i> L. I. Teil. Die Begattung	106
— II. Teil. Die Eiablage	228
Ducke, A., Révision des Guêpes sociales polygames d'Amérique	724
Escherich, K., Die angewandte Entomologie in den Vereinigten Staaten	233
Heller, K. M., Philippinische Rüsselkäfer	476
— Neue papuanische Leptopsiden	588
Hesse, R., Abstammungslehre und Darwinismus	111
Jacobi, A., Mimikry und verwandte Erscheinungen	345
Jensen-Haarup, A. C., Taeger	231
Kammerer, K., Das Terrarium und Insektarium	111
Krancher, O., Entomologisches Jahrbuch 1913	591
Lindinger, L., Die Schildläuse (<i>Coccidae</i>) Europas, Nord-Afrikas und Vorder-Asiens, einschliesslich der Azoren, Kanaren und Madeiras	347
Mense, C., Handbuch der Tropenkrankheiten	592
Morley, Cl., A revision of the Ichneumonidae, based upon the collection of the British Museum	346
Müller, J. und Valle, A., Resoconto della Sezione entomologica della società Adriatica di scienze naturali in Trieste	103
Nüfslin, O., Leitfaden der Forstinsektenkunde	232
Rosen, R., Brutpflege und Elternfürsorge	110
Schröder, Chr. und Deegener, P., Handbuch der Entomologie.	589
Schulze, P., Chitin und andere Cuticularstrukturen bei Insekten — Studien über tierische Körper der Carotingruppe	582 584
Seidlitz, G. v., Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1910	108
— Derselbe für 1911.	589
Seitz, A., Die Grossschmetterlinge der Erde. Bd. I. Die palä- arktischen Tagfalter.	587
— Dasselbe. Bd. II. Die paläarktischen Spinner und Schwärmer	478

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 353. <i>Agromyza nigripes</i> Mg. | 363. <i>Physocephala pusilla</i> Mg. |
| 354. — <i>pusilla</i> Mg. | 364. — <i>truncata</i> Löw. |
| 355. — <i>Schineri</i> Giraud. | 365. — <i>vittata</i> Fabr. |
| 356. — <i>scutellata</i> Fall. | 366. <i>Ocemyia atra</i> Fabr. |
| 357. <i>Rhynoessa albosetulosa</i> Strobl. | 367. — <i>distincta</i> Mg. |
| 358. — <i>cinerella</i> Halid. | 368. — <i>melanopa</i> Rond. |
| 359. <i>Conops insignis</i> Löw. | 369. — <i>pusilla</i> Mg. |
| 360. — <i>signatus</i> Mg. | 370. <i>Melanosoma bicolor</i> Mg. |
| 361. — <i>silaceus</i> Mg. | 371. <i>Sicus ferrugineus</i> L. |
| 362. <i>Physocephala chrysorhoea</i>
Megerle. | |

Eine neue Form von *Coccinella quinquepunctata* L.
(Col.)

Von Theodor Jänichen, Berlin.

Mit 1 Textfigur.

Die Abhandlung des Herrn Schirmer auf S. 317 im 3. Hefte der D. E. Z. von 1913 machte mich darauf aufmerksam, daß sich in meiner Sammlung 1 Stück von *Cocc. 5-punctata* befindet, welches ich vor einer Reihe von Jahren auf dem Friedhofe des Dorfes Rädcl bei Kloster Lehnin gefangen hatte, und welches sich zwischen Nr. 8 und 9 der 10 Textfiguren obengenannter Abhandlung leicht einreihen läßt.



Die größeren runden Flecken in der Mitte neben der Naht haben sich vereinigt und zu einer herzförmigen Zeichnung entwickelt. Die obere Einsenkung der Herzform steht mit dem Schildchenfleck flammenartig in Verbindung. Der Seitenfleck hinter der Mitte, sowie ein zweiter Seitenfleck vor der Mitte einer jeden Flügeldecke zeigen die Form von Kommata.

Die beigegebene Zeichnung läßt sofort erkennen, daß durch wenige Verbindungsbogen die Varietät *Elberti* Flach entsteht. Herr Schirmer, an welchen ich eine Mitteilung und Skizze der Varietät schickte, nennt dieselbe in seinem Dankschreiben vorläufig *marchica*, ich ziehe aber vor, ihr wegen der schönen Zeichnung den Namen

Coccinella quinquepunctata L. var. nov. *cordia*
zu geben.