

64

# РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновыимъ, Н. Р. Конуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновыимъ-  
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринимъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ.

ИЗДАВАЕМОЕ  
Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

## Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky,  
N. Shiriajev et T. Tshitsherin †.

PUBLIÉE PAR  
la Société Entomologique de Russie.

T. VII. 1907.



С.-Петербургъ — St-Pétersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Изд. п., 7 рота, 26).

1908.

225547

# РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Кокуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ  
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ.

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

## Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov Tjan-Shansky,  
N. Shiriajev et T. Tschitscherin †.

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie

1907.

T. VII. № 1.



С.-Петербургъ — St-Pétersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Вознесенскій просп., 3).

1907.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

### I. ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА:

Извлечение изъ протокола общихъ собраний Русского Энтомологического Общества за 1907 г. . . . .

I

### II. ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ:

**И. Я. Шевыревъ,** Къ исторіи развиція *Theronia atlantae* Pod a (*flavieana* auct.) (Hymenoptera, Ichneumonidae). . . . .

1

**Г. Якобсонъ,** *Donacia semenovi*, sp. nov. (Coleoptera, Chrysomelidae). . . . .

5

**Никита Кокуевъ,** Новый видъ изъ рода *Theronia* Holmgren (Hymenoptera, Ichneumonidae). . . . .

7

**Л. Круликовскій,** Замѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1906 г. въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. . . . .

8

**Г. Г. Сумаковъ,** Новый видъ изъ рода *Trogoderma* Latr. (Coleoptera, Dermestidae) и обзоръ видовъ этого рода . . . . .

15

**Э. Ф. Мирамъ,** Дополнительный списокъ прямокрылыхъ Новгородской губерніи. . . . .

20

**Г. Олсуфьевъ,** Объ одномъ новомъ родѣ изъ группы *Geotrypini* (Coleoptera, Scarabaeidae). . . . .

21

**В. Е. Яковлевъ,** Новые виды рода *Ischnopeza* Fieb. (Hemiptera-Heteroptera, Lygaeidae) изъ Персіи. . . . .

23

**Г. Якобсонъ,** О двухъ новыхъ формахъ рода *Crioceris* Geoffr. (Coleoptera, Chrysomelidae), съ двумя синонимическими замѣтками . . . . .

25

**Л. Круликовскій,** Мелкая лепидоптерологическая замѣтка. IX. . . . .

27

**В. Баровскій,** Новые для русской фауны виды жестокрылыхъ (Coleoptera, Cantharididae et Coccinellidae). . . . .

35

**Н. Я. Кузнецонъ,** По поводу периодической системы бабочекъ проф. П. И. Бахметьева . . . . .

37

(Продолжение см. на 3-й стр. обложки).

## SOMMAIRE \*).

### I. BULLETIN ENTOMOLOGIQUE:

Comptes-Rendus des s閙ances de la Soci t  Entomologique de Russie en 1907 . . . . .

I

### II. MATERIAUX SCIENTIFIQUES:

**J. J. Shevyrev,** Sur le cycle『 volutif de *Theronia atlantae* Pod a (*flavieana* auct.) (Hymenoptera, Ichneumonidae) . . . . .

1

**G. Jacobson,** *Donacia semenovi*, sp. nov. (Coleoptera, Chrysomelidae) . . . . .

5

**Nikita Kokujev,** Une esp ce nouvelle du genre *Theronia* Holmgren (Hymenoptera, Ichneumonidae) . . . . .

7

**L. Krulikovsky,** Notice sur la chasse des L pidopt res durant l' t  1906 dans le district d'Ourjoum, gouv. de Viatka. . . . .

8

**G. G. Sumakov,** Une esp ce nouvelle du genre *Trogoderma* Latr. (Coleoptera, Dermestidae) et r vision des esp ces de ce genre . . . . .

15

**E. Th. Miram,** Notice suppl mentaire   la faune orthopt rologique du gouv. de Novgorod. . . . .

20

**G. d'Olsoufieff,** Sur un nouveau genre de *Geotrypini* (Coleoptera, Scarabaeidae) . . . . .

21

**B. E. Jakovlev,** Esp ces nouvelles du genre *Ischnopeza* (Hemiptera-Heteroptera, Lygaeidae) de la Perse. . . . .

23

**G. Jacobson,** De duabus novis formis generis *Crioceris* Geoffr. (Coleoptera, Chrysomelidae), additis annotationibus synonymicis . . . . .

25

**L. Krullkovsky,** Petites notices l pidopt rologiques. IX. . . . .

27

**V. Barovsky,** Quelques esp ces de Col opt res (Cantharididae et Coccinellidae) nouvelles pour la faune de la Russie . . . . .

35

**N. J. Kusnezov,** A propos du syst me p riodique des Rhopaloc res de M. le prof. P. J. Bachmetjev . . . . .

37

(Voir p. 3 de la couverture).

\* Sur la couverture les noms d'auteurs russes sont transcrits en latin. Voir: Verhandl. d. V. Internat. Congr. zu Berlin, 1901, pp. 959-960.

В. Баровский (С.-Петербургъ).

Новые для русской фауны виды жестокрылыхъ (Coleoptera, Cantharididae et Coccinellidae).

**Malthodes spretus** Kiesw. большинствомъ авторовъ приводится только для ограниченного ряда мѣстъ средней и южной Европы. Такъ А. Fiori въ 1906 г.<sup>1)</sup> приводить его для горъ Италии: L. Ganglbauer въ 1907 г.<sup>2)</sup> для „Алп. Жига“; D. Кuth въ 1896 г. для нѣкоторыхъ мѣстъ Венгрии: болѣе подробная указанія на распространеніе этого вида мы находимъ у J. Voiggesois<sup>4)</sup>: онъ приводить его не только для разныхъ мѣстъ Франціи и перечисленныхъ выше мѣстностей, но также и для Германии, Австріи, Штирии и Дании<sup>5)</sup> <sup>6)</sup>.

Въ Россіи попалось мнѣ впервые 4 экземпляра этого вида въ предѣлахъ С.-Петербургской губерніи, близь Гатчины, именно при конопѣи травъ на опушкѣ Малогатчинской лѣсной дачи 6—7. VI. 1902, а потомъ въ окрестностяхъ г. Ямбурга: „усадьба Романовка“, 30. V. 1905 и 16. VII. 1904.

По всѣмъ вѣроятіямъ, видъ этотъ будетъ найденъ и въ другихъ мѣстахъ Россіи, но, вслѣдствіе скучности доставляемыхъ по роду *Malthodes* материаловъ этого пока еще нельзя подтвердить.

<sup>1)</sup> Rivista Coleotterologica Italiana; № 12, 1905; № 1, 1906.

<sup>2)</sup> Leyden, L. v., Dr., Reitter, E. & Weise, J. Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. Gattung *Malthodes* bearbeitet von L. Ganglbauer.

<sup>3)</sup> Fauna Regni Hungariae, Coleoptera. Budapest, 1896.

<sup>4)</sup> Faune Gallo-Rhenane ou species des insectes etc., IV, 1884.

<sup>5)</sup> Faune Gallo-Rhenane, 1-er supplement aux Malacodermes. Revue d'Entomologie, dÃ©cembre 1893.

<sup>6)</sup> C. Grill въ своемъ Catalogus Coleopterorum Scandinaviae, Daniae et Fenniae (Holmiae 1896) этого вида не приводитъ для Даніи.

*Semiadalia notata* Lai ch. ab. *elongata* Weise приводится всеми авторами какъ эндемичный подвидъ только для Monte Rosa.

Привожу эту аберрацію, попадавшуюся мнѣ вмѣстѣ съ основной формой въ С.-Петербургской губерніи: Малогатчинская лѣсная дача близъ Гатчины; были пойманы 7 экз. этой аберраціи на 15—20 экз. основной формы 3, 8 и 16. VI, 2 и 7. VII. 1902 и 14. VII. 1903.

---