РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ

оспованное

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Кокуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ

ИЗЛАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

подъ редакціей Н. Я. Кузнецова.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky, N. Shiriajev et T. Tshitsherin †.

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie

sous la rédaction de N. J. Kusnezov.

VIII.

1908.

· ju

C.-Петербургъ — St-Pétersbourg.

Типо-Литографія "Герольдъ" (Изм. п., 7 рота, 26).

1909.

JAN 216056

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ

OCHOBAHHOE

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Конуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ п А. И. Яковлевымъ.

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky, N. Shiriajev et T. Tshitsherin †.

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie.

1908.

T. VIII. No 1.



С.-Петербургъ — St-Pétersbourg. Типо-Литографія "Герольдъ" (Изм. п., 7 рота, 26). 1908.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	
дъйствія общества:	BULLETIN ENTOMOLOGIQUE:
Извлеченіе изъ протоко- ловъ Общихъ Собраній Обще-	Comptes-rendus des Séances
ства за 1908 годъ	de la Société en 1908 I
Н. Н. Аделунгъ, Өедоръ Пе-	N. v. Adelung, Th. Fr. Köp-
тровичъ Кенпенъ † (Съпортре-	pen† (Avec portrait)XV
томъ), ХV	
оригинальныя статьи:	MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES:
С. С. Четнериковъ, Еще разъ	S. S. Tshetverikov, Noch ein-
o Dendrolimus pini L., D. segregatus	mal über Dendrolimus pini L., D. segre-
Butl. n D. sibiricus Tshtvr., nom.	gatus Butl. und D. sibiricus Tshtvr.,
nov. (laricis Тshtvr.). (Lepidoptera, Lasiocampidae). Съ 3 рис. въ текстъ 1	nom, nov. laricis T s h t v r.). (Lepidoptera, Lasiocampidae). Mit 3 Textfi-
Dasiocampidae). Os o pile. Bii ivita	guren
В. Е. Яковлевъ, Новые виды	B. E. Jakovlev, Espèces nouvelles
Sphenoptera (Chrysoblemma) русской	du genre Sphenoptera (Chrysoblemma)
фауны (Colcoptera, Buprestidae) 8	de la faune de la Russie 8
А. Дьяконовъ, Новый видъ	A. Djakonov, Espèce nouvelle
Xanthorrhoë Hb. (Larentia Tr. et	de Xanthorrhoë H b. (Larentia T r. et
auct. (Lepidoptera, Geometridae) изъ Семиръченской области. Съ 3 рис. 12	auct.), (Lepidoptera, Geometridae) de
•	la province de Semiretshje. Avec 3 fig. 12
О. Іонъ, Къ фаунѣ чешуекры- лыхъ Манджурін	O. John, Contributions à la faune lépidoptérologique de la Mantchourie. 16
. А. Дъяконовъ, Къ фаунѣ Geo-	A. Djakonov, Contributions à la
metridae Семирфчья и Семипалатии-	faune des Geometridae des provinces
ской области 25	de Semiretshje et de Semipalatinsk 25
Д-ръ мед. Э. В. Эриксонъ, О	D-r med. E. V. Erikson, Sur la
психикъ шмелей	psychologie des bourdons 32
Д. А. Смирновъ, Обзоръ раз-	D. A. Smirnov, Revue des va-
новидиостей Necrophorus vespilloides Неть st. (Coleoptera, Silphidae) 42	riétés de <i>Necrophorus vespilloides</i> Herbst. (Colcoptera, Silphidae) 42
Г. Блёкеръ, Къ познанію формъ	H. Bloecker, Contribution à
Larentia Tr. групны truncata H ufn.—	l'étude des formes de Larentia T r.
immanata Hw. (Lepidoptera, Geome-	du groupe truncata H u f n immanata
tridae). Съ табл. I рис 44	H w. (Lepidoptera, Geometridae). Avec
	planche I 44
Г. Блёкеръ, Что такое Сага-	H. Bloecker, Was ist Caradrina
drina menetricsi Kretschmar? (Lepidoptera, Noctuidae) 50	menetricsi Kretschmar? (Lepidoptera, Noctuidae)
В. В. Баронскій, Повые и инте-	ptera, Noctuidae) 50 V. V. Barovsky, Espèces des
ресные для СПетербургской фауны	Coléoptères nouvelles ou intéressan-
виды Coleoptera, собранные за 1906	tes pour la faune de StPétersbourg,
и 1907 гг 51	recucillies en 1906 et 1907 54
Ф. Зайцевъ, Замьтки о водя-	Ph. Zaitzev, Notizen über Was-
ныхъ жукахъ. XXXI—XL 61	serkäfer. XXXI-XL
Ф. Зайценъ, Результаты трехъ	Ph. Zaitzev, Résultats de trois
экскурсій за водяными жуками 66	chasses aux Coléoptères aquatiques 66
Оскаръ Іопъ, Къ познанію рола <i>Plusia</i> Осhs. (Lepidoptera,	Oscar John, Beiträge zur Kennt-
Noctuidae). Съ 9 рис. въ текстъ 74	niss der Gattung <i>Plusia</i> Ochs. (Lepidoptera, Noctuidae). Mit 9 Textfiguren. 74
(Продолженіе см. на 3-й стр. обложки).	
(продолжение см. на з-и стр. обложки).	(Voir p. 3 de la couverture).

SOMMAIRE.

В. В. Баровскій (С.-Петербургъ).

Новые и интересные для С.-Петербургской фауны виды *Coleoptera*, собранные за 1906 и 1907 гг.

Прододжая собирать насъкомыхъ фауны С.-Петербургской губернін, а также свъльнія о наиболье интересныхъ видахъ изъ нихъ, я успълъ за 1906 и 1907 гг. добыть нижеслъдующія интересныя ланныя о новыхъ для нашей фауны или ръдкихъ у насъ жесткокрылыхъ. Изъ сборовъ за эти годы особо заслуживаютъ вниманія матеріалы, собранные А. В. Власовымъ, В. В. Мазаракіемъ и В. П. Штейнфельдомъ; мнъ лично также удалось пополнить свою коллекцію весьма интересными видами. Сборы А. В. Власова представляють богатый матеріаль изъ мало изслідованнаго Шлиссельбургскаго увада. Не останавливаясь на характеристикъ отдъльныхъ сборовъ, перейду къ списку, сначала новыхъ для фауны нашей губернін, а затъмъ нанболъе интересныхъ для этой фауны видовъ; при этомъ считаю необходимымъ привести сокращенныя названія мъстностей, глъ производились сборы, а также сокращенія фамилій собирателей (жирный шрифтъ начальныхъ буквъ данной мъстности или фамиліи означаетъ сокращеніе).

Автова, дер. въ 7 верстахъ отъ СПб. по Петергофскому шоссе; Гатчина, заштатный гор. Царскосельскаго уѣзда; Горы, дер. въ 45 верст. вверхъ по р. Невъ, Шлиссельбургскаго уѣзда 1); Дудергофъ, мъстность въ 27 верстахъ отъ СПб. по Балтійской жел. дор.; Лигово, станція въ 14 в. отъ СПб. по той же жел. дор.; Лобаново, пристань въ 45 верстахъ отъ СПб. вверхъ по р. Невъ (она же почтовая станція Елизаветино, Шлиссельбургскаго уѣзда 2); Лѣсной, мъстность въ 4 в.

¹⁾ Такъ какъ сборы въ этой мѣстности производились почти исключительно А. В. Власовымъ, то при ней, во избѣжаніе повтореній, фамиліи собирателя не будетъ указано.

²⁾ Сборы почти исключительно производились А. В. В ласовымъ, и, во избѣжаніе повтореній, фамилін собирателя при этой мѣстности не будетъ указано.

отъ СПб.; Лямцево, дер. Лужскаго уъзда; Романовка, усадьба на ръкъ Лугъ, въ окрестностяхъ гор. Ямбурга; Сергіева Пустынь, станція но Балтійской жел. дор. въ 17 верст. отъ СПб.; Ямбургъ, уъздный городъ СПб. губ. на р. Лугъ. Виды изъ мъстностей, при которыхъ фамилія собирателя не указана, за исключеніемъ "Лоб." и "Горы", о которыхъ оговорено выше, собраны мною.

Новыми видами и разповидностями, не встръчавшимися ранѣе въ спискахъ по фаунъ С.-Петербургской губерини и въ добавленіяхъ къ этимъ спискамъ, являются слъдующіе:

- 1. Rhantus suturellus H a a r. var. subopacus M a n n h.1) Hob., 30. VI. 06.
- 2. Cateretes bipustulatus Payk. var. niger Sahlb. Joo., 29. IV. 06.
- 3. Silvanus similis Wesm. Лоб., 24. V. 06, въ сухнхъ листьяхъ; Seidlitz²): "Лифляндія, у насъ ръдко".
- 4. Absidia pilosa Payk. ab. fumipennis Poppius. Гатч., 12. VI. 03; Ром., 16. VI. 06.
- 5. Dasytes (Hapaloglyta) fusculus Illig. Гатч., 11. VI. 02, на Angelica sylvestris; Горы, 20. VI. 07, на Epilobium angustifo/ium. Seidlitz: "Швеція, Курляндія, у насъ р'їдко".
- 6. Coccinella septempunctata L. ab. kachovskyi nova 3). Красное Село, Лагерь, 10. VIII. 07 (Г. В. Каховскій!).
 - 7. Haltica brevicollis Foudr. Joo., 2. VI. 06.
- 8. Psammodius sulcicollis Illig. Горы, 25. V. 07, песчаный берегъ ръчки Мги; въ этомъ году мнъ удалось также поймать этотъ интересный видъ въ Ром., 9. VI. 08, песчаный бер. р. Луги. Seidlitz: "Швеція, Эстляндія, у насъ не часто".

Къ интереснымъ, но уже ранѣе занесеннымъ въ списки видамъ, я отношу слъдующія:

¹⁾ Въ спискъ Ф. А. Зайцева [Жуки-водолюбы С.-Петербургской губ. (Ежегодникъ Зоол. Муз. Ими. Акад. Наукъ, XII, 1907, стр. 144—176)] эта варіація не приведена.

²⁾ Seidlitz. Fauna Baltica, Ed. II, 1891.

³⁾ Coccinella septempunctata L. ab. kachovskyi nova. Färbung normal; alle Punkte vergrössert, erste und dritte derselben zusammenfliessend, zweite halbmondförmig, nähert sich der Naht, in der nach aussen verlängert.—Russland, Gouvern. St.-Petersburg. При нормальной окраскѣ всѣ пятна увеличены, изъ инхъ 1-е и 3-е соединены между собой черной полосой, иѣсколько суженной посрединѣ; второе пятно удлинено поперечно къ краямъ, напоминаетъ формой полумѣсяцъ. Найдена эта аберрація Vl. 07 въ Красносельскомъ лагерѣ (Царскосельскій уѣздъ) Р. В. К а х о в с к и м ъ, въ честь котораго я и предлагаю ее пазвать. Заслуживаетъ отмѣтки какъ аберрація широко распространеннаго и очень постояннаго вида. Въ этомъ году миѣ удалось найти другой экземпляръ этой аберраціи въ ближайшихъ окрестностяхъ С.-Петербурга, именно: дер. Автова, дамба, 5. VI. 08, на Urtica; у нойманнаго мной экземпляра пятна нѣсколько больше увеличены и пе со столь рѣзкими какъ у предыдущаго границами—болѣе расплывчатыя.

Carabidae.

Carabus (Megodontus) violaceus L. 106., 13. V. 06.

С. (in sp.) menetriesi H u m m. Гатч., 6. VI и 6. VIII. 06, послъдній на кусть можжевельника; Лоб., 14. V. 06; Лужск. у. дер. Бори, 30. VI. 07, на торфяномъ болоть (В. Александровъ); Павловскъ, бер. ръчки Ижоры, 8. VI. 06. По словамъ Д. К. Глазунова, этотъ видъ попался ему въ нъсколькихъ экземилярахъ на моховомъ болоть близь г. Луги.

Olistopus rotundatus Раук. Горы, 18. VI. 07.

Bothriopterus angustatus Duft. Горы, 10. Vl. 07.

Miscodera arctica P ау k. 2 экз., Лъсной, 25. III. 07 (В. П. III тейнфельдъ), въ сосновомъ лъсу подо мхомъ.

Chlaenius tristis Schall. Ром., 29. VI. 06, берегъ р. Луги.

Agonum ericeti Panz. Дудерг., 6. V. 07, 4 экз., торфяное болото у дер. Николаевки.

Сymindis vaporariorum L. Лъсной, 6. Vl. 07, 6 экз. (В. П. III тейнфельдъ); Ром., 17. Vl. 07, 3 экз. подъ кучей прошлогоднихълистьевъ.

Dromius linearis Oliv. Авт., 28. III. 07, подъ листьями у корней Salix.

Dytiscidae.

Platambus maculatus L. ab. inaequalis Panz. Moo., 30. VI. 07.

Graphoderes bilineatus De Geer. Hoo., 29, XII. 07.

Agabus affinis Раук. Ораніенбаумъ, 26. V. 07 (Г. В. Каховскій!).

A. (Gaurodytes) wasastjernai С. Sah I b. Ораніенбаумъ, 20. V. 07 (Г. В. Каховскій!).

Hygroporus oblongus $S\ t\ e\ p\ h.$ $Abt.,\ 2.$ $IV.\ 03.$

H. glabriusculus A ц b é. Левашово, 27. IV. 05 (Біанки!).

Scaphidiidae.

Scaphidium quattuormaculatum О b. Горы, 23. V. 07 и VIII. 07, около 20 экз.; Лоб., 22. IV. 06; Ром., 16. VIII. 06 (Ө. В. Баровскій).

Histeridae.

Hydrophilidae.

Helophorus griseus Hrbst. Спб. Митроф. кладб., 18. III. 07, на сокъ *Salix* (А. В. Власовъ!).

Revue Russe d'Entom. 1908. № 1. (Juin 1908).

Cantharididae 1).

Podabrus alpinus P ау k. аb. Дудерг., 24. XI. 07, на горъ на лету. Ebaeus pedicularius S с h r а n k. Горы, 5. VII. 07.

Charopus flavipes P a y k. Авт., 17. VI, 07, около 30 экз., на совершенно сухомъ нескъ, поросшемъ хвощами, не далеко отъ воды, и на самыхъ хвощахъ; 22. VII, 07, ст. Сергіево, Балтійск. ж. д., на ниъ Betula alba.

Dasytes obscurus Gyllh. Горы, 19. VII. 07; Ром., 15. VII. 06, на Angelica sylvestris.

Nitidulidae.

Rhizophagus (Cycnostolus) aeneus $R\,t\,t\,r.$ (coeruleipennis $S\,a\,h\,l\,b.$). Joő., 23. IV. 06, на Abies.

Cryptophagidae.

Aspidiphorus orbiculatus Gyll. 106., 19. VI. 06.

Coccinellidae.

Anatis ocellata L. ab. subfasciata Weise. Дудерг., 6. V. 07. Semiadalia notata Laich. 2) ab. elongata Weise. Гатч., 3. VI. 07, 2 2003.

Hyperaspis reppensis Hrbst. Горы, 4. VI. 07 (З. И. Спицына). Scymnus (in sp.) jacobsoni Вагоvsку. Горы, 25. V. 07, и Лигово, 13. IV. 97 (Н. Н. Ивановъ!).

- S. (Pullus) ferrugatus Moll. Горы, 17. V. 07, на Prunus padus.
- S. (P.) haemorrhoidalis Hrbst. Jlob., 9. VIII. 06; Pom., 30. VIII. 07.
- S. (Nephus) redtenbacheri Muls. Авт., 18. III. 07, подълиствой на вемлъ (И. М. Исаевъ!).

Helodidae.

Eucinetus haemorrhous D f t. Abt., 20. IV. 06 $_{\rm H}$ 4. V. 07.

Elateridae.

Elater praeustus Fabr. JIo6., 28. IV. 06, na Prunus padus.

Hypnoidus (in sp.) tenuicornis Germ. Горы, 10. VI. 07, 1 экз., на Salix fragilis; Павловскъ, берегъ ръчки Ижоры, 8. VI. 06, много на Salix fragilis и на пескъ подъ шимъ; въ точно такихъ же условіяхъ

¹⁾ Виды рода Malthodes Kiesw. не пом'ящены въ этотъ списокъ, такъ какъ въ непродолжительномъ времени я собираюсь дать полный списокъ сем. Cantharididae для С.-Петербургской губерніи.

²⁾ Укажу попутно на новое мѣстонахожденіе этого питереснаго вида, а именно: А.В.Власовъ передаль миѣ экземплярь Semiadalia notata Laich., пойманный В. П. Александровымъ VII. 07 въ Олопецкой губерніп (дер. Онаринская).

н въ большомъ количествъ въ Романовкъ, по берегамъ ръки Луги, 1—18. VI. 07.

H. (Negastrius) pulchellus L. Горы, берега р. Мгн, 25. V—10. VIII. 07 (около 100 экз.); Павловекъ, вмъстъ съ предыдущимъ видомъ, на сухомъ пескъ, и въ Ямбургъ, по бер. р. Луги.

Athous niger L. var. scrutator Hrbst. СПб. Петербургск. сторона,

6. VI. 06 (В. П. Штейнфельдъ!).

А. haemorrhoidalis Fabr. Дудерг., 27. V. 07, на лету, 2 экз.; Навловскъ, 6. VI. 06, на *Lonicera*.

А. vittatus F a b г. Дудерг., 24. VI. 07, кошеніе мелкихъ осинъ; по словамъ Н. Н. И в а н о в а 1), до сихъ поръ не было достовърныхъ свъдъній о времени ловли этого насъкомаго въ С.-Петербургской губериін.

А. undulatus Deg. Дудерг., 24. VI. 07, на лету.

" " " var. bifasciatus Gyll. Тамъже, 24. VI. 07, на осиновомъ инъ.

Ludius (Calosirus) castaneus L. Joo., 24. IV. 06, na Prunus padus.

L. (Orithales) serraticornis Payk. Лоб, 24. V. 07, 3 экз.

L. (Selatosomus) nigricornis $P\ a\ n\ z.\ \Gamma a_{T^{\prime}T^{\prime}T^{\prime}}$, 5. VI. 06.

L. (S.) melancholicus Fabr. Лоб., 25. IV. 06, на сосновыхъ бревнахъ.

Buprestidae.

Agrilus mendax Mannh. Лоб., 15. VI. 06, на Sorbus aucuparia; Ром., 24. VI. 06, на Salix sp. (Ө. В. Баровскій).

A. subauratus Gebl. Гатч., 18. VI. 06, на Salix sp.

Lymexylidae.

Mordellidae.

Mordella maculosa N a e z. Горы, 12. VIII. 07, на трутовикъ. Томохіа biguttata G y l l. Лоб., 31. V. 06, на столбъ.

Melandryidae.

Orchesia (Clinocera) fasciata Раук. Горы, 18. V. 07, подъ корой Pinus.

Dircaea quattuorguttata Раук. Горы, 27. VII. 07, подъ корой Betula alba.

Tenebrionidae.

Blaps mortisaga L. СПб., Клинскій просп., 28. XII. 07, подъ поломъ булочной, около 30 экземпляровъ (А. В. Власовъ).

Gnathocerus cornutus Fabr. Тамъ же, 5 экз.

¹⁾ Н. Н. Пвановъ. Жуки-щелкуны (*Elateridae*) С.-Петербургской губериів. (Ежегодинкъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, VI, 1901).

Cerambycidae.

Leptura (Judolia) sexmaculata L. Лоб., 14. V. 06; Горы, 29. VI. 07, на Epilobium angustifolium.

L. (Sphaenalia) pubescens $\ \, {\rm Fab} \, r. \, \, \Gamma a{\rm Ty.}, \ \, 5. \, \, {\rm VI.} \, \, 06, \ \, 12 \, \, {\rm эк} \, 3. \, \, \, {\rm Ha} \, \, \, Spiraea \, \, ulmaria.$

Necydalis major L. Лоб., 20. VI. 06 Q, на Pinus sylvestris.

Acanthocinus griseus Fabr. Cepriebo, 10. VI. 07.

Pogonochaerus ovatus Goeze. Pom., 30. VIII. 07.

Saperda perforata Pall. Дудерг., 24. VI. 07, на осиновыхъ дровахъ.

Chrysomelidae.

Donacia versicolorea Brahm. Лиг., 9. IX. 06 (ЗЗ и QQ in cop.), на Carex (А. В. Власовъ).

- **D. fennica** P a y k. Гатч., 1—15. VI. 06. во множествѣ (около 160 экз.); Павловекъ, рѣчка Ижора, 6. VI. 06, довольно много.
 - D. sparganii Ahr. Гатч., 9. VI. 06, на Sparganium.
- **D.** brevicornis A h r. Лнг., берегъ залива, на цвътущихъ *Juncaceae*, много (около 100 экз.); видъ, считавшійся ранъе большой ръдкостью.
- **D.** antiqua Kunze. Тамъ же и при тъхъ же условіяхъ, 9 экз. 17. VI. 07; Лоб., 29. VI. 06, на *Carex*.
- **D.** cinerea Hrbst. Гатч., 18. V. 06, довольно много; Лиг., 17. VI. 07, 8 экз.
- **D. tomentosa** Ahr. Гатч., 20. V и 8. VI. 06, 3 экз., на *Nymphaea*; Лоб., 7. VII. 05 (♂ ♀ in cop.), на *Sagittaria sagittifolia*.

Zeugophora subspinosa Fabr. Горы, 5. VII. 07, на *Betula alba*: СПб., Александровскій садъ, 16. VI. 06 (В. И. Александровскій садъ, 16. VII. 07. На Ветига проведующий садъя правиденти проведующий садъя (В. И. Александровскій садъя правиденти правиде

Lema septentrionis Weise. JIoo., 1. VIII. 06.

L. melanopus L. Горы, 2. VI. 07, берега р. Мгн.

Cryptocephalus distinguendus S e h n e i d. Лоб., 2. VI. 06; Ром., 10. VI. 07 на листьяхъ $Betula\ alba$.

C. parvulus M ü l l. Лоб., 15. V. 06; Ром., 11. VI. 07, на листьяхъ Salix sp.

Melasoma lapponica L. Ораніенбаумъ, дер. Дубки, VII. 07 (В. Н. Александровъ).

Orina rugulosa Sulz. Ст. Суйда, Царскосельск. у., 18. VII. 00 (В. Кузнецовъ!).

Chalcoides nitidula L. Горы, 23. VI. 06.

Lythraria salicariae Payk. Moo., 13. VII. 06.

Longitarsus apicalis Beckm. Job., 27. VII. 06.

Cassida sanguinolenta Fabr. Joo., 14. VII. 03.

С. thoracica Fourer. Гатч., 4. VI. 06; Лоб., 26. VII. 07.

Anthribidae.

Platyrrhinus resinosus Scop. Горы, 31. VII. 07, нодъ корой Betula alba.

Curculionidae.

Отогнувских гидових Н и т. т. Дудерг., 25. V. 07 (♂♂ п ♀♀ in сор.). Въ совмъстной съ В. В. и Е. Е. Мазаракій экскурсін удалось собрать довольно большое количество экземпляровъ (около 60) этого интереснаго вида, при чемъ выяснились его кормовыя растенія, именно: Lonicera tatarica (?), Ribes alpina и Sorbus; жуки поъдали листья названныхъ кустарниковъ и при приближеніи быстро скатывались на землю, сложивъ ноги и оставаясь неподвижными, вслъдствіе этого многихъ изъ нихъ не удалось найти; насъкомыя встръчались только на кустарникахъ по склонамъ возвышенностей, въ долинахъ на тъхъ же кустарникахъ ихъ не было.

Lixus iridis Ol. Лямц., 22. VII. 06 (В. И. Александровъ).

lpidae.

Eccoptogaster rugulosus Ratzeb. Горы, 23. VI. 07.

Этимъ и заканчиваются данныя 1906 и 1907 гг.; къ сожальнію, приходится отмътить сравнительную скудость матеріаловъ, ноступившихъ за эти года, и вообще малый интересъ нашихъ энтомологовъ къ фаунъ С.-Петербургской губерніи, далеко еще не изслъдованной.