

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE


FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

*Natura maxime miranda
in minimis.*

ANNÉE 1916. — VOLUME LXXXV



PARIS
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES
28, rue Serpente, VI^e
—
1916-1917

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

*Natura maxime miranda
in minimis.*

VOLUME LXXXV. — ANNÉE 1916

2^e TRIMESTRE



PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, rue Serpente (VI^e)

—
AOUT 1916

— Les Annales paraissent trimestriellement

Le Secrétaire-gérant : L. CHOPARD.

SYNONYMIES DE COLÉOPTÈRES EUROPÉENS

par L. BEDEL.

1. *Carabus Adonis* Hampe, 1853, = *C. arcadicus* Gistel, 1850. Handb. Naturg., p. 622.
2. *Silpha fluctuosa* Schauf., 1871. — Cet insecte, que le Catalogue Reitter rapporte avec doute au *Silpha puncticollis* Luc., est positivement un *Blilophaga* et constitue une forme particulière à l'Espagne de *B. (Aclypea) undata* Müll.
Schaufuss l'a décrit de San Ildefonso, c'est-à-dire de La Granja (sierre de Guadarrama), où je l'ai pris également.
3. *Malldodes atomus* Thoms., 1864, = *M. pumilus* Brébisson, 1835, in *Mém. Soc. linn. Norm.*, V, p. 153. — Le type de Brébisson provenait des Monts-d'Éraines (Calvados).
4. *Anthocomus rufus* Herbst, 1784, = *A. coccineus* Schaller, 1783, in *Abhandl. Ill. Nat. Ges.*, I, p. 303.
5. *Leucohimatium elongatum* Er., 1846, = *L. arundinaeum* Forsk., 1775, *Descr. Anim.*, p. 78 (sub *Tenebrio*). — J'ai pu constater que les spécimens d'Égypte (les types de Forskål provenaient du Caire) étaient identiques à ceux de l'Europe méridionale.
6. Gen. *Acotulus* Reitt., 1891, = Gen. *Helioctamenus* Schauf., 1882. — Le genre *Acotulus*, rangé par Reitter au nombre des Ténébrionides, est un Colydiide du groupe des *Orthocerini*.
7. *Scymnus tibialis** Ch. Bris., 1863, = *S. (Pullus) auritus* Thunb., 1795 (*capitatus* Fabr.).
8. *Scymnus Brisouti** Crotch, 1874 (*rufipes* || Ch. Bris., 1863), = *S. (Pullus) auritus* Thunb., 1795.
Ch. Brisout avait reconnu lui-même la synonymie de cette espèce et de la précédente et les avait réunies dans sa propre collection à l'*auritus* Thunb.
9. *Eurythyrea scutellaris* Ol., 1790, = *E. quercus* Herbst, 1780, in *Schriften Berlin. nat. Ges.*, I, p. 97. — Herbst, dont la description est très explicite en ce qui concerne la forme de l'écusson, si caractéristique chez cette espèce, spécifie qu'elle a été trouvée « sur le Chêne » et ajoute qu'il lui donne le nom de *quercus* en raison de ce fait. La réuion erronée du *quercus* à l'*unstriaca* L. (spécial aux Conifères) tient sans doute à ce que les auteurs qui les ont réunis n'ont jamais pris la peine de consulter le texte de 1780.

40. *Anthaxia manca* Fabr. (1783), = *A. manca* Linné, 1767, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 4067 (*bistriata* Fabr., 1775).
41. *Anthaxia smaragdifrons* Mars., 1866, = *A. chlorocephala* Lucas, 1846 (*millefolii* † auct.). — C'est une espèce très distincte de *cichorii* Ol.; ce dernier n'existe pas dans le Nord de l'Afrique; le *chlorocephala* y est, au contraire, des plus communs.
42. *Anthaxia semiusta* Ab., 1895, = *A. hyrcana* Kirsch, 1880, in *Ent. Monatsbl.*, II, p. 432.
Le nom d'*hyrcana* est faussement attribué à Kiesenwetter à la p. 412 du Catalogue Reitter. L'espèce est du groupe de *salicis* Fabr.
43. *Anthaxia Maschelli* Kiesw., 1880, = *A. ephippiata* Redt., 1850 (*Edithae* Reitt., 1890).
44. *Agrilus barbatus* Ab., 1897, = *A. hastulifer* Ratz., 1839. — L'insecte décrit par Abeille est, comme il le reconnaissait lui-même, le mâle de l'*hastulifer*. Il est difficile de comprendre pourquoi Reitter (Cat., p. 417) l'a inscrit comme *Coroebus*.
45. *Trachys Marseuli** Ch. Bris., 1874, = *T. quercicola** Mars., 1871. — Cette synonymie, que j'ai constatée sur les *types* mêmes des deux auteurs (je possède le *type* unique de S. de Marseul), est déjà inscrite au Catalogue des Coléoptères de Provence, II, p. 527; par contre, le *quercicola* y est indiqué comme se trouvant « sur un *Geranium* »; or chacun sait actuellement que ce Buprestide se développe dans les feuilles du *Stachys recta* et que l'imago mime, à s'y méprendre, les graines de cette Labiée.
Le *T. Goberti* Des Gozis, qui vit sur les *Marrubium*, est très distinct du *quercicola* Mars.
46. *Habroloma Pandellei* Fairm., 1852, = *H. triangulare* Lacord., 1835.

La réunion du *triangulare* au *nanum* Herbst est une erreur d'autant plus facile à constater que Lacordaire (Faune ent. Paris, p. 616) décrit à la fois l'un et l'autre et qu'il caractérise nettement le *triangulare* par sa très petite taille et sa coloration « d'un cuivreux assez clair et brillant ».