

37

122
✓ ✓

Berliner

62022

Entomologische Zeitschrift.

Herausgegeben

von dem

Entomologischen Vereine in Berlin.

¹⁷
Siebenzehnter Jahrgang. (1873.)

Mit 1 Kupfertafel.

Preis für Nichtmitglieder des Vereins: 4½ Thlr.

Redacteur: Dr. G. Kraatz.

Berlin, 1873.

In Commission der Nicolai'schen Verlags-Buchhandlung.

204276

Inhalt¹⁾ des siebenzehnten Jahrgangs der Berliner entomologischen Zeitschrift.

	Seite
Titel und Inhalt	1—4
Vereinsangelegenheiten	5—8
Abhandlungen.	
Revision der Cisteliden-Gattung <i>Podonta</i> von H. v. Kiesenwetter in Dresden	9—22
Bemerkungen zur Bearbeitung der <i>Luperus</i> -Arten in der Monographie des Gallerucides von Joannis in Marseul's Abeille. T. III. 1866. Von Demselben	23—31
Zwei neue <i>Aphyctus</i> -Arten. Von Demselben	31—32
<i>Diptera nova</i> in Pannoniâ inferiori et in confinibus Daciae regionibus a Ferd. Kowarzio capta. Descripsit H. Loew	33—52
Essai monographique sur le genre <i>Cymindis</i> proprement dit par le Baron M. de Chaudoir à Jitomir	53—120
Beiträge zur Kenntniss der Peruanischen Käferfauna, auf Dr. Abendroth's Sammlungen basirt, von Th. Kirsch in Dresden	121—152
Anwendung der Darwin'schen Lehre auf Bienen von H. Müller in Lippstadt, besprochen von A. Hensel	153—158
Annales de la Sociedad Española de Historia natural. Tom. I. Cuaderno I., angezeigt von G. Kraatz	158
<i>Melitaea Melicerta</i> (var. nova), ein muthmaslicher Bastard von <i>Athalia</i> Rott. und <i>Dictynna</i> Esp. aus der Umgegend Berlins, von Julius Pfützner	159—160
Zur Nomenclatur der <i>Cryptocephalidae</i> von E. v. Harold in München	161—180
Deutungen einiger Käferarten, 1817 beschrieben in Beck's Beiträgen zur bayerischen Insekten-Fauna, von Dr. G. Kraatz	181—188
Revision der europäischen Arten der Coccinelliden-Gattung <i>Exochomus</i> Redt. Von Demselben	189—194
<i>Exochomus minutus</i> , eine neue deutsche Art. Von Demselben	195
Ueber <i>Uloma Perroudi</i> Muls. aus Deutschland und eine neue Art von Cypern. Von Demselben	196—197
<i>Ophonus pluviusculus</i> , eine neue Laufkäferart aus Thüringen. Von Demselben	197
Ueber <i>Adimonia fontinalis</i> Boh. Thomson. Von Demselben	198—199
Ueber <i>Adimonia pallida</i> Joannis. Von Demselben	199
Ueber <i>Cyphon nigriceps</i> Thoms., Kiesenw. Von Demselben	200—201
Ueber <i>Xylotaemus fasciculosus</i> Gyll. Von Demselben	201
Ueber <i>Xylosteus gracilis</i> n. sp. Von Demselben	202
Zwei neue Coleopteren aus Schlesien (<i>Lathrimaeum prolongatum</i> , <i>Gymnetron Schwarzii</i>). Von Baron v. Rottenberg	203—205
Eine entomologische Excursion durch die Grafschaft Glatz und in das Riesengebirge. Von W. Koltze in Hamburg	206—210

¹⁾ Heft I. und II. (S. 9—242) sind im October, 1873, Heft III. und IV. (S. 1—8, 243—448 Taf. I.) sind im Februar 1874 ausgegeben.

Wegen der mehrmonatlichen Krankheit des Setzers und zeitweiligen Mangels an guten Arbeitskräften war es nicht möglich Heft 1. u. 2. der Zeitschrift früher herzustellen, weshalb man die hierdurch verursachte Verzögerung des Erscheinens derselben nicht der Redaction zur Last legen wolle. Die Druckerei.

Berliner
Entomologische Zeitschrift.

Herausgegeben

von dem

Entomologischen Vereine in Berlin.

Siebenzehnter Jahrgang. (1873.)

Erstes und zweites Vierteljahrsheft,
ausgegeben October 1873.

Seite 9—242.


Preis für Nichtmitglieder des Vereins 2 Thlr.

Redacteur: Dr. G. Kraatz.

Berlin, 1873.

In Commission der Nicolai'schen Verlagsbuchhandlung.

(A. Effert & L. Lindtner.)



An die Herren Vereins-Mitglieder.

Wegen der mehrmonatlichen Krankheit des Setzers und zeitweiligen Mangels an guten Arbeitskräften war es nicht möglich die Zeitschrift früher herzustellen, weshalb man die hierdurch verursachte Verzögerung des Erscheinens derselben nicht der Redaction zur Last legen wolle. Die Druckerei.

Inhalt des ersten und zweiten Heftes 1873.

(Ausgegeben October 1873.)

	Seite
Revision der Cisteliden-Gattung <i>Podonta</i> von H. v. Kiesenwetter in Dresden	9—22
Bemerkungen zur Bearbeitung der <i>Luperus</i> -Arten in der Monographie des Gallerucides von Joannis in Marseul's Abeille. T. III. 1866. Von Demselben	23—31
Zwei neue <i>Aphycetus</i> -Arten. Von Demselben	31—32
<i>Diptera nova</i> in Pannoniâ inferiori et in confinibus Dariae regionibus a Ferd. Kowarzio capta. Descripsit H. Loew	33—52
Essai monographique sur le genre <i>Cymindis</i> proprement dit par le Baron M. de Chaudoir à Jitomir	53—120
Beiträge zur Kenntniss der Peruanischen Käferfauna, auf Dr. Abendroth's Sammlungen basirt, von Th. Kirsch in Dresden	121—152
Anwendung der Darwin'schen Lehre auf Bienen von H. Müller in Lippstadt, besprochen von A. Hensel	153—158
Annales de la Sociedad Española de Historia natural. Tom. I. Cuaderno I., angezeigt von G. Kraatz	158
<i>Melitaea Melicerta</i> (var. nova), ein muthmaslicher Bastard von <i>Athalia</i> Rott. und <i>Dictynna</i> Esp. aus der Umgegend Berlins, von Julius Pfützner	159—160
Zur Nomenclatur der <i>Cryptocephalidae</i> von E. v. Harold in München	161—180
Deutungen einiger Käferarten, 1817 beschrieben in Beck's Beiträgen zur bayerischen Insekten-Fauna, von Dr. G. Kraatz	181—188
Revision der europäischen Arten der Coccinelliden-Gattung <i>Exochomus</i> Redt. Von Demselben	189—194
<i>Exochomus minutus</i> , eine neue deutsche Art. Von Demselben	195
Ueber <i>Uloma Perroudi</i> Muls. aus Deutschland und eine neue Art von Cypern. Von Demselben	196—197
<i>Ophonus planiusculus</i> , eine neue Laufkäferart aus Thüringen. Von Demselben	197
Ueber <i>Adimonia fontinalis</i> Boh. Thomson. Von Demselben	198—199
Ueber <i>Adimonia pallida</i> Joannis. Von Demselben	199
Ueber <i>Cyphon nigriceps</i> Thoms., Kiesenw. Von Demselben	200—201
Ueber <i>Xylolaemus fasciculosus</i> Gyll. Von Demselben	201
Ueber <i>Xylosteus gracilis</i> n. sp. Von Demselben	202
Zwei neue Coleopteren aus Schlesien (<i>Lathrimaemum prolongatum</i> , <i>Gymnetron Schwarzii</i>). Von Baron v. Rottenberg	203—205
Eine entomologische Excursion durch die Grafschaft Glatz und in das Riesengebirge. Von W. Koltze in Hamburg	206—210
Sammelberichte: 1. Von Forstrath Kellner in Gotha. 2. Von Th. Kirsch in Dresden. 3. Von G. Kraatz etc.	211—212
Synonymische Bemerkungen von G. Kraatz, Kirsch, Kellner, v. Rottenberg	213—217
Neuere Literatur. Anzeigen von Dr. G. Kraatz:	
Maurice Girard, les Insectes, traité élémentaire d'entomologie	218—219
G. Ramann, Schmetterlinge Deutschlands	219
A. R. Wallace, Beiträge zur natürlichen Zuchtwahl	220
Carolus Linnaeus. Ein Lebensbild. Von Dr. X. Gistel	221
Küster, Käfer Europas. Fortges. von Dr. Kraatz. Heft XXIX.	222—223

Eine neue deutsche *Exochomus*-Art.*Exochomus minutus*.

Nigro-subaeneus, nitidus, crebre minus subtiliter (quam auritus) punctatus, capite, thoracis lateribus pedibusque fluvis, pectore flavo-brunneo, labro abdomineque picescentibus. — Long. 1 lin. (Mas).

Wenig kleiner als der spanische *Ex. pubescens*, stärker gewölbt, nicht behaart, viel kleiner als der bekannte *auritus*, viel stärker gewölbt und zwar so, daß die Wölbung etwas vor der Mitte der Flügeldecken am stärksten ist. Der Käfer ist oben stark glänzend, schwarz mit leichtem Erzschimmer, unbehaart. Der Kopf ist einfarbig gelb, sehr fein punkulirt, fast ohne Glanz, sehr fein pubescent, oben der Länge nach schwach eingedrückt, Kopfschild vorn deutlich angerandet, Oberlippe stark vortretend, pechbraun. Fühler versteckt. Das Halsschild ist ähnlich gebaut wie beim *auritus*, aber an den Hinterecken stärker verrundet, die Vorderecken weniger vorgezogen; oben äußerst fein, mäßig dicht, an den Seiten dichter punkulirt. Die gelbe Färbung an den Seiten nimmt mehr die Vorderecken als den Seitenrand in gleicher Breite ein, so daß sie von der schwarzen Färbung etwa durch eine Linie begrenzt wird, die von der Ausbuchtung des Vorderrandes fast bis zur innern Schulterecke läuft, während sie beim *auritus* weit von derselben entfernt bleibt. Die Flügeldecken sind stark gewölbt und glänzend, ähnlich wie bei den *Chilocorus*-Arten, der Seitenrand nicht gleichmäßig schmal aufgebogen und von einer tiefen Linie begrenzt, wie bei *auritus*, sondern ähnlich verflacht wie bei den *Chilocoren*, sogar noch stärker, namentlich nach vorn, so daß von einer abgesetzten Seitenrandlinie, wie bei *4-pustulatus*, kaum eine Spur vorhanden ist. Wölbung und Schulterbuckel sind ähnlich stark wie bei *Chil. bipustulatus*; die Punktirung ist ganz ähnlich wie bei diesem, vielleicht etwas weniger fein, aber wenig tief. Die tiefschwarze Grundfarbe zeigt einen Stich ins Grünliche. Beine und Vorderbrust sind hellroth, Mittelbrust etwas dunkler, Hinterleib mit einem Stich ins Pechbraune. Die Schienen sind am Aufsenrande nicht zahnartig erweitert.

Das Weibchen, welches mir noch unbekannt ist, besitzt muthmaßlich keinen ganz gelben Kopf, würde jedoch durch geringe Größe etc. leicht vom *auritus* zu unterscheiden sein.

Da das beschriebene *Ex.* auf Glimmer aufgeklebt ist, so kann ich über die Gestalt der Hinterleibssegmente nichts Genaueres sagen.

Ein nach der Färbung des Käfers zu urtheilen, männliches *Ex.*, bei Großbreitenbach am Thüringer Walde gefangen, wurde mir von Herr Forstrath Kellner zur Ansicht und Beschreibung mitgetheilt.

Dr. G. Kraatz.