

LINNÉ

LINNÉ

CENTURIA INSECTORUM  
RARIORUM

SMITHSONIAN  
LIBRARY







D. D.  
CENTURIA  
INSECTORUM  
RARIORUM

QUAM  
CONSENT. EXPERIMENTISS. FAC. MED.  
In REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,  
PRÆSIDE

NOBILISSIMO ATQUE CELEBERRIMO

D:o DOCT. CAROLO

VON LINNÉ,

EQUITE AURAT. DE STELLA POLARI.  
S:Æ R:Æ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRO.

MEDICIN. ET BOTAN. PROFESSORE REG. ET ORD.  
ACAD. SCIENT. UPSAL. HOL. PARIS. PETROPOL. BEROL.  
BERNENS. LONDIN. ANGL. IMPER. EDINB.

MONSPEL. TOLOS. ET FLORENT.

MEMBRO.

PUBLICO EXAMINI SUBMITTIT


BOAS JOHANSSON,

CÅLMARIENSIS.

IN AUDIT. CAROL. MAJ. D. XXIII. JUNII.  
ANNI MDCCCLXIII.

H. A. M. S. 17-3

UPSALIAE.



Amoenitatis Academicæ Vol VI No 12  
Sp 392-415

REGERINGS · RÅDET  
Uti Surinam  
Samt  
ÖFVERST - LIEUTENANTEN,  
*VÅLBORNE*

HERR C A R L  
GUSTAF  
DAHLBERG,

*HÖGGUNSTIGE HERRE.*

*Charles Richardson*

Jag har trott, att ej tydeligare kunna å daga lägga den fördnad, med hvilken jag flere gånger, i närvarande afhandling tecknat Vålborne Herr Öfverste-Lieutenantens Namn, än om jag fatte

465  
L75  
1763

SCNHRB

satte Det til en prydnad för detta lilla arbetet.  
Såsom okänd af Vålbörne Herr Öfverste-Lieutenanten, vågar jag mycket, men hoppas likväl att denna min drifstighet, ej omildt antes, hvaremot det Åreminne, som Vålbörne Herr Öfverste-Lieutenanten, genom sina förtiänster, åsven förvärvat sig af Natural Historiens idkare, skal hos mig blifva så beständigt, som den förbindelse, med hvilken jag i diup vördnad framhårdar, att vara

VÅLBORNE  
HERR ÖFVERSTE-LIEUTENANTENS

*ödmjukaste tjänare*  
BOAS JOHANSSON.

Lands CAMMERERAREN  
I Calmare Län,  
ÅDEL och HÖGAKTAD,

# HERR J O H A N JOHANSSON, MIN KÅRE FADER.

Så öfverflödande, som min kåre Faders hierta,  
altid varit af kärlek och omsorg för mitt väl,  
så uppfylt är ock mitt sinne, med vördnad och år-  
kiänsla. Min kåre Fader har i sielfva vårcket å da-  
ga lagt sitt öma sinnelag för min välfärd, men  
jag måste stanna i blotta önskan, att framdeles kun-  
na visa mig en så vårdande Faders sinnelag och  
hylest vårdig. Då jag upoffrar Eder, Min kåre  
Fader detta Academiska arbete, som på Eder bekost-  
nad utgifves, kan således aldrig vara min tanka,  
at härigenom afbörda någon del af min förbindelse  
emot Eder godbet; tvertom den fördubblas snarare,  
men gifver mig tillika angenämaste tilfälle, att göra  
Min kåra Faders godhet allmän, och at försäkra,  
det jag i ren nit, och ifriga böner, anropar Ållmagten,  
för en huld Faders, och om Moders långvariga och  
fälla lefnad, under det jag stådje lefver

MIN KÅRE FADERS

lydigste son  
BOAS JOHANSSON.

LANDT-RÅNTEMÅSTAREN  
ÅDEL ocb HÖGAKTAD,

HERR J O N A S  
WIDEMAN,

MIN HULDASTE MORBRODER.

Skulle årkånslan altid vara jämkad efter förtjästen,  
då vågade jag intet, med en så ringa veder-  
gålning berätta all Eder mig visade godhet och  
ynnest. Några flycktiga diurs beskrifningar, fin-  
ner jag siett, intet vara svarande, emot Eder be-  
sländiga huldhet emot mig, och dock har jag in-  
tet bättre offer att frambåra. Uptag derföre Min  
Huldaste Morbroder denna min menlösa vördnad,  
såsom ett vedermåle af den tacksamhet, som inta-  
ger mitt hela sinne. Gör Himmelien min kårafa-  
ste Morbroders dagar många och fälla, då upfylles  
min önskan och min största fägnad; som intill mitt  
ytersta framhärdar, at vara

MIN HULDASTE MORBRODERS

*ödmjuket tjneare*  
BOAS JOHANSSON.

*Naturæ solertiam, nulla ars, nulla manus,  
nemo Artifex consequi potest imitando.* Cicero.



D. D.



cientia quævis, æque ac imperia, suas habent vicissitudines, quibus adolescunt, florent, decrescent, & deprimuntur. Illa scientia naturalis pars, quam, inde ab *Aristote lis* ævo, liberalitati Alexandri Magni acceptam referimus, densis tenebris occultata fuit, & quamvis inclarescere diu magnoq[ue] moli mine tentaverit, tantis tamen præpedita est obstaculis, quanta Astronomi dudum superarunt. Hi scilicet, studio & arte, cœli contemplantes cursum, notitiam siderum, ut ut remotissimorum, sibi adquisiverunt solidam, & adquisitam optime disposuerunt; *Zoologi* vero conqueri de eo fatorum turbine coacti sunt, quod, animantium ante oculos, ne dicam pedes, quotidie sibi obversantium cognitione omni ferme sint destituti.

Regnum, quod dicunt Animale, in sex commode satis dividitur provincias, quarum unam incolunt INSECTA, quibus in describendis, nostra nunc versabitur opera. Incolæ hujus provinciæ, mira quidem sunt animalia,

imalia, Pedum numero, animalibus ceteris, quibus perfectiora sunt corpora, longe præstant; cuique enim sex saltēm, variis autem plures competunt pedusculi. Communi quidem fruuntur aura, quam tamen non ore, non capite, sed laterum quibusdam hauriunt spiraculis. Sensu, quem dicunt *Antennas*, organico gaudent, perspicaciam nostram prorsus eludente, quippe quo ipsi caremus. Sunt quidem instruxta *Capite*, quod vero, si unquam, certe hoc singulare est, & mirandum, cerebro enim destituitur omni; etenim fibra medullaris, quamvis non prius, quam in ipso capite definat, ibi tamen in molem organizatam vix glomeratur. Hæcce denique, ad unum omnia, animalia, suis vestita offibus cataphracta & quasi loricata, mirifice incedunt. Proprietates hæc cuivis admirationem moverent maximam, nisi majori miraculo triplex esset forma, qua trinam quasi metamorphosin pleraque subeant; Hæcce varium habent statum, quo non observato, alter ab altero, dignosci vix potest. Hæc animantium turba, numerum, in arido sibi vindicat maximum, molem vero minimam constituit; at vero, ut multitudine, ita opere, ceteris longe antecellit.

Ab antiquissimis inde temporibus, hæcce volatilia fuere parvi æstimata; quin immo, noxia eadem, & nescio quid abominandum, nemo non habuerit. In primo rerum initio, infœcta non extitisse, atque sic non ordine naturæ solemini, sed generatione æquivoca produci, credula statuerat antiquitas, donec felix posteritas eos genuit viros, qui naturæ penetralia jugi studio petentes, cimelia eiusdem paulo sibi familiariora reddere occiperent. De insectis, nihil certi, perspicui saltēm nihil, nobis improvida & negligens reliquit vetustas; Licet fateamur, communi litterarum palingenesiæ initio, radios quosdam luminis affulgere scientiæ entomologicae incepisse,

per

per paucos tamen justoque langvidiores, ita ut nostris  
deum temporibus in aprico posita videatur. Historia  
insectorum literaria, in tres adposite omnino distribui-  
tur EPOCHAS, quarum prima, agmen dicit seculi  
sui jubar *Conradus Gesnerus*, qui indefessa, quæ ejus  
erat naturam rimandi aviditas, omnes historiæ naturalis  
partes versavit. Dein *Moufettas* natione Anglus, in sce-  
nam prodiens artem insecta tractandi, profiteri paravit.  
Tum *Aldrevandus Italus*, in hac re, multum quidem su-  
davit, at nomine magis, quam omne. His denique  
*Fonstenius* successit, sed ea tantum, quæ priorum dili-  
gentia fuerat elucubrata, expilatum ivit.

Qui secunda Epocha res naturæ perscrutati sunt,  
felicius distinctiusque in horum animalium cognitione  
procedere cœpti sunt; namque historiam illorum, ab  
ovo ipso ad ultimam senectutem perlustrarunt, vitam  
eorum, viatum, immo ipsam, quam mireris, metamor-  
phosin contuentes. Quid, quod exquisitus insecta ef-  
ficta & expieta in ære imprimenda curarunt, & ea qui-  
dem arte, ut imagines agnoscere quivis facile posset.  
Huic peragendæ rei, omnium primi, summo inserviere  
opere *Hoeffnagelius* & *Goedartus*, viri pingendi arte cla-  
ri, quos *Lister* ingenio acutissimus, unacum *Blancar-  
do*, fecutus est, donec *Swammerdamius*, quo laboris pa-  
tientior non fuit alter, hanc rem publice tradendam sibi  
sumeret, in qua laboris multum, plurimum virium  
consumsit, ita quidem, ut sibi haud satis duxerit, for-  
mam Insectorum considerasse externam, sed anatomen  
eorum, ad miraculum usque subtilissimum fecutus sit.  
*Merianam* matronam, belle & festive omnino, curio-  
sam, ea tantum, quæ alit Europa, insecta pervestigasse  
haud contentam, tantus ejusmodi deliciarum permulxit  
atque allexit amor, ut, trans mare infestissimum, Surinamum  
usque Americæ, se insectis delectandi gratia

iter iniverit. *Rajus* mire sedulus in descriptiones insectorum componendas, ultimum senectutis tempus impedit. Quæ habitent in Anglia, insectorum examina, *Albinus* affabre delineavit. *Frischius* denique, quam Germánia habeat insectorum copiam, enodatus excusat:

EPOCHA tertia hanc scientiam, longe abundantiori auxit luce, Nob. Dom. PRÆSES entomologicam disciplinam, in formam systematis redegit, insectis in ordines naturales dispositis, eorumdemque generibus rite constitutis, quæ, pro sua perspicacia, dilucidis & determinatis, adumbravit characteribus; adeo ut, e tenebris quasi evocata, in lucem pleniori processerint gradu. Eodem vero tempore, in hujus disciplinæ laudem & dignitatem, nova effulsa lux, insigne puta Galliæ Decus *Reuumur*, qui hanc doctrinam, a primis principiis & statutis repetens, quodvis insectorum, ab ovo inde, ad sepulcrum usque sequendo, intentiorique oculorum acie, formam, anatomiam, vitam, viatum, & mores eorum perlustrando, immortalitati dudum commendavit nomen. Hunc, Aulae Marechallic Dom. *De Geer*, tenore uno, eademque perspicacia, continuavit laborem. Paulo aliquanto post, *Roesel* Germanus, & laboris & honoris, se præbuit æmulum, æmulis vero palmarum præripuit figuris vivido prorsus colore efformatis, id effecit, ut hæc, cuivis grata acceptaque, fuerit scientia. In hoc deinceps opere, *Wilkes* Anglus, suum consumsit laborem, multa vero a *Roesel* mutuatus. *L'Amiral Hollandus*; insectorum figuræ egregiæ & miræ pulchritudinis, omni diligentia nunc edendas perulgandasque curat. Præter Araneas svecicas Phalænas novas formosissimis figuris ornatas, in lucem edidit Nostras *Clerk*, cujus vero opere novissimo, de Papilionibus Indicis, a Museo Ser. Reginæ mutuatis, vivido colore illustra-

lustratis, quidquam pretiosius, vel splendidius, an quisquam viderit, merito ambigitur. Scilicet ibi quasi coram intuaris Papiliones, & qua formam, & qua numerum, insignes, ea abundantes venustate, qua le<sup>g</sup>issimis longe antecellant flosculis. Quare nihil esset optabilius, quam ut hoc typis divulgaretur opus, cuius quidem pauca admodum exemplaria sunt impressa. Physici, postquam moram, quam objectorum naturalium fecerat multitudo, beneficio disciplinæ systematicæ, concinne & perite constitutæ, tollere incepissent; si interius mox penetrarent & pressius inquirerent in naturæ œconomiam & politiam, operæ pretium se facturos judicarunt; sic enim uberrimam nobis dari occasionem, singularem Summi Artificis, considerandi admirandique œconomiam, &, quod ad præsentem usque diem fere fuisse umbratile, luce palam, intuendi, quomodo infecta animalium minima, quorum officiis remotis, naturæ œconomia torperet, maxima onera laboris sustineant. Fa veritas, qua asseritur, Deum nihil frustra produxisse, sed, quæcunque creaverit, valde fuisse bona, tam oculos, quam animos naturam intuentium abunde satis pavit. Quamvis enim infecta nostræ œconomia s<sup>e</sup>pius officere putemus, eam tamen posthabendam esse œconomia totius universæ, nulli dubitamus. Quemadmodum præterea, medicinam facturos, constitutionem hominis valentis, & naturam corporis, prius cognovisse, haud mediocriter juvabit, ita, si œconomia privatæ ab universali quodammodo turbatae & afflita<sup>r</sup> succurrere velimus, e re certe nobis erit, prius intellectu, unde & a quo fonte incommoda exudent; quem ad recludendum, perperam admittimus, nisi hanc disciplinam diligentius colamus, ea notantes infecta, quæ œconomia nostræ maxime noceant. Quod dum agitur, eveniet simul, ut stupenda naturæ miracula, ad debitam venerationem

tionem piamque admirationem Summi Conditoris, totos nos convertant & rapiant.

Nostra, quæ jam agitur, ætas, tantum in cognoscendis insectis profecit, ut töt sibi habeat insectorum millia perspecta, quot orbis litteratus, ante dimidium circiter seculum, pernosceret centurias. Hæc animalcula adeo ordinate sunt disposita, nominibus genericis, characteribus, differentiis specificis, synonymis denique, in systemate, Naturæ Nob. Dom. Præsidis, editione decima, adeo distincta atque ornata, ut, haud multo post plantis ipsis, nihil, parum certe, cedant, & multitudine, & ordine, quem Botanici haud pauci diu multum & multo labore quæsiverunt. Ante dimidium, & quod excurrit, seculi spatium, viri scientia Botanica, alioquin clarissimi, alto, quod ajunt, supercilio, minimos despicerunt muscos, qui tanto dudum pretio invaluerunt, & aestimatione, ut celeberrimus quisque Botanicus, novum detegere potuisse, insigni sibi honori ducat. Greges insectorum veteribus tanto fuerunt fastidio, quantæ emulationi recentioribus, nova quævis indagandi insecta. Nostris temporibus, quodlibet Europæ regnum, multis, magnique nominis Physicis gloriatur & superbit, qui omnem operam, studium omne, novis copiis scribendis, & insectorum exercitui jungendis, navant. *Scopoli Fauna Carniolica*, una cum *Göiani Fauna Monspeliensi*, quarum utraque quodvis novi & inauditæ nobis promittit, communiter & avide exspectatur. Acta Eruditorum, rebus in hac disciplina, nuper inuentis, passim nitent.

Ad hanc Academiam, in litterarum studiis dum versor, duas, præ ceteris addiscendis, cura & attentione, qua possim, disciplinas proponi exaudio, medicinam scilicet, & Historiam Naturalem. Hujus particula, de Insectis, illis juxta, quæ nondum fuere divulgata, accuratius

ratus notatis, oblectamentum mihi attulit maxime insignie, quod Nob. Dom. Præses, mirifice adauxit, mihi met multas, & eas quidem rarissimas, demonstrando insectorum species, quas, Domino Doctori *Garden*, in provincia CAROLINA, habitanti, nec non Domino Protribuno militum *Dahlberg*, SURINAMO, reduci, Domino *Noordgren*, in insula JAVA habitanti, ceteris, acceptas refert; ut taceam rarissima plurima insecta e PENNSYLVANIA Americes septentrionalis missa ad Museum Nobil. *de Geer*. His naturæ deliciis blandius invitatus, petivi, mihi ut concedetur optio, unicam eligendi centuriam, quam ad obrusam determinatam, perattento litterarum orbi, proponerem, ut, Tirocinium Academicum editurus, hanc simul disciplinam, aliquantulum augerem atque ornarem. Cujus voti spes me eo melior tenet, quo certius constat, centuriam insectorum riariorum, quam Dominus *Isaac Uddman*, eleganter elaboratam, Aboæ, sub Præsidio D. D. *Leche*, edidit, omnibus in amore atque in deliciis fuisse habitem. Verum enimvero, haec dum molior, fatendum est, me, & temporis & chartæ angustiis, adeo fuisse præpeditum, ut descriptionem tam prolixam, tam ornatam, tam denique perspicuam, quam optarem, confidere haud potuerim. Mihi vero, quod habet verbum, prora & pupis ea fuit, ut haecce nova a notioribus, rite distinguerem, & distincta ab oblivione atque a silentio hominum vindicarem. Itaque Tibi, Berevole Lector, centum species Insectorum, Indicorum & exoticorum, oftero, quarum complures dignissimæ sunt, quæ ante oculos argutiores ponantur. Evidem vix credo, quod absque admiratione maxima quisquam visurus sit Cassidam spinificem, Cassidam bicornem, Crysomelam gibbosam, Gryllem brachypterum, Gryllem perspicillatum, Cimicem cristatam, Tripliem paradoxam, & Papilio-nem eclipsin.

COLOE-

## COLEOPTERA

1. SCARABÆUS *Tityus* thorace tricorni: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo.

*Habitat in Pennsylvania. De Geer.*

*Similis Scarab. Herculii, totus levius, glaucus, magnitudine, Scarab. nasicornis. Thoracis cornu maximum, absque dentibus lateralibus, simplicissimum, sed subtus pubescens. Capitis cornu ascendens, et jam simplicissimum.*

2. SCARABÆUS *Molosus* thorace bicorni, capitis clypeo integerrimo: cornu erecto, elytris levibus.

*Habitat in China.*

*Femina: magnitudo Scarab. Rhinocerotis, ater. Clypeus capitis lunatus, integerrimus, margine elevato & stria elevata laterali utrinque. Cornu in medio clypei erecto. Thorax levius, retusus, antice glaber: cornu sive dens versus latera antrorsum ascendens, paulo brevior cornu capitis. Elytra non striata.*

*Similis Scarab. Lunari, sed major; nec clypeus emarginatus; nec thorax supra linea exaratus; nec elytra striata.*

3. SCARABÆUS *surinamus* muticus niger, thoracis incisurarumque marginibus flavis, sterno porrecto.

*Habitat Surinami.*

*Magnitudo Scarab. Stercorarii; totus levius, niger. Caput ovatum, linea longitudinali flava. Thorax levius marginibus lateralibus flavis. Scutellum mediocre. Sternum antrorsum prominens, flavidum. Elytra levia. Abdominis segmenta nigra, margine flava; ultimum supra maculis IV, subtus vero tribus flavis. Pedes nigri. Femora lutea, nigro varia. Digihi incurvati.*

4. SCARABÆUS *capreolus* maxillosum: maxillis exsertis apice tantum furcatis.

*Habitat in America septentrionali.*

*Simillimus Scarab. Cervi capite depresso truncato, sed maxillæ absque dente lateralí. Pedes rufi sunt.*

5.DER-

5. DERMESTES *Gleditsiae* subtomentosus piceus, antennis filiformibus, elytris striatis, femoribus posticis gibbosis.

*Habitat in seminibus Gleditsiae Americes.*

Facies Derm. *Pisorum*, sed duplo maior. Femora postica valde crassa, non tamen vidi saltantem; sunt hæc mutica, nec dentata ut *Der. Pisorum*.

6. DERMESTES *bætris*, obsolete tomentosus subincanus, antennis filiformibus, elytris læviusculis, femoribus posticis gibbosis. *Jacq. hist. t. 170.*

*Habitat in semine Bætris Americes.*

Simillimus Derm. *Gleditsiae*, sed Elytra vix manifesta striata. Color totus glauco subincamus. Thorax absque punctis excavatis; ceterum simillimus. Femora colore corporis, nec ferruginea.

7. CASSIDA *spinifex* ferruginea, elytris angulo antico spina porrecta.

*Habitat Surinami Dahlberg.*

Corpus fere triangulare, ferrugineum. Thorax longitudine capitis, antice attenuatus, angulis, posticis in spinam transversam produetis. Elytra levia, antice ad suturam angulata: angulis lateralibusque exsertis in spinam antrorsum porrectam, longitudine thoracis. Latera elytrorum utrinque foramine ovato pervia in femina; in mare vero elytra nec spina, nec foramine gaudent.

8. CASSIDA *bipustulata* viridis, elytris maculis lateribus duabus sanguineis.

*Habitat Surinami Dahlberg.*

*Corpus supra viride, subtus nigrum.*

Thorax parum emarginatus. Flytrorum margo lateralis maculis duabus sanguineis, et jam in pagina inferiori cœrulea conspicuis.

9. CASSIDA *bicornis* cyanea, elytris angulo antico spina truncata.

p 393

*Habitat Surinami Dabberg.*

*Major; tota cyanea. Elytra excavato-punctata angulo exteriore sive antico in spinam linearem truncatam producto. Thorax antice emarginatus.*

10. *CASSIDA leucophaea testacea margine punctisque flavis.*

*Habitat Surinami.*

*Minuta & reliquis nostratis minor. Margo clypeum thoracem & elytra cingens, totus flavus. Discus elytrorum thoracisque testaceus sive staphyleus: punctis majusculis plurimis, luteis, elevatis. Elytra etjam punctis excavantis, vix conspicuis striata.*

11. *COCCINELLA sangvinea elytris sangvineis immaculatis, thorace maculis nigris.*

*Habitat Surinami.*

*Magnitudo ut minoribus nostratis. Thorax niger, marginibus pallidis. Punctum pallidum utrinque versus latera thoracis. Elytra verissime sangvinea. Pectus, abdomen, pedes atri.*

12. *COCCINELLA Surinamensis coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque nigris.*

*Habitat Surinami.*

*Magnitudo Coccii: 7 punctata. Caput, Thorax Scutellum, pectus, Pedes nigra. Elytra & Abdomen rubra. Caput minus quam in Europaeis.*

13. *CHRYSOMELA gibbosa ovata nigra, elytris testaceis nigro punctatis: fascia media posticaque nigra.*

*Habitat Surinami.*

*Corpus magnum. Coleoptra medio versus futuram valde gibbosa.*

14. *CHRYSOMELA undulata ovata rufa, elytris fasciis tribus atro caruleis undulatis.*

*Habitat in Java.*

*Magnitudo Chr. Tanaceti: Thorax rufus, medio atro-*

*tro-cæruleus.* Elytra rufa: fascia prima latiori undata ad futuram antrosum porrecta; secunda angustior, magis undulata; tertia in apice ad futuram coiens cum secunda. Antennæ, Pedes & antica Abdominis atro-cærulea.

15. CHRYSOMELA castanea ovalis castanea, elytris margine exteriore testaceo.

Habitat Surinami.

Media Thorax linea longitudinali & margine exteriore, uti etjam elytra, testacea.

16. CHRYSOMELA Gorteræ subcylindrica atra glaberrima, thorace elytrisque punctis IV flavescentibus.

Habitat ad Cap. Bo. spei in Krameria.

Magnitudo & statura Chrys. tota atra, glabra. Thorax vero nitidus. Elytra vix manifesta striato-punctata, puncta flavescentia IV in singulis majuscula. Quorum II remota versus futuram interiorem: altero ad basin, altero remoto ab apice; Tertio ad marginem exteriorem versus basin, reniformi, quarto ad apicem elytri.

Thorax glaberrimus, nitidus: punctum ovatum ad singulum latus; tertium ad basin, rotundum quartum ad scutellum, oblongum minus, magis fulvum. Capitis frons puncto rotundo. Omnes maculæ luteæ; Pedes nigri & Antennæ corpore breviores.

17. CHRYSOMELA ostopunctata oblongiuscula nigra, thorace testaceo, elytris punctis quatuor flavis.

Habitat Surinami Dablberg.

Media. Elytrorum maculæ quatuor, quorum I. parva; II. III. parvæ, pares; IV major, ad apicem. Abdomen testaceum.

18. CHRYSOMELA punctatissima oblongiuscula viridi ænea punctatissima, pedibus ferrugineis.

Habitat Surinami.

Magnitudo Cimicis, sericea, viride-ænea, punctis quasi atomis minimis confertis adpersa.

10391  
19. CURCULIO *Oryzae longirostris oblongus niger*, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.

*Habitat in Oryzae seminibus ab exteris regionibus allatis.*

Magnitudo grani oryzæ, totus niger sive picco-niger, punctis cavis scaber, oblongus subitus picceus est. Elytra striata, in singulis maculae due ferrugineæ, quarum prior ad basin elytri, posterior ante apicem elytri.

20. CURCULIO *surinamenus longirostris cyaneus*, elytrorum lateribus antice gibbis.

*Habitat Surinami.*

Magnitudo Pisi. Elytra postica contractiora.

21. CANTHARIS *bicolor rubra*, elytris postice violaceis.

*Habitat in Senegal.*

Statura omnino Centharidis rubræ, sed dimidia Elytrorum pars postica violacea nitidissima. Antennæ nigrae sunt.

22. CICINDELA *æquinoctialis flava* elytris fasciis duabus nigris latis.

*Habitat Surinami.*

Media. Totum corpus flavum. Oculi nigri, minus prominuli. Thorax longitudinali linea excavata. Elytra obtusissima, singula striae decem elevatis acutis; Fasciæ duæ totam fere alam tegentes, undatae.

23. CICINDELA *carolina cyanea nitida*, elytrorum apicibus antennis pedibusque flavis.

*Habitat in Carolina Garden.*

Corpus magnitudini Cicind. campestris, viridi-cæruleum, æneo-nitens; at os, oculi, antennæ, palpi, pedes toti & elytrorum apices flava. Elytrorum apices flavi macula sublunata laterali.

24. ELATER *ligneus ferrugineus*, elytris mucronatis.

*Habi-*

*Habitat Surinami Dablb erg.*

Corpus fere majus nostratisbus, colore subferrugineo & fere ligneo. Antennæ vix thorace longiores, nigræ, excepto primo articulo. Thorax oblongus admodum, medio longitudinaliter glabro. Elytra substriata, quasi costa distincta longitudinali pallidiore, & margine laterali simili; apices elytrorum pallidiores valde macerati.

25. MELOE Chrysomeloides.

*Habitat Surinami.*

Corpus chrysomelæ, totum viridi-cærulescens, subtus nigro-subviolaceum. Antennæ nigræ. Palmæ nigræ.

26. TENEBRIÖ Gigas alatus ater elytris striatis thorace lævi.

*Habitat Surinami.*

Magnitudo Scar. Cervi. Thorax marginatus, non nitens. Elytra obtusa, striata satis profunde. Antennæ clavatae, longitudine thoracis.

HEMIPTERA.

27. GRYLLUS unicornis M. thorace lævi, elytris viridibus alis apice striatis, vertice subulato, antennis pectinatis.

*Habitat in China.*

Magnitudo & statura G. M. Religiosi vertex capitis in spinam antice capite longiore proeminens, Antennæ longitudine thoracis, utrinque pectinatae. Thorax linearis, lævis, fere triqueter. Elytra viridia, oblique venis striata. Alæ, virgescentes, elytris paulo longiores apice fuscō striato. Abdomen plicatum. Tibiæ antice dilatatae, spinulis ciliatae, majoribus spinis interstinctæ. Palmæ bis ciliato spinulosa. Tibiæ 2:di 3:ii paris sub apice lacinulam habent.

28. GRYLLUS M. carolinus thorace subciliato subcarinato, elytris albidis fuscō-nebulosis.

*Habitat in Carolina.*

Statura G. M. religiosi. Thorax oblongus, fere tri-

p 397

queter lateribus scabris. Elytra alaque abbreviatæ, albido fuscoque nebulosa. Pedes antice subtus dupliciter spinoso-ciliati.

29. GRYLLUS M. irroratus thorace lævi subcarinato, elytris viridibus punctis ferrugineis vagis.

*Habitat* in Carolina.

Similis *G. M. religiosi*, sed elytra & Alæ abdomine breviora, 3. s. 4. punctis ferrugineis absque ordine digestis, apicibus flavescens. Femora & Tibiæ antice a latere postico dupliciter spinoso-ciliata.

30. GRYLLUS Lunus T. thoracis segmento posteriore crista semiorbiculata elytris nigris fasciis albis.

*Habitat* Surinami Dablberg.

Major. Caput ferrugineum. Thorax ferrugineus segmento postico carinato Christa compressa, valde elevata, semiorbiculari. Antennæ flavæ. Pedes lutescentes, læves. Elytra nigra, albo obscure reticulata fasciis plurimis albis inæqualibus. Alæ nigræ.

31. GRYLLUS Cinerarius T. antennis longissimis, elytris deflexis.

*Habitat* in Brasilia De Geer.

Antennæ longissimæ. Thorax cinerascens postice lobo rotundato. Elytra lateralia, deflexa paginis verticalibus: Costa recta venis marginalibus; margine superiore dimidiato ovato: inferiore lanceolato. Pedes cinerascentes.

32. GRYLLUS brachypterus M. elytris ovatis angulatis brevissimis, alis longitudine abdominalis.

*Habitat* Surinami.

Corpus fuso fuliginosum. Caput supra obscure ferrugineum. Thorax subelongatus, supra scaber, brevior quam in reliquis *Mantis* speciebus. Elytra brevissima omnium, ovata, obtusa, angulo humerali exstantia, supra cinerea, sub angulo ad latera nigra. Alæ obscure nebulosæ, convolutæ & plicatæ, longæ. Notabilis elytris brevissimis.

33. GRYLLUS *javanus* T. *cinerea*, Elytris fuscō maculatis.

*Habitat in Java.*

Antennæ corpore paulo breviores. Thorax compressus, dorso planus, postice rotundatus, lateribus fuscescens. Abdomen ovatum. Alæ cinereæ ut totum corpus, superiores maculis aliquot lunatis, longitudinaliter digestis, aliisque paucis fuscis. Ensis abdomine fere brevior.

34. GRYLLUS *perspicillatus* Alarum rudimentis ocello atro oculis aureis.

*Habitat in Indiis De Ger.*

Antennæ filiformes, corpore breviores. Corpus subtestaceum. Alarum elytrorumque loco laminula ovata; minima ocello orbiculari atro. Utrum alas acquirit ac larva sit ignoro; & facie perfecta esse videtur.

35. GRYLLUS *spinulosus* L. thorace spinis munito cincto, corpore aptero.

Edw. av. 2. p. 161. t. 285. f. 3, 4, 5. *Habitat in Indiis.* Gryllos inter maximos numerandus. Antennæ filiformes, longitudine fere corporis. Thorax testaceus, spinis numerosis muricatus & postice margine spinoso cinctus. Abdomen supra nigrum maculis testaceis tessellatum. Alæ nullæ.

36. GRYLLUS *succinctus* L. *cinereus*, thoracis carina marginaque postico elytrorumque margine dorsali flavis.

*Habitat in Java.*

*An Gryllus Elephas bujus larva?*

Carina Thoracis partim elevata tribus incisuris notabilis linea sulphurea a vertice ab caudam & transversa per marginem posticum thoracis.

37. GRYLLUS *brevicornis* A. *viridis*, capite prominuto, antennis compressis longitudine thoracis.

*Habitat in America septentrionali De Geer.*

*Similis Europæis, sed antennæ longitudine tantum thora-*

*thoracis, compressæ. Caput antice subconicum, sed vix manifeste.*

38. *GRYLLUS convolutus* A. thorace rotundato, corpore nigro nebuloso, elytris convolutis albidis.

*Habitat Surinami.*

*Simillimus Gryllo campestris, sed triplo minor. Elytra convoluta simul, ut fere subulata. Cauda setis duabus.*

39. *CICADA flammæa* fronte rostrata adscendente tereti truncata.

*Habitat - - - De Geer.*

*Minor Ci. Candelaria, tota superius sordide ferrugineo cineroscens. Elytra ad apices a pagina superiore punctis obscurioribus: tota vero striæ oblique secant, ut in serpentum cule.*

40. *CICADA truncata* iridi-albicans, alis deflexis compressis, postice truncatis.

*Habitat in Java.*

*Magnitudo Perlæ. Tota viridi-albicans, alis deflexis valde compressis, reticulato striatis, postice transverse truncatis.*

41. *CIMEX ictericus* ovatus, supra incarnatus sub-tus flavus, thorace acute spinoso.

*Habitat in Carolina.*

*Medius. Caput, thorax Elytra incarnata. Caput prominens. Thorax argute utrinque spinosus. Oculi nigri, minutissimi.*

*Elytra subtus sanguinea. Alæ hyalinæ, totus subtus & Fedes flavi.*

42. *CIMEX cristatus*, rostro arcuato, antennis setaceis fusco ferrugineis, scutello cristato.

*Habitat in Carolina Garden.*

*Major ullo Europæo. Antennæ rubræ, setaceæ, longitudinali corporis. Caput minimum, collo angusto; Rostro incurvato. Thorax rotundatus utrinque antice spinula prominens. Scutellum thorace triplo magis, nigrum, carinatum Crista elevata, octo-dentata; apice bidentatum; lateribus angula-*

*gulatum.* Elytra ferruginea. Tibiae rufæ. Abdomen dilatatum; sub aro puncta aliquot coccinea, forte sexus nota.

43. CIMEX scaber oblongiusculus testaceus, thorace angulato-spinoso, femoribus denticulatis, alis nigris.

*Habitat in Java.*

*Corpus tenui testaceum, scabrum. Alæ membranaceæ, nigrae. Antennæ corpore paulo breviores, IV articulis. Thorax utrinque angulo recto subspinosis, & spinis bis elevatus. Femora omnia apice spinis instruta vix manifestis. Femora 1, 1, & 3, 3, subtus denticulata tribus denticulis.*

44. CIMEX luccinetus oblongus thoracis e'lytrorumque margine exteriore femorumque basi sanguineis.

*Habitat in Pensylvania De Geer.*

45. CIMEX bæmorrhous oblongus niger, thorace spinoso, abdome rufo, elytris testaceis punctis linearibus quinque nigris.

*Habitat in America. De Geer.*

*Totus niger excepto abdome rufo. Elytra testacea punctis sive lineolis duabus & tribus nigris.*

46. CIMEX nobilis scutatus viridi-auratus nigromaculatus.

*Habitat in Java.*

*Magnitudo Abis Bombylii; ovatus. Caput viridi-aeneum. Thorax viridi-aeneus maculis 7 fusco-cærulifcentibus. Scutellum viridi-aeneum, tegens totum dorsum maculis trium parium cœruleis. Corpus subtus rufo-aeneum. Abdominis segmenta singula subtus utrinque maculis duabus cœruleis. Antennæ fuscæ, corpore breviores. Femora omnia sanguinea. Tibiae cœruleæ. Alæ fuscifcentes: superiores costa marginali viridi-aenea.*

47. COCCUS capensis. ovalis subtomentosus conico-gibbus anice operculato.

*Habitat ad Cap. B. spei in ramis Gnapbalii muricati.*

*Simillimus Cocco Aonidum, a quo differt quod non minus*

*nus orbiculatus*, sed magis ovalis. 2:0 dorso magis gibbo & fere conico. 3:0 superficie non glabra nitida, sed subtomentosa. Apex abdominalis operculo mudo tectus; dum, operculum discedit foramen tomento repletur.

48. TRIPS paradoxus tulca, elytris abbreviatis, antennis pectinatis fissilibus aliformibus.

*Habitat in China Osbeck.*

*Magnitudo minoris Culicis. Tota fusca. Alæ fuscæ, latiusculæ, Elytra lanceolata dimidio breviora. Antennæ longitudine thoracis, obtusissimæ, fuscæ, basi albide, fissiles in 8 vel 9 partes membranaceas. Dubius generis & singulare insectum.*

#### LEPIDOPTERA.

49. PAPILIO *Aegiphilus* E. T. alis fuscis viridescente maculatus; subtus subincarnatus maculis virescentibus rarioribus.

*Habitat in China.*

*Magnitudo Pap. Apollinis. Alæ omnes supra nigricantes maculis numerosis luteo-virescentibus, quarum corpori propiores magis longitudinales ad ductum corporis. Subtus omnes subincarnatae, maculis rarioribus, minoribus, virescentibus, quarum una alterave in alis posticis subocellata centro nigro. Similis Agamemnoni.*

50. PAPILIO *Polydorus* E. T. alis subcaudatis nigris concoloribus; posticis macula alba suturis sexfida lunulisque septem rubris.

Clerk. t. 33. f. 2.

*Habitat in India.*

*Media. Alæ omnes nigrae. Posticæ concolores, vix caudatae, sed potius angulatae, margine lunulis septem nigris, subtus saturioribus; in media macula alba suturis nigris distincta in maculas sex, quarum anterior major bifida. Thoracis latera & abdominalis incisurae ferrugineæ. Differt a P. Polyte, quod margo alarum careat interstitiis albis; quod macu-*

*macula alba anterior reliquis major; quod corpus sanguinolentum; quod lunulæ posticæ fere reniformes, nec angusto lunares.*

51. PAPILIO *Orontes* E. G. alis caudatis nigris albido-virescente fasciatis, caudis albis.

Clerk t. 25-f. 1.

*Melius in hac genere. Alæ superiores integerrimæ: supra nigrae fasciis duabus, virescentibus, interiore dilutiore latiore. Subtas nigrae fasciis tribus, albido-virescentibus, latioribus, bascos maxima. Posticæ valde dentatæ & breviores, cau late: supra fascia lata dilute virescente macula que inter singulum dentem dilute virescente. Subtas dilute virescentes fasciis duabus saturate virescentibus præter puncta aliqua virescentia ante fascias; caudæ albide, obtuse, valde distantes. Abdomen subtus luteum.*

52. PAPILIO *Phidippus* E. G. alis subcaudatis fuscis, subtus fasciis albidis, ocellis duabus caudaque ocellis geminis.

*Habitat in Java.*

*Magnitudo 2. Antennæ filiformes, ferrugineæ. Alæ omnes supra fuscae, immaculatæ, versus marginem exteriorem obsoletiores; subtus omnes grisecentes, fasciis transversis, albidis grisecentes, postice fasciis transversis albidis. Posticæ subtus ocellis duobus: uno ad angulum exteriorem: altero versus angulum posticum. angulus posticus apice fere in caudam obtusam definit, in qua ocelli duo, parvi, approximati, cœrulei.*

53. PAPILIO *Medon* E. G. alis supra nigris: primoribus fascia lutea apiceque albo, posticis disco cœrulecentibus. M. R.

Clerk t. 28. f. 1.

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo 2. f. 3. Alæ primores supra atræ, apice alba: fascia lutea. Posticæ nigrae, supra disco cœrulecentes. Subtas omnes alæ cinerascentes, punctis tribus nigris ad ba-*

*fm.* Primores fascia diuidata alba, apiceque alba. Posticæ fascia demidiata e lunulis 5 albis & alia posteriori e maculis 6 fulvis.

54. PAPILIO *Mnere* H. alis oblongis integerrimis nigris basi fulvis: primoribus fascia maculisque tribus flavis.  
*Habitat in China.*

Alæ primores nigræ, cocolores basi fulva maculis nigris; in Medio fascia flava; ante apicem funda 3 flava; Margo tenuior niger est. Inferiores alæ fulva nigra linea fulva a basi fere ad apicem excurrente. Subtus nigræ, entice flava nigro maculatæ, margine postico tenuissimæ albo punctatæ.

55. PAPILIO *Aëdea*, H. alis oblongis integerrimis albo maculatis: superioribus virentibus; inferioribus fascia flava.

*Clerk t. 4. f. 2.*

*Habitat in India. M. R.*

Thorax cœrulescens. Abdomen flavescens. Alæ superiores supra virentes fasciis tribus ex maculis albis sparsis inæqualibus. Subtus medio cœrulecentes, albo maculatæ, fascia flava. Inferiores cocolores nigro-cœrulecentes maculis circiter 5 albis & lata fascia flava in medio.

56. PAPILIO *Melite* H. alis flavis: superioribus supra nigris, lineis duabus fasciaque flavis.

*Clerk t. 44. f. 5.*

*Habitat in Indiis.*

Magnitudo fere *P. Urticae*. Alæ primores supra nigræ: Maculæ ducæ, oblongæ ad basin, quarum anterior lanceolatus; posterior marginis interioris; fascia in medio alæ flava, que marginem interiore non tangit. Subtus alæ marginæ antico flavo. Posticæ supra flavae margine postico nigro.. Subtus flavae strigis duabus, fuscis, obfoletis.

57. PAPILIO *Scylla* D. alis flavis: primoribus supra albis margine nigris, posticis margine nigro-punctatis.

*Habiz.*

*Habitat in Java.*

*Media:* Alæ primores supra albo, margine exteriore nigro; subtus flavæ, fusco irreratæ & puncto fusco ocellari in medio. Posticæ supra flavæ, margine postico punctis 5 nigris. Subtus flavæ fusco irreratæ margine postico punctis 7 nigris, scilicet in alterna costa unico. Pedes flavi, Oculi brunei.

58. PAPILIO *Polybe* D. alis integerrimis: posticis dentatis: supra fusco virentibus, subtus viridi sericeis venis atris.

*Habitat.*

Alæ primores supra fuscō-virescentes, sericeæ; in medio anteriore macula gemina undata nigra. Subtus parte demidata viridi-sericeæ venis nigricantibus; occultata vero cœruleo-sericeæ: Posticæ supra disco virescentes, sericeæ; subtus virides sericeæ venis atris ramosis; margo interior cœruleus & postice lobatus dentibusque cœruleis; maculis nigris. Abdomen subtus luteum. Antennæ nigrae, elevatae.

59. PAPILIO *Philea* D. alis integerrimis angulatis flavis; primoribus macula; posticis limbo luteis.

Roes. in: 4. t. 3. f. 5.

*Habitat in Indiis.*

60. PAPILIO *Philomela* D. F. alis integerrimis fuscis; primoribus ocello uno, posticis ter duabus.

*Habitat in Java.*

Similimus Pap. Hyperanto, sed triplo minor, s. Argi magnitudine. Alæ integerrimæ, concordes: supra fuscæ; subtus nebulosæ, strigis transversis vix manifestis. Primores utrinque oculo majere ad angulum exteriorem. Posticæ vero ocellis sive potius ter duabus versus marginem posticum, quorum duo minutissimi; sed bi omnes in pagina superiore minus evidentes.

61. PAPILIO *Fleðo* D. alis integerrimis rotundatis luteis margine nigris; posticis subtus ocello sesqui-  
atero albo. Post. 72.

Pet. gaz. t. 9. f. u.

*Habit.*

p 405

*Habitat ad Cap. B. spei.*

*Magnitudo media.* Alæ primores supra saturate luteæ puncto nigro in disco, & margine postico latissime nigro. Subtus flavæ puncto nigro; limbo postico virescenti-luteo, cum maculis tribus nigris trigonis: secundariae supra luteæ, limbo postico nigro. Subtus luteæ puncto in medio albo & adjecto minore, margine ferrugineo cinctis. Limbus posticus virescens. Anteanae & Pedes sanguinici.

62. PAPILIO *Helcita* D. alis integerrimis concoloribus luteis limbo nigro punctis septem albis.

Clerk t. 39. f. 4.

*Habitat in Indiis M. R. V.*

*Magnitudo Pap. Cardamines.* Alæ luteæ, sed extiore ambitu nigricantes, que nigredo undatum distinguuntur suo margine a disco luteo, in singulæ alæ limbo nigro puncta majora circiter septem albæ sunt: sed in primoribus fere confluent. Corpus supra nigrum dorso punctis albis; subtus luteum thorace punctis albis.

63. PAPILIO *Idea* D. alis integerrimis rotundatis albis venis maculisque nigris: primoribus margine nigro albo punctato.

Clerk t. 38. f. 1.

*Habitat in Indiis. M. R.*

*Major reliquis omnibus Danais.* Alæ albæ venis lati nigris anastomosantibus. Anteriores alæ exterius lato margine nigro, in quo series ex punctis albis; ad anum 2. quasi palpi flavi.

64. PAPILIO *Strilidore* D. alis integerrimis nigris: primoribus albo maculatis; posticis basis subtusque albis.

*Habitat in Philadelphia. De Geer.*

*Magnitudo media.* Alæ primores macula alba transversa in medio versus apicem. Alia ad marginem tenuiora. Puncta alba 2. ad apicem; 2. fere in medio; nonnulla

nullæ ad marginem tenuiorem. Posticæ macula alba magna versus basin; at omnes subtus albæ venis nigris. Thorax albo punctatus.

65. PAPILIO *Eurydice* D. alis fuscis: subtus primoribus ocellis quatuor, posticis sex.

*Habitat in Philadelphia. De Geer.*

Similis *Pap. Hyperante*. Alæ integrimæ, supra fuscæ; posticæ obsoletius ocellatæ. Primores subtus ad marginem posteriorem ocellis quatuor nigris pupilla alba. Posticæ ocellis quinque intra marginem posticum & sexto remotori.

66. PAPILIO *Demophile* D. alis albidis fasciis duabus margineque fuscis; posticis subtus subincarnatis.

*Clerk t. 28. f. 4.*

*Habitat in Indiis.*

Statura *Pap. Brassicæ*. Alæ integræ vel parum repandæ. Superiores supra fasciis duabus albis, utroque apice attenuatis. Subtus pallidiores, fuscæ faciis duabus albo vivescientibus, interiore lata. Posticæ supra fuscæ disco albo inæquali. Subtus subincarnatæ angulo antico croceo.

67. PAPILIO *ecclipsis* D. alis integrimis angulatis flavis: primoribus punctis duobus maculaque nigris, posticis ocello cœruleo.

*Pet. gaz. 16. t. 10. f. 6. bona.*

*Habitat in America Septentrionali De Geer.*

Facies exactissime *Papil Rhomni*. Sed alæ primores in medio macula oblonga fuscæ, intra quam 2. puncta nigra. Posticæ puncto nigro & ad marginem exteriorem ocellus cœruleus.

68. PAPILIO *Canace* N. alis angulatis supra cœruleis fascia dilutiori; subtus luteo virideque marmoratis.

Statura *Pap. Atalantæ*. Alæ supra fuscocœruleæ, dentate, angulatæ fascia cinnamoni cyanea, sive dilute cœrulea:

*primi-*

p 407

primores fasciæ bac interruptæ & pone apicem puncto albo; subtus marmoratae luteo viridescente nebuloso. In medio omnium subtus punctum angulatum luteum.

69. PAPILIO *Hypermenestra* N. alis nigrantibus; subtus ferrugineo nebulosis; Posticæ postice ferrugineis puncto albo.

*Habitat in Java.*

*Mediterranea.* Alæ obsolete dentatae, supra nigrae. Sed postice limbo postico ferrugineo. Subtas omnes ferrugineo nebulosæ; postice in medio puncto niveo.

70. PAPILIO *Talans* D. alis rotundatis fasciæ: primoribus maculis albis basique sanguineis; posticis area alba M. R.

*Clerk t 45. f. t.*

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo & facies* P. Nelei 187. Alæ subconcolores: macula baseos alarum anticarum tartum a latere superiore conspicua; area alba posticarum supra, in medio, ovata; subtus, magis ad basin, angulata.

*An sexus tantum Nelei?*

71. PAPILIO *Ariadne* N. alis supra subferrugineis strigis nigris undulatis; primoribus antice puncto niveo.

*Habitat in Java.*

Statura Pap. C. albi. Antennæ nigrae vix clavatae. Alæ angulato-denticulatae: supra testaceo-luteæ s. f. 6. strigis nigris, undulatis. Primores utrinque puncto albo ad marginem anticum, fere in medio. Omnes margine postico albæ, subtus concaviores quidem, sed fasciis ferrugineis cinerascentibusque nebulosæ.

72. PAPILIO *Atlites* N. alis cinerascentibus; supra primoribus ocellis senis, posticis quinis: quibusdam cæsis.

*Habitat in Asia Clerk.*

*Cordus cinereum.* Antennæ fuscae. Pedes pallidi anticus muticis. Alæ primores; supra cinerascentes ad mar-

*marginem anticum lineolæ transversæ, fuscæ, undatæ; intra marginem exteriorem ocellis 6, quorum 4 ♂ 6 cæci. Posticæ supra cinerascentes, intra marginem exteriorem ocelli 5, quorum 3 ♂ 4 cæci; Intra ocellos ♂ marginem linei 2 fuscæ, repanda. Subtus omnes pallidæ Linea fuscæ, transversa, repanda; intra priorem lineolæ fuscæ subundulatæ: extra lineam in singula ala ocelli 2 ♂ puncta aliquot in eadem linea.*

73. PAPILIO *Fatrophæ* N. alis angulatis pallidis lineis undatis maculisque: primoribus puncto unico: posticisque duobus nigricantibus. M. R. 33.

Merian. Surin. 4. t. 4.

*Habitat in Fatropha Americes.*

74. PAPILIO *Dido* N. alis oblongis dentatis subconcoloribus nigris viridi maculatis; posticis fascia maculisque septem transversis.

Merian. Surin. 3. t. 3.

Clerk t. 30. f. 2.

*Habitat in America Meridionali.*

*Statura alarum Pap. Heliconiorum, sed posticæ subdentatae. Primores basi macula longitudinali; Posticæ fascia lata bases & fascia e maculis omnibus cœrulecentibus.*

75. PAPILIO *Hyperbius* N. alis dentatis luteis; primoribus extimo nigris: fascia alba; posticis subtus argentatis quinque ocellatis.

*Habitat in China. Clerk.*

*Structura. Pap. Papbiæ, sed duplo major. Alæ primores concolores, versus basin luteæ, versus apicem nigræ: nigra area versus apicem subtus pallidior maculata argentata. Fascia alba in area nigra utrinque, cum puncto albo. Area lutea utrinque, lituris 4 transversis ad costam & postice punctis 4 nigris. Alæ posticæ supra luteæ punctis 15 s. 18 nigris; margo posticus atter lunulis duplicatis cœruleis. Subtus hæ alæ pallidiores five virescenti griseæ, nigro argenteoque obsoleto nebulose, cum ocellis 5. pupilla argentea: in disco postico intra marginem posticum linea repanda nigra.*

76. PAPILIO *Cydippe* N. alis dentatis supra nigro-cærulescentibus albo maculatis; area communis rubra; subitus marmoratis.

Clerk t. 36. f. 1.

*Habitat in India.*

Magnitudo Pap. *Populi*: Alæ supra omnes nigræ; cæruleo resplendentes; ad marginem exteriorem lunulæ linearæ, albæ, dupli serie. In anticis plaga transversa ex maculis albis. Area communis alarum omnium in medio ad basin rubra. Subitus omnes marmoratae e testaceo maculis cœruleoscentibus & albis. In posticis series duplex e maculis nigris albo margine.

77. PAPILIO *Peleus* P. alis integerrimis utrinque atris primoribus fascia linearis rubra, exteriusque luteo maculatis.

Clerk t. 45. f. 5.

*Habitat in Indiis.*

Habitus ♂ omnia Pap. *Pherecli* 155. sed extra fasciam rubram maculæ confluentes lutescentes.

*An femina Pherecli?*

78. PAPILIO *Aetorion* P. alis subcaudatis fuscis superioribus fascia lutescente exteriore maculaque cœrulea postica; subitus ocello.

Clerk t. 36. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

Magnitudo media vix P. *Urticæ*. Alæ margine respondæ: supra fuscæ. Primores fascia, versus apicem, testacea cum punctis duobus obsoletis in apice; margo posticus macula ovata cyanea. Posticæ fuscæ subcaudatæ. Subitus omnes testacea griseo-undulatae. Primores ocello ad apicem. Posticæ macula rotunda, parva, pallida, intra marginem anticum.

79. PAPILIO *Arcius* alis caudatis nigritis: fasciis duabus hyalinis, caudis cœruleis.

Clerk. t. 46. f. 6.

*Habi-*

*Habitat* = = M. R.

Magnitudo *Sphing: Statices*. Alæ primores concolores, atræ, ovatae, integerrimæ fasciis duabus hyalinis; altera in medio; altera basin versus. Alæ posticæ atræ, desinentes in caudam ipsa ala longiore, azuream, medio fascia hyalina transverse longitudinali. Macula minima coccinea ad basin anteriorem ale primoris & alia paulo major ad angularum ani. Antennæ clavatae, atræ. Sub abdomine et jam rubedo appetet.

80. PAPILIO *Augias* P. alis integerrimis divaricatis fulvis; fascia obliqua margineque postico nigris.

*Habitat* in Java, China.

Simillimus *Pap. Commati*; sed paulo major. Antennæ capitatae terminatae spina curva. Alæ subconcolores; Primores luteæ, in medio fascia nigra, obliqua, quæ marginem exteriorem non tangit, & margine postico latus nigro ex maculis constructo. Posticæ nigricantes maculis duabus magis fulvis: anteriore minore. Subtus omnes flavæ nigro irroratae, nec subtus albis quadratis maculis adspersæ ut *Comma*.

81. SPHINX *sexta* alis integris omnibus margine postico albo punctis, abdomine ocellis duodecim fulvis.

*Broun. Jam:* 438. t. 43. f. 17.

*Habitat* in Carolina, Jamaica.

Statura *Sphin. convolvuli*. Corpus cinereum. Alæ cinereæ margine postico septem punctis albis. In alis superioribus punctum album versus latus exterius. Abdomen cinereum ocellis 6 parium, fulvis, annulo nigro.

82. PHALÆNA *gangis*, alis superioribus subincarnatis litura longitudinali nigra postice abrupta, ab domine supra sangvineo.

*Habitat* in Java.

Magnitudo *Phal. Plantaginis*, antennas non vidi. Caput rubrum. Alæ superiores supra pallide incarnatae. Sutura longitudinalis nigra a vertice ad scutellum ducta. Litura in singula ala superiore nigra longitudinalis, sed versus

*posteriora oblique interrupta. Alæ ♂ corpus subtus fuscum. Abdominis dorsum sanguineum distinctum a fuso punctis nigris.*

83. PHALÆNA *Pbalonia* N. spirilinguis, alis flavis: posticis concoloribus disco flavis lunula ambituque nigro.

Clerk t. 48.

*Habitat in Indiis.*

*Media. Alæ patulæ flavæ. Superiores supra colore vario modo in diversis variegato. Subtus medietate exteriore nigricantes fascia alba. Inferiores concolores flavæ limbo lato nigro margine quasi albo dentato & in medio lunula nigra.*

84. PHALÆNA *beteroclita* N.? spirilingvis, alis superioribus angustioribus fuscis maculis 3 flavis, posticis flavis extimo fuscis.

*Habitat in Indiis M. R.*

*Magnitudo media. Antennæ desunt. Alæ superiores lanceolatae, obtuse, fuscæ: fascia in medio flava, quæ non tangit marginem posticum; alia a basi versus transversalem lanceolata. Tertia a basi ad medium marginis postici. Subtus albe excepto margine antico flavo. Inferiores latissimæ flavæ margine postico fusco. Subtus flavæ. Thorax dorso nigricans.*

#### NEUROPTERA.

85. LIBELLULA *carolina*, alis hyalinis: posticis tota basi fuscis.

*Habitat in Carolina Garden.*

*Media. Alæ superiores lanceolatae: inferiores versus basin dilatatae; omnes hyalinæ, reticulatae vasis. Ante marginem anticum omnes macula fusca. Posticæ alæ tota basi, ab anteriore ad posteriorem marginem & quidem ad  $\frac{1}{3}$  totius fere alæ, sunt fuscæ rufo reticulatae. Thorax griseus, immaculatus. Abdomen ferrugineum segmento ultimo nigro.*

86 LIBELLULA *variegata* alis patentibus fuscocærulecente flavoque variegatis apice hyalinis. M. R. L. W.

*Habi-*

*Habitat in Indiis.*

Magnitudo *Libell. vulgaris*. Oculi brunei; Thorax viridis. Abdomen supra nigricans linea viridi. Alæ variegatae ex cœruleo & luteo; sed cœruleus color antice magis fuscus; apices hyalini magis in anticis, quam posticis. Alæ posticæ multo latiores sunt. In primoribus versus apicem antice litura illa libellulis communis.

87. **HEMEROBIUS peetinicornis** antennis pectinatis, alis albido signaturis nervisque fuscis albo articulatis.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

Magnitudo inter maximos. Antennæ nigrae uno tantum latere pectinatae.

**HYMENOPTERA.**

88. **SIREX columba** abdomine mucronato nigro fasciis testaceis.

*Habitat in America. De Geer.*

*Affinis Sir. Gigantes.* Abdomen in apicem etjam ex-eunte. Caput & antennæ testacea. Thorax subvillosus, testaceus & nigro varius. Pedes flavi.

89. **SPHEX pensylvanica** abdomine plicato atro, alis subviolaceis.

*Habitat in Pensylvania De Geer.*

Magnitudo *Crabronis*, totus niger. Thorax villosus. Abdomen thorace minus.

90. **SPHEX cœrulea** cœrulea, alis fuscis.

*Catesb. Car. p. 5. t. 5.*

*Habitat in Philadelphia De Geer.*

Pedes atro cœrulei sunt. Simillimus figuræ Catesbæi, sed absque puncto nigro in apice alarum.

91. **VESPA maculata** nigra, thorace albo maculato, scutelloque quadrimaculata, abdomine postice albo maculato.

*Habitat in Pensylvania De Geer.*

Statura & magnitudo *Crabronis*. Frons maculis tribus albis, maxillorum latera alba. Thorax ante alas macula

*curva; sub alis puncto albo. Ad scutellum 2 paria macularum albarum remota. Abdomen atrum, postice albo maculatum.*

92. VESPA quadridens atra, thorace quadridentato, scutello primoque segmento abdominis niveo.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

*Tota nigra. Thorax utrinque basi supra macula alba. Scutelli loco alba macula. Thorax postice truncatus, utrinque 2. dentibus notatus. Abdominis segmentum primum maxima ex parte album. Alæ atro-subviolaceæ.*

93. VESPA annularis fusca, genubus antennarum apicibus margineque primi segmenti abdominis flavis.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

*Media. Alæ planæ. Thorax maculatus, ante alas magis ferrugineus. Tibiarum bases flavescentes.*

94. FORMICA binodis nigra, abdomine glaberrimo segmentis duobus primis subglobosis.

*Habitat in Jamaica.*

*Magnitudo formicæ nigræ nostratis. Alæ hyalinæ. Corpus totum nigrum. Abdomen atrum, nitidum: Segmentis 2 primis angustioribus gibbosis. Antennæ apice fuscæ & crassiores.*

#### DIPTERA.

95. ASILUS æstuans cinereus, abdominis tribus ultimis segmentis albis.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

*Genitale sigulare, compressum, atrum caudæ adhaeret ut nostratis.*

#### APTERA.

96. CANCER *Dormia* brachyurus hirsutus, thorace utrinque dentato, pedibus posticis ungvibus geminis. Ruph. Mus. t. 11. f. 1. Cancer Lanosus. Seb. Mus. 3. t. 18. f. 1.

*Habitat in Indiis.*

97. CANCER *Vocans* brachyurus, thorace subquadrate inermi, chela alter magna.

*Syst. nat. 10. p. 626. n. 6.*

*Marogr.*

*Marcgr. bras.* 184. *Maracoani.*

*Pis. bras.* 77. t. 78.

*Rumph. Mus.* 14. t. 10. f. 3.

*Catesb. car.* 2. t. 25. *Carenarius.*

*Seb. Mus.* 3. t. 18. f. 8.

*Habitat in utraque India.*

*Testa lœvis inermis, ex quadrato antice lateralibus dilatata. Discus quasi H. impresso; latera quasi 2 striis obliquis; inter oculos integra. Anguli anteriores prominuli.*

*Chela dextra, interdum sinistra, semper altera, maxima, oblonga, albida, lœvis. Pollex mobilis, compressus, arcuatus, introrsum granulatus. Digitus compressus, rectus, apice subtridentatus, introrsum granulatus, medio denticulo notatus. Chela minor minuta digitis rectis ciliatis. Pedes variis pilis; ungvibus acutis omnes.*

98. **CANCER** *cordatus brachyurus, thorace lœvi cordato integerrimo, chelis subtus muricatis.*

*Habitat Surinami.*

*Majusculus. Testa cordata apice posteriora respiciente. lœvis, margine subcarinato; disco lateribus gibbo; in medio quasi H. depresso. Inter oculos vix emarginata. Oculi cylindrici. Palpebra inferior crenulata. Chela lœvis, sed subtus valde muricatae verrucis conicis nigris. Brachia triangula angulis muricatis. Pedes reliqui omnes subtus maxime barbati.*

99. **CANCER** *epheliticus brachyurus, thorace lœvi mutico maculato: margine crenulato, manibus cristatis.*  
*Rumph. Mus. t. 8. f. 5.*

*Habitat in Carolina Garden.*

*Testa latior quam longa, convexa, subæqualis, postice angustata, flava maculis varis fulvis rubro margine picta. Margo crenulatus. Rostrum obtusum, integrum. Chelæ intus planæ; extus convexæ muricatae, margine superiore cristatae.*

100. **CANCER** *parasiticus brachyurus, thorace inæqua-*

f 415

*æquali orbiculato ciliato, pedibus dorsalibus quatuor.*

*Habitat in America intra Camam lazaram D. D. Jaquin. Testa magnitudine dimidii imperalis. Thorax orbiculatus, integerrimus, convexus, cinereus, lœvis, subinæqualis tuberculis paucis minutissimis. In Dorso pedes 4 minores; ungibus duobus aduncis. Pedes subtus 4 præter manus Cauda inflexa brevis.*

**101.** *CANCER filiformis linearis medio chelatus, pedibus quatuor,*

*Habitat in Malacca And. Grönberg.*

*Corpus lineare teretiusculum, magnitudine culicis. Antennæ longæ articulis 3: ultimo ex innumeris minutissimis articulis fere setaceo. Palpi 2, incurvi 3 articulis. Thorax linearis 2 articulis, corpore  $\frac{1}{2}$  brevius. Brachia setis 2, breviora. Manus ovatæ magnæ Carina uno altero denticulo. Corpus posterius articulis 2, longitudine thoracis, sub his 2. parvia ovariorum. Cauda corpus 2 parvis articulis, ad singulos hos articulos par pedum breviorum articulis 3. s. 4. brevissimis & digito incurvo subhamoso; hi 4. pedes videntur quasi in cauda hærere. Cauda obtusissima.*

**102.** *ONISCUS linearis cauda quadridentata.*

*Habitat in Oceano Surinami.*

*Linearis longitudine pollicari utrinque quasi dentatus. Antennæ longitudine corporis articulis 1, 2, 3. crassioribus; reliquis in setam attenuatis. Cauda longior, emarginata dentibus duobus, cui foliola lateralia adnata, unde quadridentata fit.*









