

BULLETIN
DE LA
Société Impériale
DES NATURALISTES

de Moscou.

TOME XVI.

ANNÉE 1843.

N° II.

Moscou,
DE L'IMPRIMERIE D'AUGUSTE SEMEN,
INPRIMEUR DE L'ACADEMIE IMPÉRIALE MÉDICO-CHIRURGICALE.

1843.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.
Москва, Марта 28-го дня, 1843 года.

Цензоръ и Кавалеръ И. Снегиревъ.

a
BEITRAG
ZUR
RAEFER-FAUNA
DER ALEUTISCHEN INSELN, DER INSEL SITKHA
UND
NEU-CALIFORNIENS
VON GRAF C. G. MANNERHEIM.

Obgleich der Herr Professor Doctor *Johann Friedrich Eschscholtz* erst in seinen Entomographien (*) und hernach in dem von ihm herausgegebenen zoologischem Atlas zur zweiten Reise des Herrn Flott-Capitains *Otto von Kotzebue* (**) eine Menge, während der beiden mit genanntem Herrn Capitain zurückgelegten Reisen um die

(*) Entomographien von *J. Friedrich Eschscholtz*. Erste Lieferung. Berlin, 1842. in-8°.

(**) Zoologischer Atlas, enthaltend Abbildungen und Beschreibungen neuer Thierarten, während der Flott-Capitains von Kotzebue zweiter Reise um die Welt, beobachtet von *D. Friedrich Eschscholtz*. Fünf Hefte in Folio. Berlin, 1829—1833.

Welt, gemachten entomologischen Entdeckungen veröffentlicht hatte, blieb doch ein grosser Theil des gesammelten Materials unbenuzt liegen, da am 7^{ten} Mai 1831 der Tod diesen thätigen Mann dahinraffte und so der Naturgeschichte einen der gründlichsten und ausgezeichnetesten Entomologen unseres Zeitalters entriss. Die persönliche Bekanntschaft, die ich mit dem Herrn Doctor *Essholtz*, schon vor seiner zweiten Reise um die Welt, anknüpfte und die seine freundschaftlichen Gesinnungen gegen mich mit jedem Tage vermehrte, von denen ich die angenehmsten Erinnerungen durch das ganze Leben behalten werde, gab die Veranlassung zu einem fleissigen Briefwechsel zwischen uns. Auch während der Weltumschiffung von 1823 bis 1826 theilte er mir in Briefen aus Sitkha und Californien die von ihm auf der Reise gemachten überaus interessanten entomologischen Beobachtungen mit, und heimgekehrt bereicherte er vorzugsweise meine Sammlung mit seinen vielen neuen Entdeckungen, so dass mein entomologisches Kabinet eines der vollständigsten in Hinsicht derselben werden musste. Seitdem unterhielt er mit mir über diese Gegenstände eine äusserst belehrende Correspondenz und oftmals war ich gesonnen die daraus gezogenen Aufklärungen über die entomologischen Schätze dieser entlegenen Gegenden im Druck bekannt zu machen. Allein es kamen mir manche Hindernisse in den Weg, die diese Absicht vereiteln. Lange waren unsere

Kenntnisse der Insecten dieser von dem stillen Oceane bewässerten, in der nördlichen Hemisphäre liegenden Küsten- und Insel-Länder nur auf die von *Eschscholtz* daselbst eingesammelten Arten beschränkt, bis im Herbste 1841 der aus Sithka heimgekehrte Doctor *Blaschke* eine Sammlung von genannter Insel und von Californien mitbrachte, wovon eine schöne Reihenfolge der interessantesten Käfer durch die, bei mir stets in der dankbarsten Erinnerung bewahrte, besondere Güte und Freundschaft S^r Excellenz des Herrn wirklichen Staats-Raths Doctor *Lange* mir zu Theil wurde.—Fast zu gleicher Zeit hatte der gewesene Gouverneur der Besitzungen der russisch-amerikanischen Compagnie, Herrn Flott-Capitain ersten Ranges *Kuprianoff*, die ausgezeichnete Gefälligkeit mir eine Menge der von ihm aus Sitkha mitgebrachten Insecten zu verehren und es gereicht mir zur angenehmsten Pflicht, diesem für die Kenntniss der Naturerzeugnisse der seiner Verwaltung anvertrauten Länder so thätigen Manne meine ganz besondere Erkenntlichkeit für diese mir erzielte Güte hiemit öffentlich abzustatten. Bevor noch diese jetzt erwähnten Sendungen bei mir eingingen, erwies der Herr Flott-Capitain-Lieutenant *Behrens* mir die Freundschaft einige von seinem Reisegefährten nach Sitkha und Californien, dem Herrn Doctor *Fischer*, in der vormaligen russischen Colonie Ross eingesammelten und in Weingeist aufbewahrten Käfer zu

schicken, von welchen ich zwei ausgezeichnete Arten in der *Revue zoologique par la Société Cuvierienne, année 1840.* S. 137. schon beschrieben habe.

Mit diesen zusammengebrachten Materialien ausgestattet beabsichtigte ich eine Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln, der Insel Sitkha und der mit der russisch-amerikanischen Compagnie in Beziehung gestandenen Theile Neu-Californiens auszuarbeiten und zugleich in dieses Werk alles zusammenzubringen, was in verschiedenen entomologischen Schriften über die Käfer dieser Gegenden bisher geliefert worden ist. Mit diesem Entschlusse wandte ich mich an Seine Excellenz, den Herrn wirklichen Staats-Rath *Fischer von Waldheim*, Vice-President der Kayserl. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau und an Herrn *Ménétriés*, Conservator des entomologischen Museums der Kayserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, um die in den unter ihrer Aufsicht stehenden Sammlungen etwa vorhandenen Käfer der gedachten Länder in die erwähnte Fauna aufnehmen zu können, was mir um so mehr zum Bedürfnisse gereichte, da das gewesene entomologische Kabinet des verstorbenen *Eschscholtz* durch Kauf ein Eigenthum der Moskauer Universität geworden war. Die freundschaftliche Gefälligkeit, womit diese Herren meine Wünsche hierin befriedigten, ist über alles Lob erhaben und die Beiträge, die ich dadurch erhielt, gehören ge-

wiss zu den interessantesten bei der Vervollständigung meines beabsichtigten Werkes; insbesondere waren einige von Herrn Ménétriés mitgetheilte Käfer ausgezeichnet, die der vormalige Gouverneur der russisch-amerikanischen Colonien, S^r Excellenz Herr Contre-Admiral *F. Wrangel*, dieser jedem Verehrer der Wissenschaften wohlbekannte Mann, aus Californien mitgebracht und dem Museum der Akademie überlassen hatte. Schliesslich muss ich noch der Güte des Herrn *Johannes Oberts*, eines jungen hoffnungsvollen Entomologen, erwähnen, mir einige vom Dr. *Blaschke* gesammelten Käfer aus Sitkha und Californien verabfolgt zu haben.

Da aber Herr *Ferdinand Sahlberg*, Doctor der Medicin und ein würdiger Sohn des berühmten Entomologen, Herrn Professor Sahlbergs, im Jahre 1839 den gegenwärtigen Gouverneur der Besitzungen der russisch-amerikanischen Compagnie, Flott-Capitain ersten Ranges *Etholén*, dem ich schon längst eine in der Umgegend von Jakutsk von ihm selbst gemachte Sammlung Käfer verdanke, auf seiner Reise nach Brasilien, Chili und Sitkha begleitete und im Verlaufe dieses Winters nach der Heimath zurückzuerwarten war, entschloss ich mich, meiner vor etwa einem Jahre schon begonnenen Arbeit Einhalt zu thun, und dieses um so lieber, weil Doctor *Sahlberg* sich ein ganzes Jahr auf Sitkha aufgehalten hatte und deshalb von einem so thätigen und wissenschaft-

lich gebildeten Sammler recht vieles zu erwarten war. Allein kürzlich wurde von dem Reisegefährten des Herrn *Sahlbergs*, dem Herrn *Wosnesensky*, an die Akademie der Wissenschaften eine beträchtliche Sendung von dem letzgenannten auf Sitkha und in Californien gesammelten Insecten heimgeschickt, und die Akademie ertheilte Herrn Ménétriés den Auftrag darüber einen Catalog mit Diagnosen der neuen Arten auszufertigen.—Durch die nehmliche Gelegenheit bekam S° Excellenz Herr *Fischer von Waldheim* eine in denselben Gegenden von einem Zöglinge des Ackerbau-Institutes zu Moskwa, *Tschernikh*, gemachte Käfer-Sammlung, die mir zur Benutzung für mein Werk gefälligst mitgetheilt worden ist. Um nun nicht meine auf die viele schon fertig liegende vollständige Art-Beschreibungen und die Auseinandersetzung der neuen Gattungen angewandte grosse Mühe, durch den bald erscheinenden Catalog des Herrn Ménétriés zum grossen Theile vereitelt zu sehen, finde ich mich jetzt genöthigt einen Prodromus der von mir begonnenen Käfer-Fauna dem entomologischen Publicum zu überliefern, hauptsächlich in der Absicht um die Priorität der Benennungen der neuen Arten für mich gesichert zu haben.

Durch diese Umstände gezwungen den Druck gegenwärtiger Abhandlung zu beschleunigen, erachte ich es am besten, die im Käfer-Cataloge des

Herrn Grafen *Dejean* (*) beobachtete systematische Anordnung zu befolgen, obgleich ich das natürliche System für die Aufstellung in der eigentlichen Fauna zu benutzen gesonnen war, wobei ich auch die Absicht hatte, zugleich eine Darstellung der geognostischen und klimatischen Verhältnisse der gedachten Länder, nebst einigen Bemerkungen über die geographische Verbreitung der da-selbst vorkommenden Insecten-Gattungen, als Einleitung zu dem Werke, vorangehen zu lassen. Ich beschränke mich also nur auf die blossen Diagnosen der mir bisher bekannten Species und sollte es mir auch nicht später gelingen, meinen aufgefasseten Plan durchzusetzen, so wird es mir doch immer zur Genugthuung gereichen, würdigeren Naturforschern den Weg zu einem vollständigeren Werke über die entomologischen Produkte der mehr erwähnten Länder gebahnt zu haben.

Es enthält also dieser Prodromus Diagnosen von 300 Arten, wovon 148 bisher entweder ganz unbekannt oder in keinem entomologischen Werke beschrieben gewesen sind. Die Species, die ich nicht zur Untersuchung habe bekommen können, und deren Diagnosen aus verschiedenen Schriften und Abhandlungen abgeschrieben oder auch von mir, ohne Ansicht der

(*) Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le Comte *Dejean*; troisième édition. Paris, 1837. in-8°.

Käfer, ergänzt worden sind, habe ich durch ein * ausgezeichnet. Von denen im Dejean'schen Cataloge angeführten Arten blieben mir doch, ungeachtet alles Strebens sie zur Beschreibung zu erhalten, folgende vierzehn ganz unbekannt, nehmlich aus Californien: DROMIUS CALIFORNICUS *Dej.*, MICROSAURUS CONFUSUS *Dej.*, NOTOXUS ANGUSTATUS *Eschsch.*, NECROPHORUS LATERALIS und AURIPILOSUS *Eschsch.*, SCOTERA GIBBOSA *Eschsch.*, LIXUS CALIFORNICUS *Eschsch.*, AMPHICYRTA DENTIPES *Eschsch.*, HIPPODAMIA 7-LUNATA *Eschsch.*, HYPERASPIS QUADRILOCULATA *Eschsch.*, und RHANIS ANGUSTICOLLIS *Eschsch.*, aus Sitkha: AECIALITES DEBILIS *Eschsch.*, ACYRTES LATUSS *Eschsch.*, und PLECTRURA SPINICAUDA *Eschsch.*, alle diese Arten von Eschscholtz dem Grafen Dejean mitgetheilt, daher es zu vermuthen ist, dass sie in seiner gewesenen eigenen Sammlung sich befinden müssten.

Wiburg den 28^{ten} Februar 1843.

PENTAMERA.

CARABICI.

- *1. OMUS CALIFORNICUS *Eschscholtz*: Niger, nitidus, thorace subcylindrico ruguloso, basi apiceque truncato, elytris connatis ovatis, supra sparsim punctato-rugosis, margine inflexo lævi, linea longitudinali rufa brunnea notato.

Longit. 7½ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. I. p. 4. Tab. IV. fig. 1.- *Laporte*, Annal. Soc. entom. de France I. p. 386. 1., *Reiche*, ibid. VII. p. 301. 3. pl. 10. fig. 3. -*Lacodaire*, Révision de la famille des Cicindélides, p. 16.

Habitat in California ; ad Cabo de los Reyes mense Novembris sub lapide specimen unicum a D. *Eschscholtz* captum.

- *2. **AMBLYCHEILA PICOLOMINII Dupont** : Atra, nitida, capite lævigate, thorace subquadrato, lævigate subcanaliculato, elytris obsolete punctulatis, lineis tribus elevatis, interstitiis punctis profunde impressis

Longit. 13 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 4 lin.

Reiche, Annal. Soc. entom. de France. VIII. p. 560. pl. 19. fig. 1-6.

Habitat in California ad Sinum St. Francisco. D. *Picolomini*.

3. **GALERITA CALIFORNICA** : Nigro-fusca, testaceo pubescens, capitibus puncto, antennis, thorace angustiore oblongo-cordato pedibusque rufo-ferrugineis, elytris oblongo-quadratis obscure cyanescentibus, leviter striatis.

Longit. 6 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

Gal. Jano Fabr. (*cyanipennis* Dej. Sp.) minor et in thorace et elytris multo angustior.

4. **CYMINDIS VIRIDIS Eschscholtz** : Glabra, viridi-cyanea, thorace cordato, elytris tenuie striato-

punctatis, punctisque duobus impressis, tibiis
tarsisque nigris, antennis basi rufis.

Dejean, Species général des coléoptères V. p. 325. 46. Catalogue des coléoptères 3^{me} édit. p. 9.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

5. **DROMIUS NICRINUS** *Eschscholtz*; Obscure nigro-aeneus, thorace postice angustato, subcordato, elytris obsoletissime striatis, disco impunctatis, antennis pedibusque piceis.

Longit. 1½ lin. Latit. ⅔ lin.

Dejean Cat. 3^{me} édit. p. 11.

Habitat in California D. *Eschscholtz*. Mus. Univ. Imp. Mosqv.

Colore *D. truncatello* Auct. similis, sed thorace elytrisque multo longior.

*6. **LEBIA CYANIPENNIS** *Eschscholtz*: Nigra, elytris cyaneis.

Longit. 2½ lin. Latit. 1¼ lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 385, 54. Cat. 3^{me} édit. p. 12.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

7. **BRACHINUS TSCHERNIKHII**: Ferrugineus, thorace breviore subcordato, angulis posticis rectis, elytris oblongo-quadratis, subcostatis cyaneis, pectoris lateribus abdomineque obscuris.

Longit. 4 lin. Latit. 1⁵/₆ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

B. conformi Dej. proximus, sed thorace breviore, angulis posticis rectis et clytris longioribus diversus.

8. CYCHRUS ANGUSTICOLLIS *Eschscholtz*: Elongatus, niger, thorace angusto, cordato, elytris obscure violaceo-brunneis, utrinque carinatis, dorso obsolete trilineatis, margine obscure viridi-aeneo.

Longit. 8, 9 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$, 3 $\frac{3}{4}$ lin.

Fischer, Entomogr. de la Russie II. p. 46. 4. Tab. 46. fig. 2. III. p. 142. 6. — *Dejean*, Spec. gén. V. p. 526. 10. Cat. 3^{me} édit. p. 20.

Habitat in insula Unalaschka *D. Langsdorff*; in insula Sitkha sat frequens *DD. Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*; in truncis putridis et sub muscis viciat.

9. CYCHRUS MARCINATUS *Eschscholtz*: Niger, thorace cordato, elytris utrinque carinatis, cupreо-aeneis, granulato-striatis, margine viridi-aureo.

Longit. 6, 6 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{3}{4}$ lin.

Fischer, Entomogr. I. p. 79. Tab. 7. fig. 1. III. p. 142. 5.—*Eschscholtz* Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 98. 9.—*Germar* Coleopt. spec. nov. p. 3. 5.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 19. 8. Cat. 3^{me} édit. p. 20.

Habitat in insula Unalaschka, vere sub lapidibus et in rupium fissuris, inter muscos singulatim, *D. Eschscholtz*; in insula Sitkha frequentius, *DD. Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*, in truncis putridis et sub muscis degens.

10. CYCHRUS VENTRICOSUS *Eschscholtz*: Niger, thorace cordato, postice coarctato, elytris ovatis valde convexis, utrinque carinatis, dense striatis, striis profunde punctatis.

Longit. 8. lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 527. 11. Cat. 3^{me} édit. p. 20.—

Eschscholtz Zool. Atlas. V. p. 91. 1. Tab. XXV. fig. 1.

Habitat in California ad S^t. Franzisco. *DD. Eschscholtz et Blaschke*.

11. **CARABUS CHAMISSONIS** *Eschscholtz* : Ovatus, niger, thorace quadrato, postice truncato, elytris subreticulatis, elevato-striatis, striis interruptis, punctisque obsoletis oblongis elevatis triplici serie.

Longit. 6 $\frac{3}{4}$, 7 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 2 $\frac{3}{4}$, 3 lin.

Fischer, Entomogr. I. p. 88. 12. Tab. 7 fig. 12. III. p. 220.

87. — *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 100. 4. — *Dejean*, Spec. gén. II. p. 161. 102. Cat. 3^{me} édit. p. 24.

C. **BRACHYDERUS** *Wiedemann* in Germar Mag. IV. p. 110. 5.

Habitat in insula Unalaschka frequens vere sub lapidibus ad littora lacuum. *D. Eschscholtz*.

12. **CARABUS BACCIVORUS** *Eschscholtz* : Oblongo-ovatus, niger, thorace angustato, quadrato, subrugoso, elytris crenato-striatis, interstitiis s^æpe interruptis, punctisque impressis triplici serie.

Var. b. elytris brunneo-testaceis.

Var. c. punctis excavatis in elytrorum basi deficientibus et seriebus versus apicem s^æpe punctis vagis intermixtis.

Longit. 8 $\frac{1}{2}$, 9 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{3}{4}$ lin.

Fischer, Entomogr. I. p. 87. 11. Tab. 7. fig. 11. III. p. 221. 89.—*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 99. 3.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 167. 107. Cat. 3^{me} édit. p. 24.

C. SERIATUS *Wiedemann* in *Germar*, Mag. IV. p. 109. 4.

Habitat in insula Unalaschka frequens per totam æstatem; rapina deficiente flores PRIMULE CUNEIFOLIA Ledeb. depascens, et autumno baccis EMPETRI NIGRI vitam sustentans: *D. Eschscholtz*.

*13. *CALOSOMA CANCELLOSUM* *Eschscholtz*: thorace brevissimo, scabro, æneo, angulis posticis productis, elytris viridi-æneis, obsolete striatis, rugis brevissimis transversis irregularibus, punctisque oblongis elevatis triplici serie, tibiis intermediis rectis.

Longit. 9. lin.

Eschscholtz, Zool. Atl. V. p. 23. 4.

Habitat in California ad S^t. Franzisco. *D. Eschscholtz*.

14. *LEISTUS FERRUGINOSUS* (*): Rufo ferrugineus, thorace cordato, angulis anticis prominulis, elytris dorso profunde striatis, striis tenui-

(*) Nachdem *Germar* in seiner vortrefflichen Zeitschrift für die Entomologie 2^{te} B. p. 442. erwiesen hat, dass der Name *ferrugineus* dem *Leistus spinilabris* Fabr. zukommen müsste, habe ich es als unumgänglich erachtet die Benennung der hier fraglichen Art zu ändern.—Was *Germar* zugleich in Betreff des jezigen *Harpalus ferrugineus* sagt, muss ich bestreiten, denn ich habe selbst einige Stücke dieses achtten *Harpalus* im südlichen Schweden gefangen.

ter punctatis, tertia foveolis quatuor impressis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

LEISTUS FERRUGINEUS *Eschscholtz*, *Dejean*. Spec. gén. V. p. 569. 9. Cat. 3^{me} édit. p. 25. — *Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 24. 9. Tab. XXV. fig. 4.

Habitat in insula Sitkha in truncis putridis *DD.* *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

15. **NEBRIA METALLICA** *Eschscholtz*: Nigra, elytris cupreo-violaceis, striato-punctatis, interstitiis alternatim interruptis.

Var. b. elytris aureo-micantibus.

Longit. 5 $\frac{1}{2}$, 6 lin. Latit. 2 $\frac{1}{4}$, 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Fischer, Entomogr. I. p. 71. 1. Tab. 6. fig. 1. III. p. 245. 3.—*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 100. 5.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 229. 7. Cat. 3^{me} édit. p. 25.

Habitant in insula Unalaschka, vere frequentissima, turbatim sub lapidibus in rupium vicinitate. *D.* *Eschscholtz*; in insula Sitkha ad rivulos e montibus defluentes. *DD.* *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

- *16. **NEBRIA GEBLERI** *Eschscholtz*: Nigra, elytris cupreo-violaceis, striatis, striis obsolete punctatis, interstitiis tertio et septimo sub-interruptis.

Longit. 4 $\frac{3}{4}$, 6. lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$, 2. lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 573. 36. Cat. 3^{me} édit. p. 25.—*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 23. 5. Tab. XXV. fig. 3. Habitat in insula Sitkha estate sub lapidibus ad rivulas nivosas in montium vicinitate rarius *D.* *Eschscholtz*.

17. **NEBRIA GREGARIA** *Eschscholtz*: Elongata, nigra, elytris nigro-aeneis, striatis, striis simplicibus, tertia quadripunctata, antennis pedibusque piceis.

Var. b. antennis pedibusque totis cum elytrorum margine inflexo rufo-piceis.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Fischer, Entomogr. I. p. 72. 2. Tab. 6. fig. 3 III. p. 250.
10.—*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. des natur. de Moscou VI. p. 101. 6.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 232. 10. Cat. 3^{me} édit. p. 25.

Habitat in insula Unalaschka, vere sub lapidibus ad littora maris frequentissima. *D. Eschscholtz*.

18. **NEBRIA MANNERHEIMII** *Eschscholtz*: Nigra, elytris oblongo-ovatis, striatis, striis obsolete punctatis, punctisque quinque vel sex impressis, antennis pedibusque piceis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$, 5 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$, 2 lin.

Fischer, Entomogr. III, p. 253. 14. Tab. 14. fig. 5.—*Dejean*, Spec. gén. V. p. 575. 38. Cat. 3^{me} édit. p. 25.—*Eschscholtz*, Zool. Atlas V. p. 23. 6.

Habitat in insula Sithka ad rivulas *D. Eschscholtz*.

19. **NEBRIA SAHLBERGII** *Eschscholtz*: Nigra, elytris oblongis, striato-punctatis, stria tertia punctis quinque impressis, antennis tarsisque rufo-piceis.

Var. b. Supra violaceo-micans.

Longit. 3 $\frac{3}{4}$, 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{3}{4}$ lin.
N° II. 1843.

Fischer, Entomogr. III. p. 254. 16. Tab. 14. fig. 2. — *Dejean*, Spec. gén. V. p. 576, 39. Cat. 3^{me} édit. p. 25. — *Eschscholtz*, Zool. Altas. V. p. 93. 7.

Habitat in insula Sitkha cum præcedente *D. Eschscholtz*; a *DD. Kuprianoff et Blaschke*, etiam missa, quamvis nullum præcedentis speciei individuum communicaverunt.

20. **PELOPHILA ESCHSCHOLTZII Sturm**: Nigra-ænea, thorace antice elytrorum basi latitudine æquali, elytris evidenter punctato-striatis, limbo viridi-æneo.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Mannerheim in *Hummel*, Essais entom., III. p. 40. 4. — *Fischer*, Entomogr. III. p. 260.

NEBRIA ESCHSCHOLTZII Sturm Catalog. p. 173.

Habitat in insula Unalashka sub lapidibus. *D. Eschscholtz*.

21. **ELAPHRUS CALIFORNICUS**: Supra obscure æneus, punctatissimus, thorace capitis fere latitudine, sub foveolato, elytris costis subelevatis interruptis, maculisque obscuris ocellatis impressis quadruplici serie; subtus viridi-æneus, femorum basi tibiisque ferrugineis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California *D. Tschernikh*

E. Americano Dej. paullo major, capite thoraceque multo latioribus, hoc obsolete tantum foveolato diversus.

- *22. **NOTIOPHILUS SYLVATICUS Eschscholtz**: Elongatus, supra cupreo-æneus, fronte quinque sulcata, elytris vitta dorsali flava, striisque sex

dorsalibus remotis, prima dorsali apice fere recta, foveolaque antica impressa.

Longit. 2⁵/₈ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. V. p. 94. 10. Tab. XXV. fig. 5.

N. *BIGUTTATUS* Var. *Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 27.

Habitat in insula Sitka sylvis D. *Eschscholtz*.

*23. *NOTIOPHILUS SEMIOPACUS Eschscholtz*: Supra æneus, fronte multistriata, thorace subquadrato, elytris, sutura, vittaque dorsali tenuiter striata, bifoveolata et apice flavescenti-opacis.

Longit. 2⁵/₈ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. V. p. 95. Tab. XXV. fig. 6.

Habitat in California ad S^t. Franzisco. D. *Eschscholtz*.

24. *METRIUS CONTRACTUS Eschscholtz*: Niger, thorace quadrato, lateribus late reflexo-marginatis, elytris connatis, ovatis, convexis, obsolete striato-punctatis, pedibus nigro-piceis.

Longit. 5¹/₂ lin. Latit. 2¹/₂ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. I. p. 8. Tab. 1. fig. 4. — *Dejean*, Spec. gén. V. p. 591. 1. Cat. 3^{me} édit. p. 27.

Habitat in California, sub lapidibus et truncis putridis arborum D. *Eschscholtz*.

*25. *LORICERA SEMIPUNCTATA Eschscholtz*: Nigropicea, thorace basi parum angustato; angulis basalibus productis, elytrorum striis tenuiter punctulatis, disco tri-foveolato.

Longit. 3⁵/₈ lin. Latit. 7¹/₂ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. V. p. 25. 19.

Habitat in California ad S^t. Francisco. *D. Eschscholtz*.

26. LORICERA DECEMPUNCTATA *Eschscholtz*: Nigro-aenea, thorace basi subito angustato, angulis rectis productis, elytris punctato-striatis, foveolis quinque, serie interna tribus, externa duabus.

Longit. 3¹/₃ lin. Latit. 1¹/₃ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. V. p. 25. 13. Tab. XXV. fig. 7.

Habitat in insula Sitkha *DD. Eschscholtz, Kuprianoff et Blaschke*.

***27. CHLENIUS VIRIDIFRONS** *Eschscholtz*: Capite violaceo, fronte viridi, occipite profunde punctato, thorace violaceo, basi coarctato, dense profunde punctato, elytris nigris, obsolete striatis, antennis pedibusque flavo-ferrugineis.

Longit. 7 lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. V. p. 27. 16.

Habitat in California ad S^t. Francisco *D. Eschscholtz*.

***28. CHLENIUS VARIABILIPES** *Eschscholtz*: Niger, pubescens, capite laevi, thorace subviolaceo, punctatissimo, basi coarctato, angulis productis, elytris obsolete punctulatis, striis profunde punctatis, antennarum basi pedibusque aut rufo-testaceis, aut nigris.

Longit. 5¹/₂ lin.

Eschscholtz, Zool. Altas. V. p. 27. 17.

Habitat in California ad S^t. Francisco *D. Eschscholtz*.

- *29. *CHLENIUS HARPALINUS* *Eschscholtz*: Capite thoraceque nigro-æneis, nitidis, subviridibus, thorace brevi antice rotundato, medio punctis singulis majoribus impressis, basi in fossis et angulis rudepunctato, elytris nigro-subviridi- bus opacis, subtilissime striatis.

Longit. 5 $\frac{1}{2}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Altas. V. p. 27. 18.

Habitat in California ad S^t. Franzisco. *D. Eschscholtz*.

30. *CHLENIUS VICINUS* *Dejean*: Nigro-piceus, supra pubescens, capite sublævi thoraceque quadrato punctatissimo, viridi-æneis, elytris obscurioribus, striato-punctatis, interstitiis subtilissime granulatis, antennarum basi pedibusque testaceis.

Longit. 4 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 2 lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 659. 108. Cat. 3^{me} édit. p. 29.

C. PUBESCENS *Harris*.

Habitat in California. *D. Tschernikh*.

Ab individuis Americanis differt elytrorum interstutiis multo subtilius granulatis; ceterum in omni punto illis simillimus, quare ut species diversa ægre dijudicandus.

31. *BADISTER FERRUGINEUS* *Eschscholtz*: Capite scutelloque nigris, thorace capite latiore rufo-piceo, ferrugineo-marginato, elytris fuscis cyaneo-micantibus, margine omni tenue, ano, antennarum basi pedibusque ferrugineis.

Longit. 2 $\frac{2}{3}$, 3 lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 690. 6. Cat. 3^{me} édit. p. 31.
Eschscholtz, Zool. Atlas, V. p. 28, 20.

Habitat in California ad St. Franzisco. *D. Eschscholtz*.

32. **PATROBUS FOVEOCOLLIS** *Eschscholtz*: Apterous, nigro-piceus, thorace subcordato, postice utrinque foveolato, elytris oblongo-ovatis, subconvexis, punctato-striatis, punctisque quatuor impressis, pedibus rufo-piceis.

Longit. 4 $\frac{1}{4}$, 4 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{3}{4}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 30. 4. Cat. 3^{me} édit. p. 32.

PLATYSMA FOVEOCOLLIS, *Eschscholtz*. Mém. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou VI. p. 105, 19.—*Fischer*, Entomogr. II. p. 129. 2. Tab. 19. fig. 5.

Habitat in insula Unalaschka, sub lapidibus frequens *D. Eschscholtz*.

33. **PATROBUS FOSSIFRONS** *Eschscholtz*: Apterous, nigro-piceus, thorace subtransverso, subcordato, postice utrinque foveolato, elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis, punctisque tribus impressis, pedibus piceis.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 31. 5. Cat. 3^{me} édit. p. 32.

PLATYSMA FOSSIFRONS, *Eschscholtz* Mém. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou VI. p. 104, 9.—*Fischer*, Entomogr. II. p. 128. I. Tab. 19. fig. 4.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus et in Kamtschatka etiam occurrit, *D. Eschscholtz*.

34. **PATROBUS TERRIMUS** *Eschscholtz*: Alatus niger, depresso, thorace subcordato, postice

transversim impresso, elytris elongatis, subparallelis, striatis, punctisque tribus impressis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 32. 6. Cat. 3^{me} édit, p. 32.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

35. **CALATHUS INGRATUS** *Eschscholtz*: Apterus nigropiceus, thorace brevi, subquadrato, leviter convexo, margine rufescente, angulis posticis subrotundatis, elytris oblongo-ovatis, parum convexis striatis, punctisque tribus impressis, antennis pedibusque pallide testaceis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{3}{4}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 77. 14. Cat. 3^{me} édit. p. 33.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

36. **CALATHUS RUFICOLLIS** *Eschscholtz*: Apterus, fusco-piceus, thorace obscure rufo, quadrato depresso, antice subangustato, angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis subtiliter striatis, punctisque tribus impressis, antennis pedibusque pallide testaceis.

Longit. 3 $\frac{3}{4}$, 4 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$, 2 lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 78. 15. Cat. 3^{me} édit. p. 33.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh*.

37. **CALATHUS BEHRENSII**: Apterus, fusco-piceus, capite thoraceque brunneo-piceis, thorace quadrato subdepresso, antice vix angustato,

angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis opacis, subtiliter striatis, punctisque tribus impressis, antennis pedibusque ferrugineis.

Longit. 4 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California ad Ross D. Dr. Fischer.

Præcedenti valde similis et affinis, sed brevior, multo, præsertim in thorace, latior et colore capitis thoracisque obscurior.

38. **ANCHOMENUS OVIENNIS** *Eschscholtz* : Apterous niger, subdepressus, thorace cordato, marginato, angulis posticis obtusis, elytris ovalibus apice sinuatis, profunde striatis, punctis tribus minutis impressis.

Longit. 6 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 34.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh*; a DD. *Fischer de Waldheim* et *Obert* ad describendum benevolè communicatus.

39. **ANCHOMENUS RUGICEPS** : Apterous, niger subdepressus, capite inæquali rugoso, thorace brevi marginato, posterius angustato, angulis posticis rectis, elytris oblongo-ovalibus, apice sinuatis, leviter striatis, punctis tribus minutis impressis, antennis pedibusque piceis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh*.

40. **ANCHOMENUS BRUNNEOMARGINATUS** : Apterous, niger, depresso, capite levissimo inter anten-

nas impresso, thorace longiore, subcordato, lateribus reflexo-marginatis, angulis posticis acutiusculis, elytris oblongo-ovalibus, apice sinuatis, leviter striatis, punctis tribus minutis impressis, antennis, pedibus, thoracis elytrorumque margine rufo-brunneis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in California. D. Tschernikh.

41. **ANCHOMENUS CALIFORNICUS Eschscholtz:** Alatus, capite, thoraceque obscure viridi-æneis, thorace subquadrato, elytris nigro-æneis, oblongo-ovatis, subtilissime striato-punctatis, punctisque quinque impressis, antennis pedibusque piceis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 127. 23. Cat. 3^{me} édit. p. 35.

AGONUM CALIFORNICUM Eschscholtz in litteris.

AGONUM LEPIDUM Eschscholtz in litteris.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Tschernikh.

42. **ANCHOMENUS FERRUGINOSUS Eschscholtz:** Alatus, piceus, æneo-micans, thorace oblongo-ovato, elytris, oblongo-ovatis, obsolete striato-punctatis, punctisque quatuor impressis pedibus rufo-pallidis.

Longit. 3 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 128. 24. Cat. 3^{me} édit. p. 35.

AGONUM FERRUGINOSUM Eschscholtz in litteris.

43. **ANCHOMENUS MOLLIS Eschscholtz:** Alatus, ovatus, nigro-piceus, thorace ovato, subquadrato, angulis posticis subrotundatis, elytris oblongo-ovatis, subtiliter striatis punctisque duobus impressis, antennis pedibusque rufo-piceis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$, 5 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$, 2 lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 129. 25. Cat. 3^{me} édit. p. 35.

AGONUM MOLLE Eschscholtz, Mém. de la Soc. Imp. des Natur de Moscou VI. p. 102. 7.—*Fischer Entomogr. II.* p. 195. 1. Tab. 19. fig. 2.

Habitat in insula Unalaschka sat frequens sub lapidibus D. *Eschscholtz.*

44. **ANCHOMENUS SULCATUS Eschscholtz :** Apterus, ovatus, nigro-piceus, thorace subquadrato, postice utrinque impresso, margine subreflexo, angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis, striatis, punctisque quatuor impressis, antennis pedibusque rufo-piceis.

Longit. 4, 5 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$, 2 $\frac{1}{4}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 131. 26. Cat. 3^{me} édit. p. 35.

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

45. **ANCHOMENUS STRIATUS Eschscholtz :** Apterus, ovatus, nigro-piceus, thorace quadrato, angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis subtiliter striatis, punctisque quinque impressis, antennis pedibusque rufo-piceis.

Longit. 3 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 132. 27. Cat. 3^{me} édit. p. 35.

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

46. **ANCHOMENUS MACULICOLLIS Eschscholtz:** Apterous, nigro-piceus, ovatus, thorace elytrisque margine late ferrugineo, elytris ovatis, subtiliter striatis, interstitiis obsolete punctulatis, punctisque distinctis sex impressis, antennis pedibusque pallide testaceis.

Longit. 4 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 2 lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 175. 48. Cat. 3^{me} édit. p. 36.

CHELIENIUS MACULICOLLIS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California D. Eschscholtz.

47. **ANCHOMENUS BREVICOLLIS Eschscholtz:** Apterous, ovalis, niger, thorace breviore, subquadrato, subtransverso, elytris subparallelis, brevioribus, subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, punctisque quatuor impressis.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 159. 30. Cat. 3^{me} édit. p. 36.

Habitat in California D. Eschscholtz.

- *48. **ANCHOMENUS FOSSICER Eschscholtz:** Niger, thorace oblongo-ovato, elytris elongatis subparallelis, subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, punctisque quinque impressis.

Longit. 4 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 160. 31. Cat. 3^{me} édit. p. 36.

Habitat in California D. Eschscholtz.

49. **PTEROSTICHUS CALIFORNICUS Eschscholtz:** Apterous, niger, thorace subcordato, postice utrin-

que striato, elytris oblongo-ovatis, subparallelis striatis.

Longit. 5 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{4}$ lin.

FERONIA (POECILUS) CALIFORNICA Dejean, Spec. gén. III. p. 292. 14. Cat. 3^{me} édit. p. 38.

POECILUS CALIFORNICUS Eschscholtz in litteris.

BRACHYSTYLUS CALIFORNICUS Chaudoir, Bullet. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou 1838. p. 17.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Blaschke.

50. **PTEROSTICHUS VICINUS**: Apterus, niger, thorace cordato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis parallelis, striatis, antennis palpisque brunneo-rufis.

Longit. 5 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in California DD. Blaschke et Tschernikh.

Præcedenti affinis, sed minor, angustior, thorace antice, latiore, magis cordato, elytrisque thorace angustioribus, lateribus omnino parallelis, subtilius striatis diversus.

*51. **PTEROSTICHUS OCCIDENTALIS** Dejean: Alatus, depresso, supra nigro-cyanus, thorace lævi, cordato, postice utrinque striato, elytris subparallelis, striatis, punctisque duobus postice impressis, antennarum articulis tribus primis rufis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

FERONIA (POECILUS) OCCIDENTALIS, Dejean, Spec. gén. III. p. 231. 93. Cat. 3^{me} édit. p. 38.

POECILUS DEPRESSUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California D. Eschscholtz.

52. **PTEROSTICHUS HERCULANEUS**: Apterus, niger, thorace anterius parum latiore, depresso, postice utrinque profunde bistriato, elytris ovatis, subparallelis, profunde striatis, humeris denticulatis, apice obtuse rotundatis.

Longit. 8 lin. Latit. 3 lin.

Habitat in insula Sithka; a D. Obert ad describendum benevolē communicatus.

Sequenti affinis, sed multo major, magis depresso, thorace longiore utrinque profunde bistriato et aliis notis distinctus.

53. **PTEROSTICHUS VALIDUS**. *Eschscholtz*. Apterus, niger, thorace subcordato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, subparallelis, profunde striatis.

Longit. 5²/₃, 6 lin. Latit. 2, 2¹/₃ lin.

FERONIA (PLATYSMA) VALIDA, *Dejean*, Spec. gén. III. p. 325.
116. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

POCILUS VALIDUS, *Eschscholtz* in litteris.

BRACHYSTYLUS VALIDUS, *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 17.

Habitat in insula Sitkha sat frequens; DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff*, *Blaschke* et *Tschernikh*.

54. **PTEROSTICHUS AMETHYSTINUS** *Eschscholtz*: Apterus, nigro-piceus, nitidus, subdepresso, thorace subquadrato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, subparallelis, profunde striatis, violaceis, antennis pedibusque piceoferrugineis.

Longit. 5, 6¹/₂ lin. Latit. 1²/₃, 2¹/₃ lin.

FERONIA (PLATTSMA) AMETHYSTINA, Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 40.

HYPHERES AMETHYSTINUS Eschscholtz, Chaudoir, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou 1838. p. 13.

Habitat in insula Sitkha DD. Eschscholtz et Blaschke.

Præcedenti nonnihil affinis, sed magis, præsertim in elytris, depresso, thorace longiore magis cordato et colore diversus.

55. PTEROSTICHUS CASTANEUS Eschscholtz : Apterous, nigro-piceus, thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, striatis, antennis, tibiis tarsisque rufo-piceis.

Longit. 4¹/₂, 5 lin. Latit. 1³/₄, 2 lin.

FERONIA (PLATTSMA) CASTANEA Dejean, Spec. gén. III. p. 326. 117. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

HYPHERES CASTANEUS Eschscholtz, Chaudoir, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 13.

Habitat in insula Sitkha DD. Eschscholtz et Blaschke.

56. PTEROSTICHUS BRUNNEUS Eschscholtz : Apterous, nigro-piceus, thorace longiore, subquadrato, postice subangustato, utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, striatis, antennis pedibusque rufo-piceis.

Longit. 4¹/₂ lin. Latit. 1²/₃ lin.

FERONIA (PLATTSMA) BRUNNEA Dejean, Spec. gén. III. p. 32. 118. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

HYPHERES BRUNNEUS Eschscholtz, Chaudoir, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 13.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianooff* et *Blaschke*, in California haud occurrit, ut allegavit illustris. Comes Dejean.

57. **PTEROSTICHUS ANGUSTUS Eschscholtz:** Apterus, nigro-piceus. thorace elongato, subquadrato, postice sub-angustato, utrinque striato, elytris elongatis, parallelis, striatis, antennis pedibusque rufo-piceis.

Longit. 3²/₃ lin. Latit. 1¹/₃ lin.

FERONIA (PLATYSMA) ANGUSTA Dejean, Spec. gén. III. p. 328.

119. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

ARCUTOR ANGUSTUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

- *58. **PTEROSTICHUS FUSCO-AENEUS Eschscholtz:** Totus fusco-aeneus, capite obscuriore, thorace sub-transverso, posterius subito angustato, angulis acutis, utrinque profunde bifoveolato, elytris profunde striatis, interstitio tertio posterius punctis tribus impressis.

Langit. 4¹/₂ lin. Latit. 1¹/₂ lin.

OMASEUS FUSCO-AENEUS Chaudoir, Annales de la Soc. entom. de France, IV. p. 448. 20.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

59. **PTEROSTICHUS ADSTRICHTUS Eschscholtz:** Alatus, niger, thorace subquadrato, postice sub-angustato, utrinque striato, elytris brevioribus, oblongo-ovatis, striatis, striis obsolete punctatis, foveolisque quinque impressis.

Longit. 4³/₄, 5¹/₄ lin. Latit. 1³/₄, 2 lin.

Eschscholtz, Mém. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou , VI. p. 103. 8. — *Fischer*, Entomogr. II. p. 120. 1. Tab. 19. fig. 1.

Poecilus adstrictus Germar, Col. sp. nov. p. 47. 27.

Feronia (Platysma) adstricta Dejean, Spec. gén. III. p. 319. 110. Cat. 3^{me} édit, p. 40.

Bothriopterus adstrictus Chaudoir, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 14.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus passim D. *Eschscholtz*; etiam in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Bluschke*.

60. *PTEROSTICHUS SERIEPUNCTATUS*: Alatus niger, nitidus, thorace subquadrato, postice parum angustato, angulis obtusis, utrinque profunde striato, elytris oblongo-ovatis, subtiliter punctato-striatis, foveolis quinque, omnibus in stria tertia impressis.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

Magnitudo et statura præcedentis, sed thorace angustiore, lateribus magis rotundato et foveolis elytrorum omnibus in stria tertia impressis distinctus.

61. *PTEROSTICHUS VENTRICOSUS Eschscholtz*: Apterous, supra æneus, thorace breviore, subquadrato, postice angustato, utrinque striato, elytris ovatis, convexis, striatis, striis subtiliter punctatis, punctisque quatuor impressis, antennis niger, pedibus piceis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$, 5 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$, 2 lin.

Poecilus ventricosus *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des
natur. de Moscou, VI. p. 106. 11 — *Fischer* Entomogr.
II. p. 132. 1. Tab. 19. fig. 6.

Feronia (Platysma) ventricosa *Dejean*, Spec. gén. III. p.
329. 120. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

Cryobius ventricosus *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des
nat. de Moscou, 1838 p. 18.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus frequens D.
Eschscholtz.

62. Pterostichus pinguedineus *Eschscholtz* : Apter-
rus, nigro-aeneus, thorace, subcordato, postice
utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, sub-
convexis, subtiliter striato-punctatis, punctis-
que tribus impressis, pedibus rufis.

Longit. 4, 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Poecilus pinguedineus, *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp.
des nat. de Moscou, VI. 106. 12. — *Fischer*, Entomogr.
II. p. 133. Tab. 19. fig. 7.

Feronia (Platysma) pinguedinea *Dejean*, Spec. gén. III. p.
330. 121. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

Cryobius pinguedineus *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des
nat. de Moscou, 1838. p. 18.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus passim D.
Eschscholtz.

13. Pterostichus. empetricola *Eschscholtz* : Apte-
rus, nigro-aeneus, thorace cordato, postice ut-
rinque striato, elytris oblongo-ovatis, subtili-
ter striato-punctatis, punctisque quatuor im-
pressis, antennarum basi pedibusque rufis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{1}{3}$ lin.

FERONIA (PLATYSMA) EMPETRICOLA *Dejean*, Spec. gén. III. p. 331. 192. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

ANCHOMENUS LATICOLLIS *Sturm*, Cat. p. 91.

CRYOMUS EMPETRICOLA *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 18.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

64. PTEROSTICHUS RIPARIUS *Eschscholtz*: Apterous, nigro-aeneus, thorace breviore cordato, postice utrinque bistriato, elytris oblongo-ovatis subtiliter striato-punctatis, punctisque duobus vel tribus impressis, antennarum basi pedibusque rufis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

FERONIA (PLATYSMA) RIPARIA *Dejean*, Spec. gén. III. p. 332. 193. Cat. 3^{me} édit. p. 40.

MOLOPS RIPARIUS *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

65. PTEROSTICHUS ATER *Dejean*: Apterous, niger, thorace cordato, postice utrinque bistriato, elytris subparallelis, subtiliter striatis, striis, obsolete punctatis.

Longit. 9 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$ lin.

FERONIA (PTEROSTICHUS) ATRA *Dejean*, Spec. gén. III. p. 339. 199. Cat. 3^{me} édit. p. 41.

PLATYSMA AERRINUM *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Wrangel*, specimen e Museo Acad. Imp. Scient. Petrop. ad examinandum benevole communicavit D. *Ménétriés*.

66. **AMARA LITTORALIS** *Eschscholtz* : Oblongo-ovata, obscure ænea, subtiliter punctulata, thorace antice angustato, postice utrinque obsolete bifoveolato, foveis punctulatis, elytris striatis, in striis vix punctulatis, antennarum articulis tribus baseos ferrugineis, tibiis tarsisque piceis.

Longit. 3, 3¹/₃ lin. Latit. 1¹/₂, 1²/₅ lin.

Zimmermann, in *Gistl Faunus I.* 1. p. 35. in *Silbermann Revue entom.* II. p. 227.

A. PLEBEJA VAR. *Dejean*, Spec. gén. III. p. 467. 7. Cat. 3^{me} édit. p. 44

A. PUNCTULATA *Dejean*, Spec. gén. III. p. 472. 14. Cat. 3^{me} édit. p. 44 (*).

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff*, *Blaschke* et *Tschernikh.*

67. **AMARA SCITULA** *Zimmermann*: Oblongo-ovata, subtiliter punctulata, supra obscure ænea, subtus nigro-virescens, thorace anterius angustato, apice emarginato, lateribus non de-

(*) *Dejean* hat die A. LITTORALIS *Eschsch.* mit seinem A. PLEBEJA und PUNCTULATA vereinigt, allein nach *Zimmermann* (*Gistl Faunus I.* 1. p. 24.) ist diese zuletzt genannte eine Varietät der von LITTORALIS sehr verschiedenen CELIA ERRATICA *Duftschmid*. Die Amaroiden meiner Sammlung wurden alle vor einigen Jahren von *Zimmermann* untersucht und benannt, und es befanden sich darunter sowohl die PUNCTULATA aus Kamtschatka als die in Sitkha vorkommende LITTORALIS.

planatis, basi utrinque bifoveolato, foveis punctatis, externa obsoleta, elytris leviter striatis, striis anterius punctulatis, pectore confertim punctato, antennarum articulis tribus baseos ferrugineis, tibiis tarsisque rufo-piceis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Zimmermann in Gistl Faunus I. 1. p. 32., in Silbermann Revue entom. II. p. 223.

Habitat in California D. Eschscholtz.

68. AMARA INSIGNIS Eschscholtz: Ovata, convexa, supra obscure ænea, thorace subquadrato, antice subangustato, dorso lævi nitido, postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis, elytris, striatis, striis impunctatis, interstitiis subtilissime punctulatis, antennis tibiis tarsisque rufis.

Var. b. supra obscure cyanea.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 796. 71. Cat. 3^{me} édit. p. 45. — Zimmermann in Gistl Faunus I. 1. p. 37. in Silbermann Revue entom. II. p. 228.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Blaschke..

69. AMARA REMOTE STRIATA Eschscholtz: Subovata, supra obscure ænea, thorace brevi, antice subangustato, basi utrinque bifoveolato, foveis punctatis, elytris levissime striatis, striis remotis, obsolete punctatis, interstutiis subtilissime punctulatis, pectore distincte punctato, antennis, tibiis tarsisque rufo-piceis.

Var. b. elytrorum margine infexo, thorace subtus, pectore abdominis apice, antennis pedibusque pallide ferrugineis.

Longit. 3⁴/₅, 3⁵/₈ lin. Latit. 1¹/₂, 1³/₈ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 473. 15. Cat. 3^{me} édit. p. 44.

A. REMOTA Eschscholtz, *Sturm*, Cat. p. 91.

CELIA REMOTA Zimmermann, in *Gistl. Faunus I. t. p. 27.* in *Silbermann Revue entom. II. p. 216.*

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*; *Var. b. e Kamschatka a D. Dr. Kyber* allata.

70. *AMARA CALIFORNICA Dejean* : Oblongo-ovata, supra obscure ænea, subtus nigro-virescens, thorace antice subangustato, postice utrinque obsolete bifoveolato, foveola externa oblique evidentiore, elytris leviter striatis, striis impunctatis, sterno pectorali maris foveola oblonga impresso, antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis.

Longit. 4, 4¹/₅ lin. Latit. 1³/₈, 1⁵/₆ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 474. 16. Cat. 3^{me} édit. p. 44.

A. IMPUNCTATA Eschscholtz in litteris.

CELIA CALIFORNICA Zimmermann in *Gistl Faunus I. t. p. 25.* in *Silbermann Revue entom. II. p. 215.*

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

71. *AMARA AURATA Eschscholtz* : Oblongo-ovata, supra ænea nitida, subtus nigro-virescens, thorace antice subangustato, postice utrinque bifoveolato, foveis profunde punctulatis, ely-

tris leviter striatis, striis impunctatis, sterno pectorali integro, antennis ano, pedibusque rufo-ferrugineis.

Longit. 2¹/₂, 3 lin. Latit. 1¹/₄, 1¹/₃ lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 475. 17. Cat. 3^{me} édit. p. 44.

CELIA AURATA *Zimmermann* in *Gistl Faunus* I. 1. p. 28. in *Silbermann*, Revue entom. p. 218.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh.*

72. *AMARA MELANOCASTRICA* *Eschscholtz*: Oblonga, nigro-picea, supra subnitida, subtus opaca, thorace lateribus rotundatis, postice angustato, utrinque bistriato, antice posticeque punctato, elytris oblongis profunde punctato-striatis, antennis pedibusque rufis.

Longit. 4¹/₂, 5 lin. Latit. 1³/₄, 2 lin.

Dejean, Spec. gén. III. p. 519. 59. Cat. 3^{me} édit. p. 45.

LEIRUS MELANOCASTRICUS *Zimmermann* in *Gistl Faunus* I. 1. p. 38. in *Silbermann* Revue entom. II. p. 229.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

73. *ERIPUS LEVISSIMUS* *Eschscholtz*: Niger, nitidus, capite profunde bicanaliculato, mandibulis elongatis porrectis, thorace elongato, posterius angustato, lateribus et postice marginato, clytris ovalibus, obsoletissime striatis, antennis, palpis pedibusque piceis.

Var. b. rufo-picea, pedibus dilutioribus.

Longit. 4¹/₃, 4¹/₂ lin. Latit. 1¹/₃, 1¹/₂ lin.

Dejean, Spec. gén. IV. p. 11. 2. Cat. 3^{me} édit. p. 46.

STOMIS LEVISSIMUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California rarius D. *Eschscholtz*.

*74. *ANISODACTYLUS CALIFORNICUS Eschscholtz*. Niger, thorace subquadrato, punctulato, postice angustato, utrinque obsolete foveolato, elytris striatis, interstitio tertio punto impresso, antennarum articulo primo subtus testaceo.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Dejean, Spec. gén. IV. p. 148. 12. Cat. 3^{me} édit. p. 49.

HARPALUS CALIFORNICUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

I. *DICHEIRUS Eschscholtz*.

Mentum dente medio brevi obtuso.

Palpi articulo ultimo subcylindrico.

Femora antica incrassata; tibiæ anticæ spina apicali dupli, interiore lanceolata incurva, intus excavata, interiore minuta.

Tarsi anteriores maris dilatati, subtus setosi, articulo primo triangulari, 2—4 transversis apice emarginatis.

Caput et thorax profunde punctata, interstitiis elytrorum biseriatim punctatis.

75. *DICHEIRUS DILATATUS Eschscholtz*: Oblongo-ovatus, subparallelus, subpubescens nigro-piceus, thorace subquadrato, parcus punctato, postice

angustato, angulis basalibus obtusis subrotundatis, elytris striis profunde exaratis impunctatis, antennis pedibusque rufo-piceis.

Var. b. capite thoraceque etiam rufescenti-piceis.

Longit. 4¹/₃, 4²/₃ lin. Latit. 1²/₅, 1⁵/₆ lin.

HARPALUS (OPHONUS) DILATATUS *Dejean*, Spec. gén. IV. p 241. 42. Cat. 3^{me} édit. p. 51.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh.*

76. **DICHEIRUS BRUNNEUS** *Eschscholtz*: Oblongus, subparallelus, subpubescens, nigro-piceus, thorace subquadrato, basi parum angustato, angulis posticis obtusis, dorso crebre punctato, elytris striis sat profunde exaratis impunctatis, antennis pedibusque rufis.

Longit. 3, 4 lin. Latit. 1, 1¹/₂ lin.

HARPALUS (OPHONUS) BRUNNEUS *Dejean*, Spec. gén. IV p. 239 41. Cat. 3^{me} édit. p. 51.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

Cum descriptione ill. *Dejean* exacte convenit, tantum paullo major et thoracis angulis posticis haud rectis, sed postius obtusis dicandis; an igitur species eadem?

77. **HARPALUS SOMNULENTUS** *Eschscholtz*: Oblongus, niger, thorace quadrato, postice utrinque foveolato, foveis punctatis, angulis posticis obtusis, elytris striatis, postice subsinuatis, interstitio tertio punto impresso, antennis pedibusque rufis, geniculis nigricantibus.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{3}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Dejean, Spec. gén. IV. p. 333. 117. 3^{me} édit. p. 52.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz et Blaschke.*

78. **HARPALUS CAUTUS** *Eschscholtz*: Oblongo-ovatus, niger, thorace quadrato, postice utrinque foveolato, angulis posticis subrotundatis, elytris striatis, apice subsinuatis, interstitio tertio puncto impresso, antennarum basi tarsisque rufis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Dejean, Spec. gén. IV. 367. 143. Cat. 3^{me} édit. p. 53.

Habitat in California DD. *Eschscholtz et Tschernikh.*

79. **HARPALUS ALBIONICUS**: Oblongo-ovatus, nigropiceus, thorace transverse-quadrato, basi punctulato, vix foveolato, angulis posticis rotundatis, elytris tenue striatis, apice subsinuatis, interstitio tertio puncto impresso, corpore subtus, antennis pedibusque ferrugineis.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in California ad Ross D. Dr. *Fischer.*

Statura et magnitudo fere præcedentis, sed thorax brevior, basi vix foveolatus, elytra subtilius striata et color alius.

80. **HARPALUS NIGRINUS** *Eschscholtz*: Oblongus, niger, thorace quadrato, postice utrinque foveolato, angulis posticis rectis, elytris striatis, apice oblique subsinuatis, interstitio tertio

puncto impresso , antennarum articulo primo
subtus rufo-testaceo.

Longit. 2¹/₃ lin Latit. 3³/₄ lin.

Dejean, Spec. gén. IV. p. 399. 167, Cat. 3^{me} édit. p. 54.

TRECHUS NORINUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

*81. *STENOLOPHUS UNICOLOR Eschscholtz*: Oblongus, supra obscure rufus, capite, pectore, abdomineque nigro-piceis, thorace subovato , posterius subangustato, utrinque subfoveolato, angulis posticis rotundatis, elytris striatis, interstitio tertio punto impresso, antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

Longit. 2¹/₂ lin. Latit. 1 lin.

Dejean, Spec. gén. IV. p. 411. 4. Cat. 3^{me} édit. p. 54.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

82. *BRADYCELLUS NITIDUS Eschscholtz* : Oblongo-ovatus , rufo-testaceus , thorace subquadrato , postice utrinque subfoveolato, foveis obsolete punctatis, angulis basalibus rectis, elytris obsoletissime striato punctatis , striis suturali marginalique lavigatis profunde impressis , thoracis maculis duabus , elytrorumque macula magna oblonga obsoletis nigro-subcynaneis , antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

Longit. 2¹/₂, 3 lin. Latit. 1, 1¹/₃ lin.

ACUPALPUS NITIDUS *Dejean*, Spec. gén. IV. p. 474. 30. Cat.
3^{me} édit. p. 55.

STENOLOPHUS NITIDUS *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California DD *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

*83. **TRECHUS CHALYBEUS** *Sturm* : Apterus, nigropiceus, subciano-micans, thorace subquadrato, postice utrinque foveolato, angulis baseos subrectis, elytris ovatis, striis obsoletissime externis obsoletis, punctisque tribus impressis, antennarum basi pedibusque rufis.

Longit. 2 lin. Latit. 1 lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 17. 11. Cat. 3^{me} édit. p. 56.—
Sturm, Cat. p. 203.

Habitat in insula Unalaschka frequens.

84. **LACHNOPHORUS ELEGANTULUS** : Obscure vire-scenti-æneus, griseo-pilosus, thorace angusto, cordato, angulis baseos obtusis, elytris albidis, depressis ovatis, striis antice profunde punctatis, postice lævigatis, basi et fascia media transversa undulata, brunneo-testaceis, tibiis ferrugineis.

Longit. 2 lin. Latit. 3/4 lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

Palporum articulo tertio apicem versus incrassato ab hoc genere nonnihil recedit, sed ceteris notis ab illo vix separandus; etiam generi **CALYBE** *Laporte* quodammodo adsimilis.

*85. **BEMBIDIUM INDISTINCTUM** *Eschscholtz*: Supra viridi-æneum, thorace subquadrato, postice

utrinque bistrigato, angulis basalibus rectis, elytris oblongis, tenue punctato-striatis, fasciis undatis macularibus tribus apiceque pallide testaceis, obsoletis, punctisque duobus impressis, antennis basi testaceis, pedibus testaceis æneo-micantibus.

Longit. 2 lin. Latit. 3/₄ lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 67. 30. Cat. 3^{me} édit. p. 57.

NOTAPHUS INDISTINCTUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

86. **BEMBIDIUM TRANSVERSALE** (*) *Dejean*: Capite, thoraceque viridi-æneis, thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque foveolato, angulis baseos rectis, elytris oblongo-ovatis, testaceis, punctato-striatis, fascia lata sinuata viridi-ænea, punctisque duobus impressis, antennarum basi pedibusque testaceis.

Longit. 3 lin. Latit. 1 1/₄ lin.

Dejean, Spec. gén. V. p. 110. 66. Cat. 3^{me} édit. p. 58.

Habitat in California D. *Tschernikh*; specimen ex America boreali occidentali ad ill. Com. *Dejean* misit D. *Leconte*.

87. **BEMBIDIUM PLANIUSCULUM**: Nigro-æneum, supra depresso; thorace subquadrato, postice angustato, utrinque foveolato, bistrigato, margine

(*) Diese und die folgende vier Arten gehören zu der Abtheilung *PERYPHUS*.

viridi-aeneo, elytris oblongis deplanatis, profunde striatis, interstitio tertio punctis duobus profunde impressis, antennis pedibusque nigris.

Longit. 2 lin. Latit. 3/₄ lin.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*. Statura depressa et magnitudo B. *Pfeifferi* *Sahlberg*, sed thorax nonnihil longior, postice magis angustatus et elytra profundius striata.

88. **BEMBIDIUM KUPRIANOVII**. Nigro-aeneum, subdepressum, thorace quadrato, utrinque foveolato, bistriato elytris ovatis, subtiliter striatis, interstitio tertio punctis duobus impressis, antennarum basi, tibiis tarsisque rufo-piceis.

Longit. 2¹/₄ lin. Latit. 1 lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Kuprianoff*.

Præcedente majus, latius, thorace breviore, postice vix angustato, elytris brevioribus, subtilius striatis, foveolis in interstitio tertio magis approximatis et colore antennarum pedumque distinctum.

89. **BEMBIDIUM BIIMPRESSUM**: Nigro-aeneum, leviter convexum, thorace subquadrato, postice angustato, utrinque foveolato, bistriato, margine virescente, elytris ovatis brunneo-piceis, leviter striatis, interstitio tertio punctis duobus profunde impressis, antennis pedibusque piceis.

Longit. 2, 2¹/₂ lin. Latit. 1, 1¹/₃ lin.

Habitat in insula Sithka D. *Eschscholtz*, e museo Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole communicavit D. *Fischer de Waldheim*. Proxime præcedenti nonnihil simile, sed paullo majus, convexius, thorace versus basin magis angustato, elytris lataribus magis rotundatis, levius striatis et colore diversum.

90. **BEMBIDIUM QUADRIFOVEOLATUM** : Nigro-aeneum, breviusculum, subdepressum, thorace quadrato, utrinque foveolato, bistriato, elytris oblongo-ovatis, subtiliter striatis, interstitio tertio punctis duobus profunde impressis, antennis pedibusque nigris.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Kuprianoff*.

Præcedenti iterum affine, sed longe minus, thorace angustiore, elytrorum foyeolis majoribus et colore antenarum pedumque facile distinguendum.

HYDROCANTHARI.

91. **DYTISCUS ANXIUS** : Oblongo-ovalis, in elytris vix dilatatus, supra nigro-piceus, thoracis limbo omni, elytrorum laterali corporeque pallide flavis, coxarum posticarum laciuiis acuminatis acutis.

Longit. 13, 14 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 6 $\frac{2}{3}$ 7 lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

D. *circumcincto Ahrens*, *Erichson* valde affinis, sed ratione longitudinis nonnihil angustior, elytris apice pro-

fundius punctatis et coxarum laciniis minus acutis diversus mihi videtur.

Femina differt a male tarsis simplicibus, colore minus nitido, thorace magis plano et elytrorum apice fortius punctato.

92. **ACILIUS ABBREVIATUS** *Eschscholtz* : Oblongo-ellipticus, depresso, supra fusco-cinereus, subtus nigro-piceus, undique dense punctulatus, thoracis limbo vittaque transversa, fronte maculis verticalibus duobus, antennis, pedibus elytrisque ferrugineis, his creberrime et confertissime nigro-irroratis, fascia transversa postica pallescente ornata, femoribus posticis ad basin paullulum infuscatis.

Mas: elytris lœvibus; Femina: quadrisulcatis, sulcis glabris, prima tantum antice abbreviata.

Longit. 7 lin. Latit. 3 $\frac{3}{4}$, 4 lin.

A. SEMISULCATUS VAR. *Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 61.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 132. 4.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

A. SEMISULCATO *Dej.* major, longior et sulcis tribus exterioribus fere ad basin productis species distincta mihi videtur; eo magis quod **A. SEMISULCATUS** genuinus, quantum mihi innotuit, in insula Sitkha haud fuerit observatus.

93. **COLYMBETES DIVISUS** *Eschscholtz* : Elongato-ovatus, supra flavicans, subtus niger, thorace in medio maculis duobus rotundatis nigris, elytris crebre nigro-irroratis, prosterno nigro.

Var. b. thorace maculis duobus transversis oblongo-quadratis, abdomine toto nigro-piceo, segmentis summo margine vix rufescensibus, pedibus intermediis piceo-maculatis, posticis fere totis nigro-piceis.

Longit. 5¹/₃ lin. Latit. 2²/₃ lin.

Aubé, Spec. gén. VI. p. 248. 22.

RANTUS DIVISUS Eschscholtz, Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 62.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*. Var. b. e Museo Univ. Imp. Mosqv. ad describendum benevole communicavit D. *Fischer de Waldheim*.

94. *ILYBIUS QUADRIMACULATUS Aubé*: Oblongo-ovatus, minus convexus, posterius rotundatim attenuatus, niger, elytris lineola maculaque minima rotundata rufo-ferrugineis fenestratis.

Var. b. Supra nigro-æneus.

Longit. 5, 5²/₃ lin. Latit. 2¹/₂, 2³/₄ lin.

Aubé, Spec. gén. VI. p. 274. 3.

COLYMBETES QUADRINOTATUS Eschscholtz, Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 62.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

95. *ACABUS TRISTIS Aubé*: Elongato-ovalis, subdepressus, vix nitidus, striis anastomozantibus irregulariter strigosus, niger, antennis pedibus marginibusque thoracis et elytrorum rufescensibus.

Longit. 4²/₃ lin. Latit. 2⁴/₅ lin.

Aubé, Spec. gén. VI. p. 356. 54.

COLYMBETES PICIPES *Dejean*, Cat. 3^{me} édit, p. 62.

COLYMBETES ANGULARIS *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

96. ACABUS DUBIUS: Oblongo-ovalis, subdepressus, subnitidus, striis anastomozantibus irregulariter reticulato-strigosus, brunneo-piceus, antennis, pedibus, thoracis margine antico et lateribus elytrorumque margine antico et lateralí late ferrugineis.

Longit. $4\frac{1}{4}$ lin. Latit. $2\frac{1}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. D. Siegwald.

Præcedenti proximus, sed multo brevior, posterius, magis angustatus, reticulatione minus densa, magis conspicuat et thoracis elytrorumque margine antico late ferrugineis præcipue diversus.

97. ACABUS HYPOMELAS: Ovalis, subconvexus, nitidus, striis anastomozantibus subtilissime reticulato-strigulosus, nigro-æneus, subtus niger, antennis, pedibus, thoracis elytrorumque margine lateralí ferrugineis.

Longit. $3\frac{3}{4}$ lin. Latit. 2 lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz* Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Proxime præcedente multo brevior, posterius haud angustatus, sed elytris versus apicem rotundatis, superficie multo subtilius strigulosa et aliis notis diversus.

98. HYDROPORUS GRISEO-STRIATUS *De Geer*: Elongato-ovalis, depressiusculus, vix pubescens, supra testaceo-ferrugineus, subtus niger, ano ferru-

N° II. 1843.

15

gineo, capite in vertice et inter oculos nigro, thorace ad latera vix rotundato, angulis basilibus, antice et postice nigro, maculis rotundatis duobus ante basin nigro-notato, elytris lineis septem plus minusve confluentibus, praeter suturam angustam, utrinque nigro-ornatis, lineis sexta et septina abbreviatis et in maculas confluentes interruptis, apice rotundato.

Longit. 2 lin. Latit. 1 lin.

Aubé, Spec. gén. VI. p. 541. 49.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 64.—*Stephens*, Illustr. of British Entom. V. p. 391. Manuel of British Coleopt. d. 66. 505.

HYPHYDRUS QUADRISTRATUS *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 107. 13.

HYPHYDRUS GRISEOSTRIATUS *Gyllenhal*, Insecta suecica. I. p. 523. 7.

Habitat in aquis insulae Uralaschkae frequens D. *Eschscholtz*.

*99. *HYDROPOKUS OBLONGUS* *Dejean*: Ovalis, valde elongatus, depressiusculus, punctulatus, subnitidulus, nigro-piceus, capite antice et in vertice vix ferrugineo, thorace ad latera oblique parum rotundato, elytris apice rotundatis, brunneis, vitta transversa ad basin maculaque ad latera ferrugineis, obsolete ornatis.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 65.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 605. 93.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

100. *HYDROPORUS HUMERALIS Eschscholtz*: Oblongo-ovalis, depresso, subtiliter punctulatus, pubescens, supra nigro-brunneus, subtus niger, capite antice et in vertice, thoraceque ad latera fere oblique rotundata obsolete ferrugineis, elytris apice rotundatis, vitta transversa ad basin maculisque tribus irregularibus externis confusis rufo-ferrugineis.

Longit. 1 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 65.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 578. 74.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

101. *GYRINUS PICIPES Eschscholtz*: Ovalis, convexus, coerulecenti-niger, nitidissimus, æneo-limbatus, elytris striato-punctatis, striis internis subtilissimis, interstitiis planis lævibus, subtus nigro-æneus, thoracis et elytrorum margine inflexo nigro-æneo, pedibus ferrugineis, elytris apice truncatis, angulo exteriore rotundato.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 66.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 694. 27.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

BRACHELYTRA.

102. **HOMALOTA MARITIMA** *Eschscholtz*: Linearis, de-
pressa, nigra, subtiliter griseo-pubescent, an-
tennis brevibus, thorace subquadrato, coleo-
pteris vix angustiore, longitudinaliter impres-
so, abdomine supra parcius subtiliterque
punctato, pedibus fusco-testaceis.

Longit. 1 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{1}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha ad littora maris D. *Eschscholtz*.

Statura fere *Tachysus*, sed tarsi hujus generis.

103. **HOMALOTA PICEIPENNIS**: Nigra, tenuiter pub-
escens, elytris piceo-castaneis, pedibus ferru-
gineis, thorace subquadrato, vix depresso,
basi obsoletius foveolato, abdomine supra an-
teriorius parce subtiliterque punctato.

Longit. 1 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in insula Sitkha DB. *Kuprianoff et Blaschke*.

H. sociali valde affinis et forsitan ejus varietas, sed thorace
anterius minus angustato, basi obsoletius foveolato et
antennis brevioribus diversa videtur.

104. **AEOCHARA CASTANEIPENNIS** *Eschscholtz*: Nigra,
subnitida, parce griseo-pubescent, elytris pe-
dibusque piceo-castaneis, illis thorace longioribus,
creberrime punctatis, thorace subrotun-
dato, abdomine sublineari, supra parcius pro-
funde punctato.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

A. *FUMATE* proxima, thorace anterius haud angustato, elytris longioribus et pubescentia densiore imprimis distincta.

105. *ALEOCHARA SULCICOLLIS*: Linearis, nigra, subnitida, pilis rigidis parce pubescens, thorace longitudinaliter profunde bisulcato, lateribus sparsim grosse punctato, elytris thoracis longitudine profunde rugoso-punctatis, abdomine parallelo parce punctulato, antennarum basi pedibusque rufo-piceis.

Longit. 1½ lin. Latit. ¼ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole communicatus.

A. *SUMACULATA* *Gravenhorst minor*, angustior, magis linearis, sulcis thoracis profundis et variis notis ab illa separanda.

106. *TACHINUS NIGRICORNIS*: Niger, nitidus, segmentorum abdominalis marginibus pedibusque obscure rufo-piceis, thorace lateribus vix rotundato, elytris thorace fere duplo longioribus.

Longit. 2½ lin. Latit. 1 lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; Mus. Univ. Imp. Mosqu.

T. *FLAVIPEDI* *Fabr. Erichson* non nihil affinis, sed thoracis lateribus vix rotundatis, elytris multo longioribus, attenuatis brevioribus crassioribus et colore distinctus.

Femina; abdominalis segmento superiore sexto bifido, la-

cinia intermedia longiore, latiore, apice acute acuminata.
Mas latet.

*107 **TACHINUS FRIGIDUS** *Erichson*: Niger, nitidus, antennarum basi, palpis, pedibus thoracisque limbo laterali rufo-ferrugineis, elytris thorace sesqui longioribus, piceis, puncto humerali margineque apicali ferrugineis.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Erichson, Genera et species Staphylinorum p. 256. 31.

Habitat in insula Unalaschka D. v. *Chamisso*.

Affinis **T. PALLIPEDI**, **RUFIPEDI** et **FLAVIPEDI** operis citati, ab hoc antennis basi rufis, ab illis statura minus convexa et capite thoraceque crebre evidenter punctatis distinguendus.

Mas: abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus acutiusculis, intermediis fortiter prominentibus; segmentis inferioribus 3—5 subimpressis, quinto apice leviter emarginato, margine intra sinum spongioso, sexto bifido, laciniis minus elongatis, compressis modice curvatis, acuminatis. Femina latet.

108. **TACHINUS PROPINQUUS**: Nigro-piceus, nitidus, antennarum basi, pedibus, thoracis latioris limbo, elytrisque castaneo-testaceis, his postice infuscatis.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 lin.

Habitat in insula Sitkha DD. *Kuprianoff* et *Blaschke*.

T. MARGINELLO *Fabr.* et **PIMETARIO** *Grav.* affinis, sed utroque major, multo latior et distinctius punctulatus.

Mas: abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus longitudine subæqualibus obtusis, segmento

inferiore quinto apice medio profunde sinuato, sinu utrinque carinula terminato, sexto profunde inciso, laciniis triangularibus modice acuminatis.

Femina; abdomine segmento superiore sexto apice quadridido, laciniis triangularibus, acuminatis.

Var. b. nigrior, thorace margine laterali et elytris nigris, margine tantum apicali rufescentibus.

- 109. TACHINUS .ELONGATUS Gyllenhal** : Elongatus, nigro-piceus, nitidus, antennis pedibusque rufis, elytris subtiliter substriato-punctatis, margine apicali rufiscente.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 4 lin. Latit. 5 $\frac{1}{4}$, 1 lin.

Gyllenhal, Insecta suecica II. 251. 1.—*Zetterstedt*, Fauna laponica I. 61. I. Insecta laponica 56. 1.—*Erichson*, Genera et Spec Staphylin p. 265. 34.

Var. b. thorace elytrisque rufo-piceis.

T. FERRUGINEUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in insula Unalashka DD. *Eschscholtz* et v. *Chamisso*; ubi tantum Var. b. lecta.

Mas: abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus minutis, intermedijis paulo magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice late profundeque emarginato, sexto bisido, laciniis validis, elongatis, compressis, fortius deorsum curvatis, apice acuminatis.

Femina: abdominis segmento superiore sexto apice quadridido, laciniis subæqualibus, acuminatis.

- 110. OTHIUS MACROCEPHALUS Eschscholtz**: Piceus, nitidus, palpis, antennis, capite thoraceque postice abdominisque segmentorum marginibus rufescentibus, elytrorum dimidia parte

anteriore cum sutura pedibusque rufo-testaceis, thorace utrinque tripunctato, elytris subtiliter punctulatis, stria suturali impressa.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ lin.

Erichson, Gen. et Spec. Staphylin. p. 279. 5.

GYROHYPNUS MACROCEPHALUS Nordman, Symbolæ ad Monographiam Staphylinorum. p. 124. 26.

Habitat in insula Sitkha ad littora maris DD. *Eschscholtz, Kuprianoff et Blaschke.*

Mas: capite thorace fere duplo latiore, quadrato, abdominis segmento sexto subtus apice emarginato.

Femina: capite thorace vix sesqui latiore, quadrato, abdominis segmento sexto subtus apice rotundato.

111. *OTHIUS CALIFORNICUS Eschscholtz*: Piceus, nitidus, ore, antennis thorace basi et apice pedibusque rufescentibus, thoracis seriebus dorsalibus 5-punctatis, elytris subtiliter punctulatis, stria suturali impressa.

Longit. 2 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{1}{2}$ lin.

SAURIODES CALIFORNICUS? Dejean, Cat. 3^{me} édit p. 72.

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

O. PILICORNI Paykull, Erichs. similis, sed capite angustiore, thorace elytrisque longioribus ut et punctura thoracis distinctus.

112. *STAPHYLINUS VILLOSUS Gravenhorst*. Niger, nitidus, thorace antice utrinque cinereo-villoso, angulis posterioribus obtusis, elytris fascia cinerea, subtus pectore abdominalisque segmentis quatuor primis cinereo-tomentosis.

Longit. 7, 9 lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Gravenhorst Microphra p. 160. 2. Monog. Micropt. p. 126, 149.—Erichson, Gen. et Spec. Staphylin. p. 319. 4.

CREOPHILUS VILLOSUS Nordman Symb. ad Monogr. Staph. p. 21. 2.

EMUS VILLOSUS Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 67.

Habitat in California D. *Tschernikh*; in America septentrionali, Mexico et Cuba indigenus.

113. *STAPHYLINUS BICINCTUS Eschscholtz*: Niger, nitidus, thorace antice vix latiore, ibique utrinque dense cinereo-villoso, angulis posterioribus subrotundatis, elytris fascia angusta cinerea, abdomine subtus segmento secundo tertioque cinereo-tomentosis, pectore nigropubescente.

VAR. b. thorace omnino glabro denudato.

Longit. 7 lin. Latit. 2 $\frac{1}{3}$ lin.

EMUS VILLOSUS VAR. MANDIBULARIS Eschsch. Dejean. Cat. 3^{me} édit. p. 67.

CREOPHILUS FASCIATUS? Laporte Etud. entom. p. 111.

Habitat in insula Sitkha DD. *Bluschke* et *Tschernikh*; Var. b. mihi dedit D. *Eschscholtz*.

ST. ARCTICO *Erichson* affinis, sed paullo angustior, thorace antice multo angustiore et antennis crassioribus diversus.

114. *STAPHYLINUS TARSALIS*: Nigro-fuscus, pubescens, capite thoraceque creberrime rugulosopunctatis, carinula longitudinali levissima notatis, elytris atro-holosericeo-variegatis, ab-

domine bifariam atro-maculato, tarsis obscure ferrugineis.

Longit. 6 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. Tschernikh.

Ad Fam. VIII. Gen. et Spec. Staphyl. cel. *Erichsonii* adnumerandus.

115. **PHILONTHUS CALIFORNICUS** *Eschscholtz*: Niger, nitidus, elytris nigro-aeneis, capite subquadrato, thorace lateribus sub-sinuato, utrinque haud impresso, angulis anticis vix deflexis, seriebus dorsalibus quadripunctatis, abdomine subtilius punctulato, cinereo-pubescente.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

Ph. *ENEO*, Fabr. magnitudine et statura valde affinis, sed colore, thoracis angulis anticis vix deflexis, lateribus haud impressis distinctus mihi videtur.

116. **PHILONTHUS SIEGWALDII**. Niger, nitidus, femoribus coxisque anterioribus piceis, thorace seriebus dorsalibus punctis sex profunde impressis approximatis, elytris nigro-aeneis, dense et profunde punctatis, capite suborbiculato.

Longit. 2 $\frac{1}{3}$, 3 lin. Latit. 2/3, 5/8 lin.

Habitat in insula Sitkha DD. *Siegwald*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

Tarsi antice in utrinque sexu simplices. Maris abdomine segmento quinto ventrali apice profunde emarginato, seminæ integræ.

117. **PHILONTHUS ALBIONICUS Eschscholtz:** Niger, subnitidus, pedibus cum coxis rufo-piceis, capite ovato, thorace seriebus dorsalibus punctis septem impressis, lateribus parce punctato.

Longit. 3 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$ lin.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

Habitu fere *Ph. micantis* Grav. sed major et variis notis ab illo distinguendus.

118. **QUEDIUS PLACIATUS:** Niger, nitidus, thoracis margine antico, segmentorum abdominis marginibus, pedibus elytrisque rufis, his glabris sublaevibus, in utroque plaga magna nigro-fusca, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis.

Longit. 3 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Qu. *LEVIGATO Gyllenhal* valde affinis, sed thorax angustior, lateribus multo minus rotundato-dilatatis et color alias.

119. **QUEDIUS PEDICULUS Eschscholtz:** Niger nitidus, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis, elytris biseriatim punctatis, piceo-marginatis, fronte inter oculos quadripunctata.

Longit. 3, 3 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$, 1 lin.

Erichson, Gen. et Spec. Staphyl. p. 531. 9.

PHILONTHUS PEDICULUS Nordman, Symb. ad Monogr. Staphyl. p. 79. 24.

Habitat in insula Unalaschka DD. *Eschscholtz* et v. *Chamisso*; frequentissimus in capillis Aleutorum adipe piscario vel phocæo immunde imbutis, unde denominatio.

120. Quedius brunnipennis: Nigro-aeneus, subnitus, elytris parce profunde punctatis, marginibusque segmentorum abdominalium rufo-brunneis, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis, fronte inter oculos bipunctata.

Longit. 2 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 2 $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*, Mus. Univ. Imp. Mosqu.

121. Quedius molochinus *Gravenhorst*: Niger, nitidus, antennis pedibusque rufo-piceis, elytris thorace brevioribus, castaneis, scutello punctulato, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis.

Longit. 4, 5 lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Erichson, Gen. et Spec. Staphyl. p. 535. 18. Käfer der Mark Brand. I. p. 489. 8.

Staphylinus molochinus Gravenhorst, Monogr. Micropt. p. 46. 6.—*Gyllenhal* Insecta suecica II. p. 302. 20.—*Sahlberg*, Insecta fennica I. p. 314. 17.—*Mannerheim*, Précis des Brachelytr. p. 25. 28.—*Runde*, Brachel. spec. p. 5. 21.

Emus molochinus Boisduval et Lacordaire, faune entom. des envir. de Paris I. p. 377. 28.

Philonthus molochinus Nordman, Symb. ad Monogr. Staphyl. p. 76. 6.

STAPHYLINUS LATICOLLIS Gravenhorst Microp. Bransv. p. 173..

28. Mon. Micr. p. 47. 8.

STAPH. PICEIPENNIS Paykull, Fauna suecica III. p. 373. 2.

STAPH. LAPponicus Zetterstedt, Insecta lapponica p. 61. 12.

STAPH. LIEVCOLLIS Runde Brachel. spec. p. 6. 21.

MICROSAURUS MOLOCHINUS Dejean, Cat. 3^{me} p. 69.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz, Mus. Univ. Imp. Mosqu., in omni Europa et America septentrionali obvius.

*122. **QUEDIUS HYPERBOREUS** Erichson: Niger, pedibus anterioribus cum coxis antennisque piceo-testaceis, thoracis seriebus dorsalibus tri-punctatis, elytris thorace brevioribus, nigro-subæneis, subtiliter punctulatis.

Longit. 3 lin.

Erichson, Gen. et Spec. Staphyl. p. 547. 35.

Habitat in insula Unalashka D. Chamisso.

123. **OXYTELUS FUSCIPENNIS**: Niger, nitidus, antenarum basi pedibusque testaceis, elytris bruno-piceis, thorace trisulcato, fronte punctulata, antice impressa lævique.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha DD. Kuprianoff et Blaschke.

O. LUTEIPENNI Erichson (PICEO Gyllenhal, Mannerh.) proximus, sed minor, fortius punctatus, frontis sulcis deficiens et colore elytrorum diversus.

Abdominis segmentum inferius sextum maris integrum, septimum leviter bisinuatum, lobo intermedio in mucronem parvum producto. Femina latet.

124. ANTHOPHACUS LATICOLLIS : Niger , pubescens , crebre subtiliterque punctulatus, fronte lineis duabus obliquis profunde impressis in vertice connexis, thorace brevi lato subquadrato, subdepresso, ad angulos utrinque impresso , medio tenue canaliculato.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{5}{8}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. Kuprianoff.

A. PLAGIATO *Paykull* colore subsimilis , sed nigrior, obscurior et thoracis structura ab omnibus congeneribus distingendum.

125. ARPEDIUM TESTACEUM Eschscholtz: Pallide testaceum, parum nitidum , capite pectoreque nigris, oculis magnis prominulis , capite thoraceque subquadrato crebre subtilissime punctulatis , hoc medio canaliculato , lateribus late explanato , elytris fortius profundiusque punctatis.

VÄR. b. abdomine etiam nigro.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lin. Latit. $\frac{2}{5}$, 1 lin.

HETEROPS TESTACEUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in insula Sitkha DD. Eschscholtz , Kuprianoff et Blaschke.

126. ARPEDIUM MACULICOLLE : Nigrum , parum nitidum, antennarum basi , thorace elytris pedibusque pallide flavo-testaceis, thorace subquadrato , lateribus late explanato , dorso medio nigro, elytris fortiter transversim rugosis.

Longit. 1 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. $\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D Tschernikh.

127. **OMALIUM PLACIATUM**: Nigrum, nitidulum, antennis pedibusque testaceis, elytris antrorsum plaga utrinque magna obliqua rufo-ferruginea, capite thoraceque creberrime subtilissime, elytris paulo fortius punctatis.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

128. **ANTHOBIUM FIMETARIUM** Eschscholtz: Depressum, rufo-piceum, subnitidum, crebre punctatum, antennarum basi, thoracis elytrorumque limbo pedibusque pallidioribus, capite nigro, thorace transverso canaliculato, elytris substriatis, abdomen fere totum obtegentibus, maris truncatis, feminæ apice interiore sinuato-acuminatis.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lin. Latit. $\frac{3}{4}$, 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Erichson, Genera et Spec. Staphylin. p. 899. 19.

OMALIUM FIMETARIUM Mannerh. Précis des Brachel. p. 52. 10.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz.

129. **ANTHOBIUM POTROS** Eschscholtz: Rufo-testaceum, capite thoraceque transverso canaliculato subtiliter punctulatis, elytris abdomine parum brevioribus profunde punctatis, apice in utroque sexu truncatis, abdomine maris nigro.

Longit. 1, 1¹/₃ lin. Latit. 2²/₃, 3³/₄ lin.

Habitat in iusula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

A. *OPHTHALMICO* *Paykull* *majus*, *convexus* et ab illo in multis diversum.

STERNOXI

*130. *APATURA DRUMMONDI* *Kirby*: Supra nigro-aenea, subtus aenea, nitida; prothorace varie acuducto disco fere concentrice; elytris punctulatis integerrimis, guttis tribus luteis triangulo ordinatis.

VAR. B. Elytris maculis quatuor luteis: 2, 1, 1.

Longit. 5 lin. Latit. 1³/₄ lin.

Laporte et Gory Monographie des Buprestides, *Apatura* p. 3. Tab. 1. fig. 3.

BUPRESTIS (TRACHYPTERIS) DRUMMONDI *Kirby* in *Richardson* Fauna boreali-americana IV. p. 159. 11. Tab. II. fig. 2. Var. b.

BUPRESTIS DISCOPUNCTATA? *Faldermann*, Bullet. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 47. Tab. 2. fig. 5.

APATURA DISCOPUNCTATA? *Laporte et Gory* l. c. p. 3. Tab. 1. fig. 2.

BUPRESTIS GUTTULATA? *Gebler*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VIII. p. 41. 5.

PHENOPS GEBLERI? *Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 89.

Habitat in California et in Rocky Mountains Amer. bor. *Kirby*; etiam in Mongolia et Sibiria, si *BUPR. DISCOPUNCTATA* eadem sit species.

131. BUPRESTIS RUSTICORUM Kirby: Nigro-aenea, nitida, fronte, genis ventrisque lateribus fulvo-maculatis, elytris granulatis profunde striatis, apice rotundatis.

Longit. 9 lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$ lin.

*Laporte et Gory, Monographie des Buprest. Suppl. p. 117.
Tab. 20. fig. 115.*

BUPRESTIS (ANOPLIS) RUSTICORUM Kirby in *Richardson Fauna boreali-americana IV.* p. 151. 1.

Var. b. segmento ultimo ventrali basi transversim sanguineo, reliquis immaculatis, cætera ut in a.

Habitat in California. Specimen a D. Admirali Wrangel, allatum in Mus. Imp. Acad. Scient. Petropolit. assertatur.

132. BUPRESTIS LANGII: Oblonga, deppressa, viridi-aurea, capite thoracisque disco coerulecentibus, capite rugoso, thorace profunde punctato, elytris dense costatis, interstitiis rugulosis, apice truncatis, muticis.

Longit. 8 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3 lin.

Habitat in insula Sitka D. Bluschke.

***133. ANTHAXIA AENECASTER Reiche:** Supra nigro-purpurea, thorace lateribus rotundato, elytris punctis rotundatis impressis, corpore subtus pedibusque nigris, nitidis.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

*Laporte et Gory, Monogr. des Buprest. Anthaxia p. 32.
Tab. 7. fig. 44.*

Habitat in California.

N° II. 1843.

16

*134. EPIPHANIS CORNUTUS *Eschscholtz*: Rufo-ferrugineus, capite nigro, antennis articulis quatuor ultimis elongatis (*), fronte cornu compresso, thorace transverso nigro, angulis posticis ferrugineis.

Longit. 2⁴/₈ lin.

Eschscholtz, Zoolog. Atlas. I. p. 10. Tab. IV. fig. 6.—In Thon Entomologisches Archiv. II. 1. p. 35.—Laporte in Silbermann, Revue entom. III. p. 177.

Habitat in insula Sitkha rarissime, specimen unicum prope truncum vetustum Pini volitans cepit D. *Eschscholtz*.

*135. CARDIOPHQRUS LATIUSCULUS *Eschscholtz*: Niger, frontis margine reflexo, thorace lato canaliculato, fusco-tomentoso, pedum geniculis ferrugineis.

Longit. 3³/₈ lin.

Eschscholtz in Thon, Entomol. Archiv. II. 1. p. 34.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

136. CARDIOPHORUS CALIFORNICUS: Elongatus niger, punctatissimus, tenue pubescens, thorace convexo, subquadrato, elytris dorso depressis, leviter punctato-striatis, sterno profunde punctato, convexo, tarsis articulis omnibus et unguiculis simplicibus.

(*) Die Beschreibung der Fühlhörner, als zur Characteristik der Gattung gehörend, wird in der vollständigen Fauna, wo diese Charakteristik besonders auseinander gesetzt wird, aus der Art Diagnose weggelassen werden.

Longit. 5¹/₃, 4³/₄ lin. Latit. 1²/₃, 1³/₄ lin.

Habitat in California DD. *Blaschke et Tschernikh.*

137. **CARDIOPHORUS TANTILLUS**: Oblongus, niger, fusco-pubescent, profunde punctatus, thorace convexo, lateribus haud dilatato, elytris profunde punctato-striatis, tarsorum articulo quarto appendiculato, unguiculi simplicibus

Longit. 2 lin. Latit. 5/₄ lin.

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

138. **CRYPTOHYPNUS NOCTURNUS Eschscholtz**: Supra nigro-æneus pilosus, thorace planiusculo, medio dilatato punctulato, elytris simpliciter striatis, in interstitiis punctulatis, antennis nigris, pedibus fuscis, tarsis articulis simplicibus.

Longit. 3, 3¹/₂ lin. Latit. 1¹/₄, 1¹/₂ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 105.

HYPOLITHUS NOCTURNUS Eschscholtz in *Thon Entom. Archiv.* II. 1. p. 33.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz, Kuprianoff et Blaschke.*

*139. **CRYPTOHYPNUS MUSCULUS Eschscholtz**: Brevis, æruginosus; pubescens, thorace lato rotundato, convexo, elytris striatis, interstitiis rugulosis, pedibus flavis, geniculis fuscis, tarsis articulis simplicibus.

Longit. 1¹/₅ lin.

HYPOLITES MUSCULUS *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.*
II. 1. p. 33.

ELATER MUSCULUS *Eschscholtz*, *Entomographien* p. 70. 43.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

140. CRYPTOHYPNUS CINEREIPENNIS *Eschscholtz*: Nigro-fuscus, thorace brevi, medio dilatato, convexo, parcius punctulato, saepe angulis omnibus ferrugineis, elytris striatis brunneo-piceis, tarsis articulis quarto appendiculato.

Longit. 2 $\frac{1}{4}$, 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1, 2 lin.

MONOCREPIDIUS CINEREIPENNIS *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.* II. 1. p. 32.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 98.

Habitat in California DD. *Eschscholtz et Siegwald*.

141. CRYPTOHYPNUS PUBERULUS : Nigro-fuscens, griseo-pubescentia, thorace punctatissimo, lateribus vix dilatato, angulis posticis rufescientibus, elytris punctato-striatis, basi rufescientibus, tarsis articulo quarto appendiculato.

Longit. 1 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

Præcedente paullo minor, pubescentia et punctura multo densiore, thoraceque angustiore diversus.

142. ELATER CARBONICOLOR *Eschscholtz*: Ater, angustus, nigro-pubescentia, thorace longiore subtiliter punctato, elytris profunde punctato-striatis, antennis nigris, pedibus fuscis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 lin.

Eschscholtz, in *Entomol. Archiv.* II. 1. p. 33.

AMPEDEUS CARBONICOLOR Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 105.

Habitat in insula Sitkha DD, Eschscholtz, Kuprianoff et Blaschke.

*143. **DIACANTHUS RESPLENDENS** Eschscholtz: Cupreо-æneus, nitidissimus, glaber, elytris viridibus, sparsim et subtilissime punctulatis, thorace subquadrato punctatissimo.

Longit. 6 lin.

LUDIUS RESPLENDENS Eschscholtz in Thon Entom. Archiv. II. 1. p. 34.—Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 107.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz.

144. **DIACANTHUS ANGUSTICOLLIS**: Elongatus, nigro-æneus, griseo-pilosus, thorace elongato profunde punctato, angulis posticis productis, divaricatis, apice truncatis, elytris punctato-striatis, margine pedumque geniculis rufoferrugineis.

Longit. 6 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

145. **DIACANTHUS SERRICORNIS**: Elongatus, fusco-testaceus, punctatissimus, griseo-pubescentes, thoracis angulis posticis valde productis divaricatis, elytris striatis, antennis serratis, corpore subtus pedibusque piceo-testaceis.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

*146. **DIACANTHUS VOLITANS** Eschscholtz: Niger, tenui tomentosus, thoracis lateribus, elytris

pedibusque rufo-ferrugineis, thorace elongato,
densissime punctulato, lateribus explanato.

VAR. b. elytris brunneis.

Longit. 7, 8 $\frac{1}{2}$ lin.

LUDIUS VOLITANS Eschscholtz in *Thon Entom. Archiv.* II. 1
p. 34.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 107.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

*147. *DIACANTHUS SAGITTICOLLIS Eschscholtz*: Niger,
flavo-pilosus, elytris pedumque geniculis rufo-
ferrugineis, thorace elytris angustiore, pun-
ctatissimo, angulis posticis spinis angustis di-
varicatis.

Longit. 6 lin.

LUDIUS SAGITTICOLLIS Eschscholtz in *Thon Entom. Archiv.*
II. 1. p. 34.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 107.

Habitat in Sitkha D. *Eschscholtz*.

148. *DIACANTHUS UMBRICOLA Eschscholtz*: Elongatus,
niger, cinereo-pilosus, thorace elongato, late-
ribus densissime punctato, in medio sparsim
punctulato, basi angustato, angulis latioribus
divaricatis rufis, antennarum articulo tertio
elongato.

VAR. b. angulis posticis thoracis fuscis.

Longit. 5, 6 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

LUDIUS UMBRICOLA Eschscholtz in *Thon Entom. Archiv.* II.
1. p. 34.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 107.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et
Blaschke.

149. DIACANTHUS LOBATUS Eschscholtz : Oblongus , niger , subæneus , cinereo-pubescent , thorace elongato sublineari , angulis posticis productis divaricatis , apice ipso truncatis , lobo medio marginis postici emarginato , antennarum articulo tertio elongato.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

ELATER LOBATUS Eschscholtz Entomographien p. 69. 41. (♀).

LUDIUS LOBATUS Eschscholtz in Thon Entom. Archiv. II. 1. p. 34.

LUDIUS CARICINUS Eschscholtz , Dejean , Cat. 3^{me} édit. p. 107. (♂).

Habitat in insulis Unalaschka et Sitkha DD. Eschscholtz et Kuprianoff.

***150. DIACANTHUS DIVERSICOLOR Eschscholtz** : Ater , glaber , nitidus , thorace rufo , convexo , vage punctulato , tenui canaliculato , basi coarctato , angulis posticis acutis nigris , elytris nigro-æneis.

Longit. 5 lin.

LUDIUS DIVERSICOLOR Eschscholtz in Thon Entom. Archiv. II. 1. p. 34.

Habitat in California D. Eschscholtz.

151. DOLOPIUS CALIFORNICUS Dejean : Elongatus , fuscus , pubescens thoracis marginibus omnibus , elytrorum sutura , antennis pedibusque fusco-ferrugineis , thorace punctatissimo , elytris striatis , intersticiis subtiliter transversim rugulosis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 108.

DOLOPUS LATERALIS *Eschscholtz* in *Thon*, Entom. Archiv.
II. 1. p 34

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

152. *ATHOUS FERRUGINOSUS* *Eschscholtz*: Elongatus, fuscus, elytris, abdomine, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, thorace elongato punctatissimo, angulis posticis ferrugineis, maris antrorum angustato, angulis posticis nonnihil productis, feminæ lateribus parallelis, angulis posticis obtusis magis divaricatis; elytris punctatis leviter punctato-striatis.

Var. b. rufo-ferrugineus, capite nigro-fusco.

Var. c. fusco-piceus, antennis, elytrorum margine, geniculis, tibiis tarassisque ferrugineis.

Longit. 4, 6 lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{2}$, lin.

Eschscholtz in *Thon* Entom. Archiv. II. 1. p. 33.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 102.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke.*

153. *ATHOUS PALLIDIPENNIS*: Elongatus, niger, griseo-pubescent, elytris ferrugineo-testaceis punctatis, obsolete punctato-striatis, thorace oblongo, antrorum angustato, punctato, obsolete canaliculato.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke.*

A. SCRUTATORI *Herbst* colore similis sed minor et multo angustior.

*154. ATHOUS RUFIVENTRIS *Eschscholtz*: Ater, fronte excavata, thorace punctatissimo, angulis basi planis, elytris castaneis, abdomine pedibusque rufo-ferrugineis.

Longit. 5 $\frac{1}{2}$ lin.

Eschscholtz in *Thon*, Entom. Archiv. II. 1. p 33.

ELATER RUFIVENTRIS *Eschscholtz*, Entomographien p. 71. 43.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

MALACODERMI.

155. DICTYOPTERUS HAMATUS *Eschscholtz*: Valde elongatus, sanguineo-coccineus, subtiliter pubescens, thorace brevi, obsoletius reticulato-costato, elytris costatis, interstitiis latioribus bifariam reticulatis, antennis elongatis subserratis abdomineque nigro, coxis posterioribus productis. acutis.

Longit. 5, 7 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$, 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 119.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

156. DICTYOPTERUS SIMPLICIPES *Eschscholtz*: Elongatus, sanguineus, thorace longiore, elevatus reticulato-costato, medio infuscato, elytris costatis, interstitiis angustioribus, bifariam reticulatis, antennis brevioribus crassis sub-

setaceis, corpore subtus coxis haud productis
tarsisque nigris.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 112.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

Præcedente multo minor, brevior, thoracis longioris struc-
ctura et coxis inermibus mox distinguendus.

157. **RHAGONYCHA PINIPHILA** *Eschscholtz*: Lineari-
elongata, nigra, pubescens, mandibulis, palpis,
antennarum articulis tribus baseos subtus
obscure testaceis, thorace longiore subqua-
drato, dorso canaliculato, utrinque longitudi-
naliter subcarinato.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2/3, 1 lin.

Eschscholtz, Bulletin de la Soc. Imp. de Moscou II. p. 65.

PODABRUS PINIPHILUS *Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 118.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et
Blaschke.

158. **CANTHARIS NOTATA**: Nigro-fusca, pubescens,
fronte, ore, antennis, thorace oblongo-qua-
drato, pedibus abdominisque margine rufo-
ferrugineis, thoracis disco macula parva un-
dulata nigra, elytris rugoso-punctulatis, ele-
vato-lineato.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh*.

159. **SILIS PALLIDA** *Eschscholtz*: Elongata, nigra;
mandibulis geniculisque pallidis, thorace ely-

trisque luteo-testaceis, nigro-limbatis, thorace transverso inaequali postice utrinque profunde exciso, angulo basali hamato.

Longit. 2, 2 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 191.

Habitat in insula Sitka DD. *Eschscholtz*, *Kuprianooff* et *Blaschke*.

160. COLLOPS HISTRIO Eschscholtz: Niger, capite antice antennarumque basi testaceis, thorace rufi, elytris testaceis maculis duabus nigro-virescentibus.

Mas: antennarum articulo primo incrassato, tertio maximo irregulari intus concavo, tarsis anticis 4-articulatis.

Femina: antennarum articulis 1 et 3 reliquis crassioribus, simplicibus tarsis omnibus 5-articulatis.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Erichson, Entomographien p. 59. 9.

MALACHIUS HISTRIO Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 192.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

161. DASYTES LATICOLLIS: Oblongis, subcylindricus, supra nigro-aeneus, remote punctulatus, parce griseo-pubescent, subtus niger, capite lato clypeo triangulari, thorace transverso, elytrorum latitudine, elytris dorso subdepressis.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2 $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

162. DASYTES PARVICOLLIS : Elongatus, subcylindricus, supra nigro-aeneus, remate subtilius punctulatus, dense griseo-pubescent, subtus niger, capite minore rotundato, thorace elytris angustiore subrotundato, elytris dorso subconvexis.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

163. DASYTES CANESCENS *Eschscholtz* : Oblongus, subcylindricus, nigro-aeneus, griseo-pubescent, thoracis medio et lateribus elytrorumque macula utrinque baseos humerum ambiente et fasciis duabus posterioribus transversis denudatis, antennis basi rufo-testaceis, thorace elytrorum fere latitudine.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. $\frac{1}{3}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 195

Habitat in California D. Eschscholtz; ad describendum benevole communicavit Excell. D. Fischer de Waldheim.

TEREDILES.

164. CLERUS EXIMIUS: Niger, hirtus, capite thorace, corpore subtus pedibusque dense canopilosis, thorace maculis duabus nigris, elytris nigro-cyaneis, macula triangulari baseos, fascia media anterius acuminata, margine cum macula basali connexa suturaque posterius coc-

cineis, elytrorum apice cano-piloso, medio nigro-maculato.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Lectus a D. Blaschke in nave e California ad Americam meridionalem iter faciente, ideoque verosimile Californiam incola.

165. CORYNETES RUFIPES Fabricius: Viridi-caeruleus, supra nigro-pilosus, subtus griseo-pubescentia, thorace punctulato, elytris striatopunctatis, antennarum basi pedibusque rufis.

Longit. 2 $\frac{1}{3}$, 2 $\frac{1}{2}$, lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{2}$, lin.

Fabricius, Systema Eleuther. I. p. 286. 2.—*Herbst*, Natur. syst. aller Ins. IV. p. 151, 2.

Schönherr, Synonym. Insect. II. p. 51. 2.—*Boisduval*, Faune entom. de l'Océanie p. 143.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 197.

NECROBIA RUFIPES Olivier Entomologie IV. 76 bis. p. 5. 2. Tab. 1 fig. 2. a b.—*Latrelle* Hist. nat. des Crust. et des Ins. IX. p. 156. 2.—*Stephens* Illustr. of British Entomology. III. p. 327. Manual of British. Coleopt. p. 178. 1570.

VAR. b. Cæruleo-violaceus, elytris subtiliter rugulosis, cætera ut in a.

C. RETICULATUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California; VAR. a. a D. Blaschke, VAR. b. a DD. Eschscholtz et Blaschke allatæ. Occurrit in Europa meridionali, Asia, Africa, America et Nova Hollandia.

166. ANOBIUM PANICEUM Linné. Ovatum, breve, subcylindricum, ferrugineum, sericeo-pubescentia, thorace convexo æquo, elytris tenue

striatis, punctis minutissimis in striis impressis, interstitiis subtilissime rugulosis.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lin. Latit. $\frac{2}{3}$, 1 lin.

Fabr. Syst. El. I. p. 323. 9.—Oliv. Entom. II. 16. p. 10. 8. T. 2. fig. 9. a, b.—Herbst. Natursyst. V p. 59. 5. Tab. 47. fig. 6.—Gyllenhal, Ins. suec. I. p. 293. 5.—Schönherr, Syn. Ins, II. p. 105. 15.—Latreille Hist. natur. des Crust. et des Ins. IX. p. 183. 5.—Sturm, Deutschl. Fauna. XI. p. 135. 18.—Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 130.—Stephens, Illustr. of British Entom. III. 340. Manual of British Coleopt. p. 201. 1596.

DERMESTES PANICEUS Linné, Fauna suecica p. 145. 431. Systema Naturæ I. II. p. 564. 19.

Habitat in California D. Blaschke; insectum per totam orbem obvium.

167. PTINUS FUR Linné: *Fusco ferrugineus pubescens, thorace quadri-fasciculato, elytris crenato-striatis interrupte albo-bifasciatis, femoribus elongatis, clavatis.*

Mas: *elytris oblongis subcylindricis.*

Femina: *elytris gibbosis ovatis.*

Longit. 1 $\frac{1}{2}$ 2 lin. Latit. $\frac{2}{3}$, 1 lin.

Linné Systema Naturæ II. p. 566. 5.—*Fabr. Syst. El. I. p. 325. 6.—Oliv. Entom. II. 17. p. 6. 3. Tab. fig. 1—Latreille. Hist. nat. des Crust. et des Ins. IX. p. 173. 2.—Gyllenhal, Ins. succ. I. p. 307. 5.—Schönherr, Syn. Ins. II. p. 107. 5.—Stephens Illustr. of British Entom. III. 334. Manual of British Coleopt. p. 200. 1581.—Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 130.*

CERAMBIX FUR Linné, Fauna suec. p. 190. 657.

VAR. b. testaceus *immaculatus.*

PTINUS LATRO *Fabr. Syst. El. I. p. 396. 9. (♂).—Oliv. Ent.*

II. 17. p. 7. 4. Tab. 1. fig. 3. (♀).

PTINUS TESTACEUS *Oliv. Ent. II. 17. p. 9. 8. Tab. 2. fig. 9. (♂).*

Habitat in insula Sitkha et in California D. *Blaschke.*

Species valde noxia in omnibus terræ regionibus vul-
gata.

CLAVICORNIA.

168. NECROPHORUS NICRITA: Niger, thorace glabro,
basi punctato, elytris supra æqualibus sub-
tiliter punctulatis, seriebus tribus e punctis
minutis impressis, antennarum clava aurantiaca,
pectore nigro-piloso, abdomine glabro,
tibiis posticis rectis.

Longit. 9 lin. Latit. 4 lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

N. HUMATORI *Graze similis*, elytris subtiliter punctulatis,
absque ulla lineis elevatis pectoreque nigro-piloso ab
illo vero omnino diversus. **N. LATERALIS** et **AUROPILOSUM**
Eschsch.; e California in Catalogo ill. Com. *Dejean*
in scripti, mihi ignoti, sed vix ad speciem jam de-
scriptam referendi.

169. NECROPHORUS MARITIMUS *Eschscholtz*: Niger,
thorace glabro, antennarum clava elytrorum-
que fasciis duabus aurantiacis, pectore dense
griseo-pubescente, abdomine glabro, tibiis
posticis rectis.

VAR. b. feminæ; fascia elytrorum anteriore evanescente, loco ejus punctis tantum duobus in utroque elytro, et margine inflexo angustius aurantiaco.

VAR. c. utriusque sexus, ut VAR. b., sed fascia elytrorum anteriore omnino deficiente et posteriore angustiore.

Longit. 9 lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 131.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*;

VARIED. c. Mus. Univ. Imp. Mosqu. specimina tria examinavi.

N. RUSPATORI *Erickson* (*VESTIGATORI Gyllenh*) similis, sed differt imprimis elytris longioribus, postice latioribus, dorso magis depresso et fasciis angustioribus, abdomine toto glabro.

170. *SILPHA CERVARIA* *Eschscholtz*: Ovata, leviter convexa, nigra, opaca, thorace antice parum emarginato, supra coriaceo, elytris lineis tribus elevatis undulatis, intersticiis lineis confuse ramosis.

VAR. b. elytris obscure virescente-aeneis, evidentius granulato-punctatis.

Longit. 6 lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 132.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*; specimen VAR. a. benevolentiss D. *Obert* debeo; VAR. b. in Mus. Univ. Imp. Mosqu. asservatam ad describendum communicavit D. *Rouillier*.

Satura et magnitudo S. RETICULATE Fabr. thorace con-
vexo coriaceo ei similis , sed thorax in hac specie an-
teriorius angustatus apice nonnihil emarginatus et elytro-
rum sculptura valde diversa.

171. SILPHA CALIFORNICA Eschscholtz: Ovata, brevis,
depressa , nigra , capite thoraceque griseo-
tomentosis, elytris trilineatis, interstitiis tuber-
culis globosis, subseriatis.

Femina : elytris apice sinuatis , juxta sutu-
ram valde candato-productis.

Mas latet.

VAR. b. tuberculis in interstitiis elytrorum
longe ante apicem evanidis.

Longit. 4³/₈, 5¹/₂ lin. Latit. 3, 3¹/₂ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 132.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.* **VAR.**
b. a D. Dr. *Fischer* ad Ross capta.

S. CAUDATE Say (TURBACULATE *Germar*) affinis, sed brevior,
lator, thoracis basi magis sinuato et elytrorum tuber-
culis rarioribus distincta.

172. NECROPHILUS HYDROPHILOIDES Eschscholtz :
Ovatus , convexus , brunneo-piceus , thoracis
elytrorumque marginibus dilutioribus , tho-
race transverso , apice angustato , elytris pro-
funde crenato-striatis.

Longit. 5 lin. Latit. 3 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 132.

PTOMOPHAGA HYDROPHILOIDES Eschscholtz in litteris.

N° II. 1843.

17

PELATES ESCHSCHOLTZ *Fischer de Waldheim in litteris.*

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz.

N. SUBTERRANEO *Illiger* fere quadruplo major, longior, thorace breviore et variis notis distinctus.

173. CATOPS CADAVERINUS *Eschscholtz*: Oblongo-ovatus, fusco-piceus, tenue pubescens, antennis mediocribus, clavatis, basi ferrugineis, thorace brevi transverso, basi parum latiore, angulis posticis obtusis, elytris rufescentibus punctatis, stria suturali impressa, pedibus ferrugineo-piceis, femoribus infuscatis.

Longit. 1 1/2 lin. Latit. 1 lin.

CATOPS FUSCUS *Hoffmannsegg* VAR. *Dejean*, Cat. 3^{me} édit.
p. 133.

Habitat in insula Sitkha DD. Eschscholtz et Kuprianoff.

C. MORIONI *Fabr. Erichs.* (*rusco Gyllenh.*) nonnihil affinis, thorace minore, angustiore et elytris longioribus ab illo distinguendus.

174. CARPOPHILUS HEMIPTERUS *Linné*: Oblongo-ovatus, supra nigro-fuscus, pubescens, elytris dimidiatis, macula humerali apiceque late flavis, pedibus ferrugineis.

Longit. 1 1/3 lin. Latit. 2/3 lin.

Stephens, Illustr. of British Entom. III. 50. Manual of British Coleopt. p. 192. 974.

NITIDULA BIMACULATA *Oliv.* Entom. II. 19. p. 6. 5. Tab. 2. fig. II. a. b.—*Gyllenhal*, Ins. suec. I. p. 244. 34.—*Schönherr*, Syn. Ins. II. p. 147. 58.

NITIDULA FLEXUOSA Paykull, Fauna suec. L. p. 354. 9.—
Herbst, Natur—Syst. V. p. 246. 21. Tab. 54. fig. 5.

DEAMESTES HEMIPTERUS Linné, Syst. Nat. I. II. p. 565. 50.

Ips IMMACULATA Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 134.

Habitat in California D. Blaschke; ex Europa cum rebus mercatoriis verosimile allatus.

175. *STRONGYLUS?* *TINCTUS*: Nigro-fuscus, opacus, creberrime punctulatus, griseo-pubescent, thorace convexo, elytris abbreviatis, macula discoidali obsoleta ferruginea, antennis pedibusque rufis. (*)

Longit. $2\frac{1}{3}$ lin. Latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

176. *NITIDULA CONVEXIUSCULA*: Ovata, convexa, diluta testacea, punctatissima, thorace antice emarginato, elytris apice singulatim rotundatis.

Longit. $1\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitkha DD. Kuprianoff et Blaschke.

N. DEPRESSA Illig. *Gyllenhal* minoribus individuis valde affinis, thorace autem paulo angustiore, antice profun-

(*) Der abgekürzten Flügeldecken wegen wäre diese Art wohl eigentlich zu *STRONGYLUS* nicht zu rechnen, allein da ich die Gattungen *BRACHYPEPLUS* und *CALOPTERUS* Erichson eben so wenig als *GILLEUS* Laporte kenne, wage ich nicht darüber zu entscheiden, sondern lasse lieber diese Art mit den ihr verwandten, nach Dejean, unter *STROMYLUS* bleiben.

dius emarginato et elytris apice rotundatis imprimis diversa.

177. **NITIDULA AMBIGUA**: Oblonga, subdepressa, rufo-ferruginea, punctatissima, tenue fulvo-pubescent, marginibus dilutioribus, thorace antice leviter emarginato, elytris apice singulatim rotundatis.

Longit. 1 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Media inter N. *PYGMÆAM* *Gyllenhal* et *OBLONGAM* *Herbst*, *Gyllenhal*, illa longior, in elytris magis parallela, hac paulo convexior, utrisque fortius punctulata.

178. **CRYPTOPHAGUS CALIFORNICUS**: Oblongo-ovatus, convexus, pallide testaceus, punctatus, pilis flavis pubescens, thorace anterius angustiore, medio transversim impresso, margine laterali acuto serrato.

Longit. 1 lin. Latit. $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. *Blaschke*.

179. **CRYPTOPHAGUS QUADRIDENTATUS**: Oblongo-ovatus, fusco-ferrugineus, pilis flavis pubescens, capite thoraceque profunde punctatis, thoracis lateribus utrinque acute bidentatis, postice crenulatis, elytris subtilius punctulatis.

Longit. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

C. *Lycoperdi* *Fabr.* affinis, sed angustior, antennis crassior-

ribus, thorace fortius punctato, lateribus acutius dentato, posterius crenulato distinctus.

Variat colore totius corporis pallidius ferrugineo.

180. DERMESTES VULPINUS Fabricius: Oblongus, niger, cinereo-subpubescens, subtus niveus, maculis marginalibus denudatis atris, thoracis lateribus densius cinereo-villosis.

Longit. 3, 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{3}{4}$ lin.

Fabr. Syst. El. I. p. 314. 12.—Oliv. Entom. II. 9. p. 8. 4. Tab. I. fig. 6.—Herbst Natur-Syst. IV. p. 194. 5. Tab. 40. fig. 5. c.—Schönherr Syn. Ins. II. p. 89. 21.—Gyllenhal, Ins. suec. I. p. 147. 2.—Stephens Illustr. of British Entom. III. 193. Manual of British Coleopt. p. 143. 1153.—Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 139.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke; per totum orbem terrarum obvius.

181. DERMESTES LUPINUS Eschscholtz: Oblongus, piceus, dense fusco-cinereo-tomentosus, subtus niveus, nigro-maculatus, thoracis lateribus densius cinereo-villosis.

Longit. 3 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} p. édit. 139.

Habitat in California D. Eschscholtz.

Statura et magnitudine præcedentis, sed subtilius punctulatus et pubescentia multo densiore fusco-cinerea imprimis diversus.

182. DERMESTES TALPINUS Eschscholtz: Oblongus, niger, supra cinereo-fulvoque marmoratus, scutello dense fulvo-pubescente, subtus ni-

veus, abdominis margine nigro-punctato, antennis nigris, articulo ultimo rufo-piceo.

Longit. 3 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

D. CATTÀ Panz. VAR. Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 139.

Habitat in California D. Eschscholtz; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. a D. Rouillier ad describendum benevole communicatus.

D. MURINO Linné minor, maculis cinereis elytrorum vix vel perparum undulatis et maculis fulvis immixtis sparsis diversus mihi videtur, cæterum forma eadem, unde ut varietas ejus facile putandus.

183. DERMESTES MARMORATUS Say: Oblongo-ovatus, niger, thorace pilis fulvis longius pubescente, maculis tribus minutis e pilis cinereis transversim positis, elytris maculis sparsis marmoratis et plaga magna humerali interius angulata e pilis albido-cinereis, subtus niveus, abdominis margine nigro-punctato, antennis rufo-piceis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Say, Oeuvres entom. trad. par Gory p. 159. 1.—Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 139.

Habitat in California D. Blaschke; in Missouri et Arkansas Amer. septentr. frequens. D. Say.

184. ANTHRENUS APICALIS: Niger, creberrime punctulatus, parce griseo-pubescent, elytrorum apice pedibusque rufescens, thorace lato, basi sinuato, medio valde producto.

Longit. 1 lin. Latit. 2 $\frac{1}{5}$ lin.

Habitat in California D. Blaschke.

185. SAPRINUS CALIFORNICUS Eschscholtz. Nigro-aeneus, ruguloso-punctatus, thorace antice foveolato, disco elytrorumque area antica communi laevibus, nitidis, striis quinque obliquis dimidiatis, suturali antice abbreviata, tibiis anticis sex dentatis.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{4}$ lin.

HISTER CALIFORNICUS Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 142.

Habitat in California D. Eschscholtz; e Museo Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole misit D. Rouillier.

186. SAPRINUS SULCIFRONS: Subquadratus, convexus, nigro-aeneus, fronte lineis duabus, posteriore adscendente acuminata, impressis, thorace basi punctulato, elytris creberrime ruguloso-punctatis, relictis areolis scutellari, humerali et apicali externa laevibus, striis quatuor obliquis inæqualibus, tibiis anticis tridentatis.

Longit. 2 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in California D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

187. CEUTOCERUS ADVENA Schüppel: Subquadratus, convexus, testaceus, nitidus, oculis nigris, thorace emarginato, basi bisinuato, lateribus deplanato, elytris subquadratis abdomen obtentibus, subtiliter striato-punctatis.

Longit. 4/2 lin. Latit. 1/3 lin.

Germar, Coleopt. Spec. nov. p. 85. 146.—Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 144.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; cum rebus mercatorii certe allatus.

PALPICORNIA.

*188. **ELOPHORUS AURICOLLIS** *Eschscholtz*: Capite thoraceque viridi-aureis, punctato-rugosis, thorace angulis acutis, quinque sulcato, sulcis laevibus, elytris griseis, interstitiis striarum alternis carinatis.

Longit. 1 1/2 lin.

Eschscholtz, Entomographien p. 43. 20.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

189. **CERCYON LIMBATUM**: Ovatum, convexum, nigrum, elytris tenue punctato-striatis, fusco-piceis, thoracis margine anguste, elytrorum late apiceque rufis.

VAR. b. elytris rufo-piceis dorso infuscatis.

VAR. c. elytris rufo-ferrugineis.

Longit. 1 1/3 lin. Latit. 5/6 lin.

Habitat in insula Sitkha DD. *Kuprianoff et Blaschke*.

C. **FLAVIPEDI** *Fabr. Erichs.* simile, sed brevius, fortius punctatum, elytrorum striis profundioribus et colore diversum.

190. **CERCYON ADUMBRATUM**: Oblongo-ovale, convexum, ferrugineum, elytris profunde punctato-striatis, dilutioribus, disco fusco-adumbratis.

VAR. b. obscurius, fusco-piceum, capite

thoraceque nigro-piceis, thoracis margine laterali testaceo, elytris disco latius infuscato.

Longit. 1 lin. Latit. 2/3 lin.

Habitat in insula Sithka DD. *Kuprianoff et Blaschke.*

Magnitudine C. ATOMARI *Fabr.* sed longius, minus globosum, elytra minus profunde punctato-striata, et interstitia plana.

LAMELLICORNIA.

*191. **APHODIUS ALEUTUS** *Eschscholtz*: Capite trituberculato, ater, thoracis dense punctati angulis, elytris pedibusque rufo-piceis, elytrorum striis punctatis, interstitiis seriebus punctorum subtilissimis.

Longit. 2²/₃ lin.

Eschscholtz, Entomographien p. 27. 11. — *Sturm*, Cat. p. 95.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

*192. **APHODIUS GUTTATUS** *Eschscholtz*: ater, capite quadrituberculato, elytris striis punctatis, maculis quadratis ferrugineis sparsis.

Longit. 2¹/₂ lin.

Eschscholtz, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 97. 1.— *Sturm*, Cat. p. 95.

Habitat in fimo bovino insulæ Unalaschkae frequens D. *Eschscholtz*.

193. **OXYOMUS CADAVERINUS** *Eschscholtz*: Oblongus, supra nigro-subtus rufo-piceus, clypeo pro-

funde emarginato, thorace anterius dilatato varioloso, elytris punctato-striatis.

Longit. 3 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

APHODIUS CADAVERINUS Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 162.

Habitat in California, *Trogium* instar in *cadaveribus exsiccatis* D. *Eschscholtz*.

194. *OXYOMUS CYLINDRICUS Eschscholtz*: Oblongus, nigro-piceus, clypeo subintegro, transverso, rugoso, thorace crebre punctato, lateribus crenulato, basi sulcato, elytris punctato-striatis, interstitiis planis, punctis minutis sub-seriatis.

Longit. 2 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 163.

PSANMODIUS CYLINDRICUS Eschscholtz, Entomogr. p. II. 3.

Habitat in insula Unalaschka locis elevatis sub lapidibus et in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

195. *SINODENDRON RUGOSUM*: Nigrum, thorace rugoso-varioloso antice truncato, unidentato, capitis cornu recurvo, parce piloso, elytris valde rugoso-intricatis.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Habitat in California D. *Tschernikh*; ab Excell. D. *Fischer de Waldheim* amicissime communicatum

Statura S. *CYLINDRICI*, sed undique valde rugosum et thorace unidentato omnino diversum.

HETEROMERA.**MELASOMATA**

- *196. *NYCTOPORIS CRISTATA* *Eschscholtz*: Nigra, capite cristato, thorace breviore varioloso, medio foveis duabus profundis, elytris cristis granulatis elevatis, humeris spinosis, basi abrupte declivibus.

Longit. 6 $\frac{1}{2}$, 7 lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas IV. p. 11. Tab. 18. fig. 4.—
Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 203.

Habitat in California, in littore meridionale Sinus St. Franzisco. D. *Eschscholtz*.

197. *NYCTOPORIS AEQUICOLLIS* *Eschscholtz*: Nigropicea, capite thoraceque quadrato variolo-punctatis; inæqualibus, elytris cristis granulatis subtilibus, humeris obtusis.

Longit. 6 $\frac{1}{2}$, 7 lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas IV. p. 12.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 203.

Habitat in California, in littore septentrionali Sinus St. Franzisco D. *Eschscholtz*.

198. *EULABIS BICARINATA* *Eschscholtz*: Oblonga, picea, thorace ruguloso-punctato, medio bicarinato, lateribus reflexis, subangulatis, elytris planatis costatis, interstitiis profunde striato-punctatis, pedibus rufis.

Longit. 3 $\frac{2}{3}$, 4 lin Latit. 4 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 15. t. Tab. 14. fig. 8.—
Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 203.

Habitat in California ad St. Franzisco locis e littore maris distantibus. DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

199. **EULABIS RUFIPES** *Eschscholtz*: Oblonga, picea, clypeo, antennis, thoracis lateribus pedibusque rufis, thorace profunde aciculato, æquali, lateribus rotundato, tenue marginato, elytris convexiusculis costatis, interstitiis profunde striato-punctatis.

Longit. 2, 4 lin. Latit. 1, 1½ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 15. 2.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 203.

Habitat in California ad St. Franzisco in vicinæ Missions, D. *Eschscholtz.*

*200. **EURYMETOPON RUFIPES** *Eschscholtz*: Semicylindricum, atrum, antennis ferrugineis, pedibus rufo-piceis, thorace basi apiceque truncato, lateribus rotundato, elytris posterius declivibus, striato-punctulatis, striis remotis basi extrorsum curvatis, interstitiis internis irregulariter, externis subseriatim punctulatis.

Longit. 3½ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. IV. p. 8. Tab. 18. fig. 1.

Habitat in California ad St. Franzisco sub lapidibus D. *Eschscholtz.*

*201. **EURYMETOPON OCHRACEUM** *Eschscholtz*: Oblongum, pallide ochraceum, capite paulo obscuriore, thorace subcylindrico, elytris medio

gibbosis posterius declivibus, subtiliter striato-punctatis, punctis basi et apice evanescentibus, interstitiis remote punctulatis, punctis subseriatis.

Longit. 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. IV. p. 8. Tab. 18. fig. 2.

Habitat in California ad St. Franzisco sub lapidibus D. *Eschscholtz*.

202. APOCRYPHA ANTHICOIDES *Eschscholtz*: Oblonga, convexa, rufo-ferruginea, elytrorum dorso nigro, undique subtiliter punctulata, capite elytrisque pilis rarioribus, thorace densioribus, griseo-pubescentibus, thorace suborbiculato, antice truncato, elytris ovalibus.

VAR. b. Fusca, antennis pedibusque rufo-piceis, clytris macula utrinque humerali rufo-ferruginea.

Longit. 1 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. $\frac{1}{2}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. IV. p. 13. Tab. 18. fig. 7.

Habitat in California ad ripas fluviorum D. *Eschscholtz*.

VAR. b. a D. *Blaschke* captam amicissime dedit Excell. D. *Lange*.

203. AMPHIDORA LITTORALIS *Eschscholtz*: Oblonga, nigro-fusca, pilis longis raris fuscis villosa, thorace transverso, convexo, latitudine elytrorum, lateribus rotundato, antice posticeque truncato, crebre punctato, elytris dense

striato-punctatis, interstitiis angustis, seriatim subtilissime punctulatis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. IV. p. 13. Tab. 18. fig. 6.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 931.

Habitat in California locis planis ad littora maris, inter herbas et sub lapidibus D. *Eschscholtz*.

204. *ELEODES SULCIPENNIS*: Elongata, nigra, opaca, capite profunde punctato, thorace subcordato, lateribus tenue reflexo-marginato, subtiliter punctulato, elytris oblongis, profunde sulcatis, postice perparum dilatatis, apice attenuatis, valde declivibus, femoribus anticis dentatis.

Longit. 14 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 5 lin.

Habitat in California Excell. D. *Wrangel*. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

205. *ELEODES GRANDICOLLIS*: Elongata, nigra, supra convexa nitida, capite profunde punctato, thorace lateribus valde rotundato-ampliato, reflexo-marginato, subtiliter punctulato, elytris oblongis, versus apicem modice angustatis, levissime rugulosis, obsolete striato-punctatis, femoribus anticis dentatis.

Longit. 14 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 4 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California DD. *Wrangel* et *Tschernikh*; specimen e Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop. ad describendum amicissime communicavit D. *Ménétriés*, alterum Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

206. ELEODES GIGANTEA: Elongata, nigra, supra nitida, thorace rotundato, supra convexo, basi apiceque latitudine æquali, femoribus muticis, elytris subtiliter granulato-punctatis, maris versus apicem sensim attenuatis, feminæ sesqui latioribus, pone medium dilatatis apice subito angustatis.

Mas: Longit. 15 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 4 $\frac{1}{3}$ lin.

Femina: Longit. 16 lin. Latit. 5 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California Excell. D. Wrangel. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Gigas in hoc genere, statura sequentis nonnihil similis, multo major et forma magis elongata.

207. ELEODES DENTIPES Eschscholtz : Elongata, nigra, supra nitida, capite thoraceque subtiliter granulato-punctatis, thorace lateribus rotundato, basi coarctato, angulis anticis acuminatis, elytris subtiliter striato-punctatis, punctis granuliferis, femoribus anticis dentatis.

Mas: angustior, elytris pone medium sensim attenuatis.

Longit. 8, 10 lin. Latit. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lin.

Femina: latior elytris medio paulo dilatatis, versus apicem declivibus, minus angustatis.

Longit. 10, 12 lin. Latit. 4 4 $\frac{1}{2}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 10. 1. Tab. 14. fig. 4.—

*Guérin, Magas. de Zoologie. IV. p. 31. pl. 117. fig. 1. —
Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 209.*

Habitat in California ad St. Franzisco, locis elevatis DD.
Eschscholtz, Blaschke et Tschernikh.

208. ELEODES QUADRICOLLIS Eschscholtz : Oblonga, nigra, capite fortius, thorace subtilius punctulato, subquadrato, antice paulo latiore, modice rotundato, femoribus muticis.

Mas: subcylindricus, elytris thoracis fere latitudine pone medium angustatis declivibus, dorso dense striato-punctatis punctis granuliferis.

Longit. 7 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Femina: lata, obovata, elytris thorace fere duplo latioribus, mox pone humeros dilatato-rotundatis, pone medium rotundato-angustatis, declivibus, dorso rugulosis, subtiliter granulatis, obsolete striato-punctatis.

Longit. 9 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 4 $\frac{2}{3}$ lin.

*Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 19. 9. Tab. 14. fig. 5.—
Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 209.*

Habitat in California ad St. Franzisco, locis elevatis frequens DD. *Eschscholtz.*

209. ELEODES MARGINATA Eschscholtz : Oblonga, nigra, thorace transverso, medio crebre punctato, lateribus rotundato, granulis nitidis scabro, marginibus reflexis, elytris ovatis pone medium angustatis, granulis reclinatis scabris,

femoribus anticis maris dentatis, feminæ muticis.

Longit. 7, 7 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{2}{3}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 10. 2.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 210.

Habitat in California ad St. Franzisco rarius DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

210. *ELEODES Fischeri*: Oblonga, nigra, thorace transverso, lato, medio punctato, lateribus valde rotundatis, tenue marginatis, granulis nitidis scabriusculis, elytris ovalibus, apice attenuatis, tuberculis piliferis subseriatis reclinatis dense asperatis, femoribus anticis muticis.

Longit. 9 lin. Latit. 4 lin.

Mannerheim, Revue Zoolog. par la Société Cuvierienne 1840. p. 137.

Habitat in California ad Ross. D. D.^r *Fischer.*

Præcedenti affinis, thorace breviore, latiore, minus crebre punctato elytrisque longioribus magis rugosis et scabris ut et femoribus anticis muticis diversa.

211. *ELEODES CLAVICORNIS Eschscholtz*: Ovata, nigra, thorace lateribus rotundato tenue marginato, ibique et in medio punctato, area utrinque lævi, postice truncato angulis minutis rectis, elytris posterius sensim attenuatis, dorso nonnihil deplanatis; foveolis subquadratis seriatim impressis, lateribus granulatis et pilo-

sis, antennis articulis tribus ultimis præcedentibus duplo latoribus.

Longit. 5¹/₂ lin. Latit. 2²/₃ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas III. p. 11. 3.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 210.

Habitat in California, locis planis ad littora maris D. *Eschscholtz*.

Specimina e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad examinandum benevole misit D. *Rouillier*.

212. ELEODES REFLEXICOLLIS: Ovata, nigra, thorace brevi, lato, subdepresso, basi subito-angustato, lateribus valde rotundatis, reflexo-marginatis, dorso crebre punctato, areis duabus lævigatis, elytris convexis, punctatis, punctis tuberculis minutis nitidis instructis, humeris obtusis, anternis extrorsum vix crasioribus.

Longit. 6 lin. Latit. 3 lin.

Habitat in California ad Ross. D. D.^r *Fischer*.

Sequenti proxima, ejusdem magnitudine et statura, sed thorax lator, profundius punctatus, lateribus magis rotundatus, margine altius reflexo basique magis abrupte angustatus et elytra crebrius punctato-tuberculata, minime ut in illa costulis elevatis substriata.

213. ELEODES PLANATA Eschscholtz: Oblongo-ovata, nigra, thorace transverso, basi coarctato, lateribus valde rotundatis, tenue reflexo-marginatis, dorso dense punctato, areolis duabus lævigatis vix distinctis, elytris dorso depresso, seriatim soveolato punctatis, obsolete subco-

statis , humeris obtusis , antennis subfiliformibus.

Longit. 6, 7 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2 $\frac{3}{4}$, 3 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Eschscholtz , Zool. Atlas III. p. 12. 6.—Dejean , Cat. 3^{me} édit. p. 240.

Habitat in California ad Ross frequens D. Eschscholtz.

214. ELEODES PARVICOLLIS Eschscholtz : Ovata , nigra , thorace brevi transverso , lateribus rotundato , tenue reflexo-marginato , basi subito coarctato ibique latitudine apicis angustiore , dorso profunde punctato , lateribus dense granulifero , elytris dorso punctis majoribus subseriatis leviter impressis , lateribus granulatis , humeris subrectis margine nonnihil reflexo , antennis filiformibus.

Longit. 5 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3 lin.

Eschscholtz , Zool. Atlas. III. p. 11. 4.

Habitat in California ad St. Franzisco rarius D. Eschscholtz et Blaschke.

215. ELEODES PRODUCTA: Oblonga , nigra , thorace lateribus rotundato , tenue marginato , basi angustato , ibique et apice latitudine æquali , dorso crebre punctato , lateribus dense granulifero , elytris oblongo-ovatis , pone medium attenuatis , dorso leviter punctatis , punctis granuliferis , versus latera asperatis , humeris rotundatis antrorsum nonnihil productis , antennis extrorsum paulo incrassatis.

Longit. 6 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. *Blaschke*.

Præcedenti affinis, sed multo longior et angustior, thorace longiore et latiore, elytrisque undique asperatis, subrugosis imprimis diversa.

216. ELEODES SCABROSA *Eschscholtz*: Oblongo-ovata, nigra, thorace transverso punctatissimo, basi apiceque latitudine æquali, lateribus valde rotundato, granulis scabro, elytris ovatis dorso rude punctatis, subrugosis, lateribus granulatis asperis, humeris subrectis, antennis articulis tribus ultimis latioribus.

Mas: elytris latitudine thoracis.

Femina: elytris thorace fere sesqui latioribus.

Longit. 5, 5 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2 $\frac{1}{4}$, 3 lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 11. 5.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 210.

Habitat in California ad St. Franzisco frequens DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh*.

217. ELEODES CORDATA *Eschscholtz*: Ovata, nigra, thorace transverso, sub-convexo, lateribus valde ampliato-rotundatis, basi sinuatim coarctato, angulis sub prominulis, undique tenue marginato, fortiter et crebre rugoso-punctato, elytris apice declivibus, dense punctato-rugosis et granulatis, lateribus tuberculis reclinatis valde exasperatis, humeris prominulis subrotundatis, antennis extrorsum leviter incrassatis.

Mas: antennis crassioribus, pedibus fortioribus, longioribus.

Femina: antennis et pedibus brevioribus, tenuioribus.

Longit. 5, 7 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 12. 7. Tab. 14. fig. 6.—
Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 110.

Habitat in California ad St. Franzisco, locis elevatis sat frequens DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh*; etiam ad Ross a D. *Fischer* lecta.

218. **ELEODES INTRICATA**: Nigra, thorace transverso, lateribus valde rotundato ibique tenue marginato, basi subito coarctato, dorso profunde punctato, elytris convexis apice declivibus, tuberculis lævigatis minutis densissimis rugoso-intricatis, humeris subrotundatis, antennis extrorsum parum crassioribus.

Mas: oblongo-ovata, elytris oblongis, thoracis fere latitudine antennis pedibusque longioribus et fortioribus.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

Femina: ovata, mare sesqui latior, elytris thorace latioribus, antennis pedibusque tenuioribus.

Longit. 5 lin. Latit. 3 lin.

Habitat in California ad Ross. D. D.^r *Fischer*.

Sequenti affinis, thorace latiore, basi subito angustato, punctato, haud rugoso, elytris punctis asperatis multa minoribus, densioribus omnino distincta.

219. ELEODES TUBERCULATA *Eschscholtz* : Oblongo-ovata , nigra , thorace subconvexo , cordato , lateribus rotundato , tenue reflexo-marginato , basi coarctato , angulis rectis , supra rude et profunde rugoso-punctato , elytris convexis , tuberculis levigatis reclinatis densis rugoso-asperatis , humeris rotundatis , antennarum articulis 5—8 suborbiculatis , tribus ultimis paullo crassioribus.

Longit. 5, 5 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 2 $\frac{1}{4}$, 2 $\frac{2}{3}$ lin.

Eschscholtz , Zool. Atlas. III. p. 12. 8.—*Dejean* , Cat. 3^{me} édit. p. 210.

Habitat in California ad Cabo de los Reyes D. *Eschscholtz*; a DD. *Blaschke* et *Tschernikh* etiam allata.

220. ELEODES PIMELIOIDES : Brevis , nigra , opaca , capite, thoraceque lateribus rotundato crebre rugoso-punctatis , elytris subquadratis ; apice valde declivibus , dorso deplanatis , crebre granulatis , granulis reclinatis asperis piliferis.

Longit. 6 lin. Latit. 3 lin.

Habitat in California Excell. D. *Wrangel*. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Magnitudo E. *PARVICOLLIS* , sed statura brevi lata , elytris subquadratis a ceteris congeneribus diversa.

221. CONIONTIS VIATICA *Eschscholtz* : Oblonga , semicylindrica , convexa , nigra , opaca , thorace apice emarginato , angulis deflexis , lateribus tenue marginato , basi subtruncato , angulis productis acutis , dorso creberrime subtilissime

punctulato, elytris thorace paulo angustioribus, tenue marginatis, apice rotundatis, subtilissime parcius punctulatis.

Mas: differt antennis, ore et pedibus bruno-piceis.

Longit. 6, 7 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 7 1. Tab. 14. fig. 3.—

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 211.

Habitat in California ad Sinum St. Franzisco, in campis et viis argillaceis a D. *Eschscholtz* capta.

222. CONIONTIS ESCHSCHOLTZII: Oblonga, semicylindrica, convexa, nigra subnitida, thorace apice emarginato, angulis deflexis, antice et lateribus tenue marginato, basi subtruncato, dorso subtilissime minus crebre punctulato, elytris thorace paulo angustioribus, tenue marginatis, dorso, praesertim posterius, valde punctato-rugosis, pilis albis brevissimis obsitis.

Mas: minor, brevior, minus convexus, thorace latiore angulis posticis subrectis, lateribus parum sinuato, tibiis tarsisque anticis nonnihil dilatatis.

Femina: major, valde convexa, thoracis lateribus posterius sinuatis, angulis posticis productis rotundatis, tibiis tarsisque anticis mediocribus.

Longit. 6, 7 lin. Latit. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lin.

Mannerheim, Revue Zoolog. par la Soc. Cuvier. 1840.
p. 138.

Habitat in California ad Ross. D. D.^r *Fischer*; specimen a D. *Tschernikh* missum etiam communicavit Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

223. CONONTIS NEMORALIS *Eschscholtz*: Oblonga, convexa, nigra, subnitida, thorace breviore transverso, apice emarginato angulis vix deflexis, lateribus tenue marginato, basi subtruncato angulis productis acutis, dorso subtiliter crebre punctulato, elytris thoracis latitudine, tenue marginatis, versus apicem rotundato-angustatis, dorso profunde rugoso-punctatis, pilis brevissimis albidis obsitis.

Mas: elytris mox pone humeros versus apicem sensim angustatis, tibiis tarsisque anticas nonnihil dilatatis.

Femina: elytris pone medium versus apicem angustatis magis declivibus, tibiis tarsisque anticas mediocribus.

Variat antennis, pedibus et elytrorum apice brunneo-piceis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$, 6 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$, 3 lin.

Eschscholtz, Zoolog. Atlas III. p. 8. ♀.

C. *CAMPESTRIS*? *Dejean*, Cat. p. 212.

Habitat in California ad St. Franzisco locis arenosis inter arbusta D. *Eschscholtz*; etiam ad Ross a D. *Fischer* capta.

224. BLAPSTINUS PULVERULENTUS *Eschscholtz*: Oblongus, ater, antennis, pedibusque piceis, creberrime punctatus, thoracis angulis posticis

subrectis, elytris punctato-striatis, striis versus suturam profundius impressis.

Longit. 2, 3 lin. Latit. 8/9, 1 1/3 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 213.

Habitat in California DD. *Eschscholtz, Blaschke et Tschernikh.*

TAXICORNES.

225. COELUS CILIATUS Eschscholtz : Rotundato-ovatus, convexus, brunneo-piceus, antennis brevissimis pedibusque rufo-piceis, thorace transverso, apice late emarginato, basi truncato, lateribus rotundato, ibique et apice tenue marginato, dorso subtiliter punctulato, elytris granulis scabris, corporis margine pedibusque pilis longis ferrugineis ciliatis.

Longit. 3, 3 1/2 lin. Latit. 1 2/3, 2 lin.

Eschscholtz, Zool. Atlas. III. p. 5. Tab. 14. fig. 1.—

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 215.

Habitat in California ad St. Franzisco, locis arenosis sub stercoratis exsiccatis D. *Eschscholtz.*

226. PHALERIA PICTA Eschscholtz : Brevis, subhemisphærica, punctulata, pallide rufo-ferruginea, thoracis basi utrinque bistriato, elytris punctato-striatis, in utroque macula media dentata nigro-fusca.

Longit. 1 1/2 lin. Latit. 1 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 216.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz.* Mus. Univ. Imp.
Mosqu.

227. STENE FERRUCINEA *Fabricius*: Linearis-elongata, depressa, rufo-ferruginea, thorace transverse quadrato, tenue marginato, confertissime subtiliterque punctulato, elytris tenue punctato-striatis, intersticiis punctulatis, antennarum articulis tribus ultimis majoribus perfoliatis.

Longit. 1 $\frac{1}{3}$, 2 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Stephens, Illustr. of British Entom. V. 9. Manual of British Coleopt. p. 322. 2531.

MARGUS FERRUGINEUS *Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 222.

TROGOSITA FERRUGINEA *Fabr.* Syst. El. I. p. 155. 23. Ent. Syst., I. p. 116. 7.

TENEBRIUS FERRUGINEUS *Fabr.* Mant. I 212. 17. Spec. Ins. I. 324. 12. — Oliv. Ent. III. 57. p. 18. 25. Tab. 2. fig. 24. a. b.

COLYDIUM CASTANEUM *Herbst*, Natur-Syst. VII. p. 282. 3. Tab. 112. fig. 3. 4.

TENEBRIUS TESTACEUS *Schönherr* Syn. Ins. I. p. 153. 46.

PHALERIA CASTANEA *Gyllenhal*, Ins. suec. II. p. 588, 2.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; per totum orbem terrarum obvia, animalia in Musæis asservata, panem aliaque cibaria destruens.

TENEBRIONIDES.**II. CENTRIOPTERA.**

Antennæ moniliformes, articulis 1 et 2 brevissimis, 3 elongato, subcylindrico, 4–6 hoc triplo brevioribus, subquadratis, 7–9 lenticularibus rotundatis compressis, 10 brevi transversa subcyathiformi, ultimo parvo rotundato, apice acuminato.

Labrum exsertum, apice rotundatum, ciliatum.

Mandibulæ corneæ, validæ, intus unidentatæ, apice incurvo emarginato.

Maxillæ coriaceæ, extus membranaceæ, fasciculato-ciliatæ, muticæ.

Mentum corneum, tricarinatum, apice emarginatum.

Labium exsertum, profunde emarginatum, ciliatum.

Palpi omnes articulo ultimo præcedente parum longiore subobconico, apice truncato.

Corpus oblongum, apterum, statura fere CARABI.

Caput clypeo rotundato, jugulo crebre ruguloso, spatio medio trianguli rugis majoribus transversis instructo.

Pedes validi, femoribus versus apicem non-nihil incrassatis, interne profunde excavatis,

tibiis pilis brevibus rigidis exasperatis , apice bispinis , quatuor anterioribus perparum incurvis , posticis retrorsum nonnihil curvatis , tarsis articulis compressis , convexis , 1—4 utrinque spinula armatis , unguiculis validis incurvis , muticis.

Nomen e *xéνριον* spina et *πτερόν* ala derivatum.

228. CENTRIOPTERA CARABOIDES: Nigra, nitida, capite profunde parce punctato , thorace elytris latiore , subcordato , anguste reflexo-marginato , subtilissime sparsim punctulato , elytris profunde striato-punctatis , lateribus posterius trifariam spinulosis.

Longit. 13 lin. Latit. 4 lin.

Habitat in California Excell. D. Wrangel. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

III. COELOCNEMIS.

Antennæ extrorsum leviter incrassatæ , articulis 1 et 2 breviusculis , 8 elongato subcylindrico , 4—7 hoc fere duplo brevioribus extrorsum paulo incrassatis , 8 et 9 lenticularibus compressis , latere interiore nonnihil productis , subemarginatis , denticulo minuto subarmatis , 10 et 11 lenticularibus compressis rotundatis , muticis , ultimo perparum majore.

**Labrum coriaceum, exsertum, transversum,
apice subemarginatum.**

Mandibulæ validæ, corneæ, apice emarginatæ.

Maxillæ coriaceæ, apice bifidæ.

Mentum corneum, leviter bicarinatum, apice rotundatum.

Labium subexsertum, integrum, margine ciliato.

Palpi maxillares, articulo ultimo, magno, brevi, lato, oblique truncato, labiales articulo ultimo majore obconico, apice truncato.

Corpus subelongatum, apterum. Caput supra planum, clypeo truncato, sub-emarginato, lateribus ante oculos ampliato, ibique nonnihil elevato, lobo utrinque oculis superposito, jugulo transversim crebre rugoso.

Pedes elongati, femoribus versus apicem nonnihil incrassatis, interne profunde excavatis, tibiis præsertim anterioribus incurvis, omnibus spinulis duabus brevissimis terminatis, latere interno extrorsum profunde canaliculatis, in quatuor posterioribus canalicula lateribus dense spongioso-setosa, tarsis articulis subcompressis, subtus dense spongiosis, articulo ultimo longiore, unguiculis incurvis muticis.

Nomen e *κοῖλος cavus* et *κνήμη tibia* compositum.

229. COELOCNEMIS CALIFORNICA: Nigra, subnitida, crebre punctulata, thorace cordato, undique tenue marginato, elytris oblongis, tenue striato-punctatis, in singulo seriebus novem e punctis oblongis impressis.

Longit. 7 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Blaschke; a D. Obert ad descriendum amice communicata.

230. COELOCNEMIS DILATICOLLIS: Convexa, nigra, subnitida, subtiliter punctulata thorace subcordato, lateribus valde rotundato-dilatato, tenue marginato, elytris oblongo-ovatis, pone medium dilatatis, apice declivibus angustatis, in singulo seriebus acto striato-punctatis.

Longit. 10 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 4 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Eschscholtz; e Mus. Imp. Univ. Mosqu. ad descriendum benevole misit Rouillier.

IV. CIBDELIS (*).

Antennæ extrorsum leviter incrassatæ, articulis 1 et 2 breviusculis, 3 elongato, subcylindrico, 4—7 sensim brevioribus extororum

(*) Diese drei neuen Gattungen machen, der verwachsenen Flügeldecken wegen, einen Übergang zu der Familie der Melasomen, allein die Form des Kopfes mit den Fresswerkzeugen und der Beine weisen ihnen wieder einen Platz unter den Tenebrioniden in der Nähe von *Upis* an.

nonnihil incrassatis, 8—10 lenticularibus compressis, apice leviter emarginatis, ultimo praecedente plus quam duplo longiore, oblique ovato, apice subacuminato.

Labrum subexsertum, transversum, apice subtruncatum.

Mandibulæ validæ, corneæ, apice emarginatæ.

Mentum corneum, rugosum, medio subcarnatum, apice rotundatum, basi constrictum.

Maxillæ coriaceæ, apice obtusæ, longe ciliatæ.

Labium exsertum, apice integrum, subrotundatum, longe ciliatum paraglossis liciniatis.

Palpi omnes articulo ultimo magno brevilato, subsecuriformi.

Corpus oblongum, apterum, elytris connatis. Caput supra planum, clypeo lato, apice leviter rotundato, lateribus ante oculos nonnihil elevato, jugulo leviter transversim stri-guloso.

Pedes mediocres, femoribus versus apicem haud crassioribus, tibiis anticis vix incurvis, omnibus spinulis duabus brevissimis terminatis, apice ipso dense spongioso-setosis, tarsis articulis subcompressis, subtus dense spongiosis, articulo ultimo elongato, unguiculis incurvis muticis.

Nomen αἱβδηλι; *spurius*.

231. CIBDELIS BLASCHKEI: Nigra, thorace convexo, subquadrato, punctato-ruguloso, lateribus integro, modice rotundato, undique tenue marginato, elytris pone medium versus apicem angustato-rotundatis, humeris antrorum productis, dorso subtiliter striato-punctatis, intersticiis tubercululis nitidis seriatim dispositis.

Longit. 6 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3 lin.

Habitat in California DD. Blaschke et Tschernikh.

232. NYCTOBATES SERRATA Eschscholtz: Elongata, nigra, opaca, crebre punctulata, thorace cordato, subdepresso, lateribus inæqualiter serrato, elytris posterius dilatatis, subtiliter seriatim punctatis, humeris rotundatis, tibiis omnibus rectis.

Longit. 10 lin. Latit. 4 lin.

IPOTHEINUS SERRATUS Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 225.

UPIS SERRATA Eschscholtz in litteris.

Habitat in California ad St Francisco D. Eschscholtz.

233. NYCTOBATES INERMIS Eschscholtz: Elongata, nigra, subnitida, capite thoraceque profunde punctatis, hoc subquadrato, anterius vix angustato, undique tenue marginato, elytris subtiliter punctulatis, striato-punctatis, posterius nonnihil dilatatis, humeris oblique subrotundatis, tibiis leviter incurvis.

Longit. 10 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 4 lin.

UPIS INERMIS Eschscholtz in litteris.

*Iratus N. SAPEROIDES VAR. *Dejean**, Cat. 3^{me} édit. p. 225

Habitat in California ad St. Franzisco. D. *Eschscholtz*.

N. SAPEROIDES Bosc valde affinis, sed diversa mihi videtur, capite thoraceque multo fortius punctatis, thorace latiore, anterius vix angustato, et elytris longioribus, parcus punctulatis.

234. PYTHO? SAHLBERGII: Elongatus, valde convexus, rufo-ferrugineus, capite thoraceque obscurioribus profunde punctatis; illo fronte transversim valde impressa, hoc brevi, subcordato, immarginato, basi apicemque truncato, lateribus anterius rotundato, elytris foveolis oblongis profundis crebre punctatis, apice laevigatis (*).

Femina major, in elytris multo latior et pedibus brevioribus tenuioribus diversa.

Mas: *Longit. 3 $\frac{2}{3}$, 4 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$, 2 $\frac{1}{2}$ lin.*

(*) Dieser Käfer ist wahrscheinlich der, als auf Sitka vorkommend, von *Eschscholtz* (Reise um die Welt in den Jahren 1823—26 von *Kotzebue*, 2^{ter} Th. Uebersicht der zoologischen Ausbeute von Fr. *Eschscholtz*, p. 26.) erwähnte *Bonos*. Seine stark gewölbte Gestalt macht ihn freilich einem *Bonos* täuschend ähnlich; allein bei genauerer Untersuchung findet man, dass die Fühlhörner und Fusswerkzeuge mit denen von *Pyrso* ganz übereinstimmen, nur ausgenommen dass das letzte Glied der Antennen nicht so scharf zugespitzt ist. Die convexe Form wäre wohl nicht eine wohlgründete Anleitung ihn von der letztgenannten Gattung zu trennen.

Femina: Longit. 4 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in insula Sitka DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et
Tschernikoff

HELOPIL.

V. EUCYPHUS.

Antennæ monitiformes, articulo primo longiore curvato, 2 et 3 paulo brevioribus æqualibus obconicis, 4—10 præcedentibus nonnihil brevioribus, inter se æqualibus subquadratis, compressis, ultimo paulo majore ovato apice rotundato.

Labrum exsertum, transversum, antice subemarginatum, ibique margine triangulariter incrassatum.

Palpi maxillares labialibus multo longiores, articulo ultimo magno securiformi; eodem labialium etiam majoris magnitudinis, triangulari, apice truncato.

Mandibulæ trigonæ, depressæ.

Mentum parvum, apice emarginatum.

Corpus globosum, forma fere Hybosori vel ACIALEÆ, antice posticeque inflexum. Caput sub thorace retractum, illoque angustius, rotundatum, oculis magnis oblongis. Thorax transversus, anterius angustatus. Scutellum conspicuum. Elytra valde convexa, gibba. Pedes breves, tibiis omnibus latiusculis, fulvo-

hirsutis, anticis latere interiore excavatis, medio in angulum dilatatis, quatuor posterioribus extrosum profunde excavatis, extus in medio rotundato-dilatatis, ibique crebre spinulosis, tarsis breviusculis, subtus hirsutis, articulo antepenultimo subtus membrana oblonga instructo, unguiculis incurvis integris.

Nomen ab *eu* valde et *xuqōc gibbus* derivatur.

235. EUCYRPHUS HYBOSOROFERUS: Supra piceo-aeneus, glaber, nitidus, creberrime punctatus, subtus brunneo-piceus, antennis tarsisque rufo-ferrugineis.

Longit. 3 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 2 lin.

Habitat in California D. Blaschke.

236. HELOPS CALIFORNICUS Eschscholtz: Oblongus, fusco-aeneus, capite thoraceque subquadrato creberrime punctatis, elytris striatis, in striis et interstitiis subtiliter punctulatis, antennis pedibusque piceis.

Mas: antennis capite cum thorace longiores, extrosum crassiores.

Femina: antennis capite cum thorace breviores, filiformes.

Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit, p. 331.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Tschernikh.

TRACHELIDES.

237. ANASPIS SERICEA. Elongata, brunneo-picea, supra holosericeo-pubescentia, antennarum basi, ore elytris pedibusque ferrugineo-testaceis, fulvo-sericeis.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$ lin.

Var. b. thoracis margine antico, angulisque posticis ferrugineis.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke. Var. b. in Museo Acad. Imp. Petropol. asservatur.

238. ANASPIS PALLESCENS Eschscholtz: Elongata, fulvo-ferruginea, subtilissime griseo-pubescentia, antennis extrorsum, oculis abdomineque nigro-fuscis.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{3}{4}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 242.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Præcedente paullo latior, præsertim in thorace, colore, pubescens multo minus condensata, antennisque extrorsum crassioribus distincta.

VESICANTIA.

239. EPICAUTA PUNCTICOLLIS: Atra, pubescens, capite thoraceque canaliculato, postice impresso, crebre et profunde punctatis, elytris creberime rugoso-punctatis.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California DD. *Blaschke* et *Tschernikh*; specimina descripta benevole communicaverunt DD. *Fischer de Waldheim* et *Obert*. E. ATROTAZ *Fabr.* non nihil similis, sed multo profundius punctata.

TETRAMERA.

CURCULIONIDES.

240. APION CUPRESCENS: Oblongum, fusco-æneum, griseo-pubescent, rostro longitudine thoracis cum capite, arcuato, thorace anterius angustato, profunde punctato, postice canaliculato, elytris oblongo-ovatis, punctato sulcatis, punctis in sulcis satis approximatis.

Longit. cum rostro 1½ lin. Latit. ¼ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; specimen a D. *Obert* amicissime donatum.

241. APION TROGLODYTES Schönherr: Breve, nigrum, longius griseo-pubescent, rostro capite cum thorace breviore, parum arcuato, thorace subcylindrico, antrorsum vix angustato, profunde et concinne foveolato-punctato, elytris ovatis, gibbis, sulcatis, sulcis remote punctatis.

Longit. cum rostro ¾ lin. Latit. ¾ lin.

Habitat in California D. *Blaschke*.

Ad Stirpis 2^{dae}, Manipuli 1^{mi} Centuriam 1^{ma} operis Cel Schönherr pertinent ambæ.

***242. SITONES CALIFORNICUS Eschscholtz:** Oblongus, niger fuscocinereo-tomentosus et setulosus,

fronte canaliculata; rostro subcostato; thorace evidenter punctato, griseo-trivittato, antennis tibiisque anticus fusco-ferrugineis, oculis subdepressis.

Schönherr, Genera et Spec. Cucul., VI. p. 267. 28.

SITONIA CALIFORNICUS Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 278.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

Magnitudo 8. 8-PUNCTATI (op. *Schönh.*), paulo tamen latior; S. ORDINARIO (ejus. op.) habitu coloreque valde propinquus, dimidio autem minor; fronte haud retusa, tamen quoque setuloso præcipue distinctus.

243. SITONIS SENICULUS: Oblongus, subcylindricus, niger, cinereo-tomentosus et setosus, fronte canaliculata, rostro excavato, thorace profunde rugoso-punctato, lateribus vix rotundato, elytris profunde punctato-striatis, antennarum basi tibiisque ferrugineis.

Longit. 1 2/3 lin. Latit. 1/3 lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

244. ALOPHUS ALTERNATUS Say: Oblongo-ovatus, niger, fusco-cupreo-squamatus, thorace crebre ruguloso, dorso carinula parum elevata, abbreviata instructo, utrinque obsolete albido-lineato, elytris subtiliter punctato-striatis, nigro et pallido tessellatis, macula postica subargentea ornatis, intersticiis confertim granulatis.

Schönherr, Gener. et Spec. Cucul. II. p. 286. 2.

CURCULIO ALTERNATUS Say in litteris.

VAR. b. elytris etiam macula laterali ante medium obliqua niveo-squamosa.

Longit. cum rostro 6 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat **VAR.** b. in insula Sitkha D. Blaschke. **VAR.** a. Amer. septentr. incola.

245. LIXUS PORICOLLIS Eschscholtz: Oblongus, niger, pube grisea dense obtectus, rostro breviore recto, carinato, thorace antice parum angustiore, dorso punctis nigris remotis variolosis impresso, basi foveolato, longitudinaliter anguste carinato, utrinque nigro-lineato, elytris subtiliter punctato-striatis, apice singulatim subacuminatis, fusco-trilineatis, femoribus muticis.

Longit. cum rostro 4, 5 lin. Latit. 4 $\frac{1}{2}$, 5 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit p. 295.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Ad Stirpis 2⁴^{me} Manipulum 1^{me} Operis Cel. *Schönherr* adnumerandus.

246. LIXUS MODESTUS Dejean: Elongatus, niger, griseo-pubescent, rostro crassiusculo, modice arcuato, thorace conico breviore, dorso longitudinaliter excavato, elytris striato-punctatis, dense cinereo-squamulosis, maculis minutis albescentibus remote adspersis, apice singulatim subacuminatis, femoribus muticis

Longit. cum rostro 5 lin. Latit. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 296.

LIXUS ADSPERSUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*. Mus. Imp. Univ.

Mosqu. Stirpis 2^{da} Manipulo 1^{mo} Operis Cel. *Schönherr* collocandus.

247. HEILIPUS SCROBICULATUS: Oblongus, ater, opacus, squalidus, undique inæqualis, scrobiculatus et verrucosus, antennis tarsisque piceis, fronte foveola impressa, rostro parum arcuato, thorace latitudine longiore, lateribus rotundatis, crenatis, dorso carinato, elytris granulis minutis adspersis, verrucis majoribus hinc inde immixtis.

Longit. sine rostro 5 lin. Latit. 2 lin.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp.

Mosqu. ad describendum benebole communicavit D. *Rouillier*. In Stirpe 1^{ma} Operis *Schönherrii* inserendus.

248. ANTHONOMUS BRUNNIPENNIS: Nigro-piceus, tenuiter pubescens, thorace subconico, profunde rugoso-punctato, scutello cinereo-squamuloso, elytris punctato-striatis, brunneis, antennarum basi, tibiis taraisqne ferrugineis, femoribus anticis obsolete dentatis.

Longit. sine rostro 2 lin. Latit. 1 lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

***249. TRACHODES PTRNOIDES Eschscholtz:** Femoribus muticis, piceo-niger, thorace oblongo, cari-

nato, elytris punctato striatis, hispidis, griseo-irroratis.

Germar, Col. Spec. nov. p. 327. 466.—*Schönherr*, Gen. et Spec. Curcul. III. p. 513. 1.

Pissodes PTINICOLLIS Sturm. Cat. p. 184.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

Magnitudo fere *ERIKAINI ACRIDULU* op. *Schönherr*.

250. *CENTRINUS CONFUSUS Say*: Oblongus, ater, sub-nitidus, rostro longitudine thoracis, tenui, valde arcuato, thorace antice angustato, confertim subtiliter punctato, dorso linea angusta, laevi, notato, elytris striatis, striis in fundo punctulatis, interstitiis angustis, crebre striato-punctulatis.

Mas: thorace subtus spinis duabus, parallelis, arcuatis armato.

Femina: thorace subtus mutico.

Schönherr, Gen. et Spec. Curcul. III. p. 740. 6.

RHYNCHENUS CONFUSUS Say in litteris.

BARIS SULCIPENNIS Eschscholtz, *Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p 312.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; in Florida a D. *Say* lectus.

Habitus fere *BARIDI* et *B. PICINO* op. *Schönherr*, nonnihil minor, praesertim angustior.

251. *SPHENOPHORUS DISCOLOR Eschscholtz*: Oblongo-ovatus, niger, glaber, rostro crebre punctato, basi tumido, apice compresso, thorace oblongo disperse punctato, tenue canaliculato, elytris punctato-striatis, striis profunde exa-

ratis , interstitiis remote punctulatis , thoracis lateribus , elytrorum apice , corpore subtus pedibusque extus albidis.

Longit. sine rostro 7 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 3 lin.

CALANDRA DISCOLOR, Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 329.

Habitat in California D. Eschscholtz; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. communicavit D. Rouillier.

252. SPHENOPHORUS SUBCARINATUS: Elongatus, niger, glaber, rostro canaliculato , basi tumido , thorace varioloso-punctato, plagis tribus longitudinalibus elevationibus, elytris opacis, anguste striatis et in striis punctis minutis remotis impressis , interstitiis impunctatis , suturali laevissimo nitido.

Longit. sine rostro 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Eschscholtz, Mus. Univ. Imp. Mosqu.

S. CONFUSO Dejean, Schönh. affinis, sed longior, angustior.

253. SITOPHILUS ORYZÆ Linné: Oblongus , nigropiceus, opacus, rostro mediocri, striatim punctato , thorace depresso , elytris sub-breviore, confertissime profundius punctato ; elytris confertim crenato-striatis , maculis quatuor rufescentibus notatis.

Mas: rostro crassiore , evidentius carinato , profunde striatim punctato.

Femina: rostro tenuiore , basi tantum cari-

nato, subtilissime striatum punctato, extor-
sum levavi nitido,

*Longit. cum rostro 1 $\frac{1}{3}$, 1 $\frac{1}{2}$ lin. Latit.
1 $\frac{1}{3}$, 1 $\frac{1}{2}$ lin.*

Schönh. Gen. et Spec. Curcul. IV. p. 981. 13.

CUCULIO ORYZÆ LINNÆ. Synt. nat. I. IV. p. 1755, 198.

CALANDRA ORYZÆ FABR. Syst. El. II. p. 438. 4.

Oliv. Entom. V. 83. p. 97, 34.—CUCULIO Tab. 7. fig. 81. a. b.

Stephens Illustr. of British Entom. IV. p. 9. 3.

Manual of British Coleopt. p. 216. 1671.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke; in omnibus terræ
regionibus inter grana Oryzæ obvius.

254. COSSONUS PINIPHILUS Eschscholtz: Nigro-piceus,
glaber, supra parum convexus; rostro bre-
viori, crassiori, apice modice dilatato, basi
obsolete canaliculato, minus profunde pun-
ctato; thorace oblongo, remote sat profunde
punctato, anterius angustato, basi leviter bisi-
nuato et obsolete bis impresso, in impressione
rude sat crebre punctato; elytris planiusculis
profunde punctato-striatis.

Longit. cum rostro 3 lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$ lin.

*Schönherr, Gen. et Spec. Curcul. IV. p. 1002. 8.—Dejean,
Cat. 3^{me} edit. p. 330.*

Habitat in California D. Eschscholtz.

255. RHYNCOLUS BRUNNEUS Eschscholtz. Subcylin-
dricus, rufo-piceus, glaber, antennis mediocri-
bus, rostro longitudine capitis, crebre pun-

ctato, canaliculato, thorace oblongo, anterius paulo angustato, profunde punctato, elytris profunde punctato-striatis.

Longit. 2 lin. Latit. 1/2 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 330.

Habitat in insula Sitkha DD. Eschscholtz, Kuprianoff et Tschernikh.

XYLOPHAGI.

256. HYLURGUS SERICEUS *Eschscholtz*. Brevis, rufo-piceus, griseo-sericeus, thorace carinato, elytris squamulis, brunneis cinereisque variegatis, antennis pedibusque rufis.

Longit. 1 1/3, 1 1/2 lin. Latit. 1/2, 3/5 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 331.

Habitat in insula Sitkba DD. Eschscholtz et Blaschke.

257. HYLURGUS OBESUS *Eschscholtz*: Brevis, nigro-piceus, cinereo-pubescent, antennis, palpis tarsisque rufis, elytris punctato-striatis, interstitiis tuberculato-rugulosis, thorace creberime punctato, longitudinaliter carinato, ante apicem impresso-constricto.

Longit. 2 3/4 lin. Latit. 1 1/3 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 331.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

H. LIGNIPEDUS *Fabr.* affinis, sed duplo minor, punctura

crebriore et subtiliore et thorace breviore, anterius magis angustato, constricto diversus.

258. HYLURONS RUCIPENNIS. Oblongus, subcylindricus, supra rufo-piceus, subtus nigro-fuscus, subtiliter cipereo-pubescent, thorace creberime punctulato, carinato, anterius angustato, elytris profunde punctato-striatis, intersticiis fortiter tuberculato-rugosis.

Longit. 2; 2 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{8}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

H. PALLIATO Gyllenhal similis, sed major, longior.

259. HYLURCUS PUMILUS: Elongatus, ferrugineo-testaceus, capite thoracisque apice obscurioribus, thorace oblongo, crebre punctato, haud carinato, elytris profunde punctato-striatis.

Longit $\frac{3}{8}$ lin. Latit. $\frac{1}{5}$ lin.

Habitat in insula Sitkha DD. Kuprianoff et Blaschke.

260. BOSTRICHUS CAVIFRONS: Cylindricus, nigro-piceus, antennis, pedibus thorace subgloboso et elytris apice integris ferrugineo-testaceis, thoracis lateribus antrorsum latius, elytrorumque subtilissime punctato-striatorum margine, sutura vittaque media nigro-fuscis, capite maris profunde excavato.

Longit. $1\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{3}{8}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

B. LINEATO Oliv. similis, sed angustior, capite profundius excavato elytrisque subtilius punctato-striatis diversus.

- 261. BOSTRICHUS SEPTENTRIONIS** Leconte : Oblongus, brunneus, subnitidus, longius griseo-pilosus. thorace ovato, crebre punctato, obsolete carinato, elytris integris, profunde striato-punctatis, interstiliis seriatopunctatis.

Longit. 1 $\frac{2}{3}$, 2 lin. Latit. $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ lin.

B. VILLOSUS VAR. Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 332.

Habitat in insula Sitkha D. Kuprianoff.

B. VILLOSO Gyllenhal certe valde affinis, sed longius griseo-pubescent, profundius punctatus et thorace medio evidenter carinato diversus mihi videtur.

- 262. BOSTRICHUS TERMINALIS** : Oblongus, crebre et profunde punctatus, nigro-piceus, pilis parvis erectis cinereis hispidus, thoracis elytrorumque apice rufis, elytris integris, antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Longit. $\frac{3}{4}$ lin. Latit. $\frac{1}{3}$ lin.

Habitat in California D. Blaschke.

- 263. BOSTRICHUS NITIDULUS** : Elongatus, nigro-piceus, nitidus, antennis tarsisque testaceis, thorace profunde punctato, antice asperato, elytris profunde striato-punctatis, apice subretusis, profunde canaliculatis.

Longit. $\frac{3}{4}$, 1 lin. Latit. $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

264. Cis vitulus: Oblongus, fusco-piceus, punctulatus, pube brevissima rigida adspersus, capite excavato, margine antico quadridentato, thorace apice cornubus duobus antrorsum porrectis armato, antennis pedibusque rufotestaceis.

Longit. 1 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. $\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

265. LADRIDIUS QUADRICOLLIS: Elongatus, depresso, glaber, ferrugineo-testaceus, oculis nigris, thorace oblongo-quadrato, obsolete canaliculato, medio utrinque foveolato, basi transversim impresso, angulis anticis lobato-productis, elytris oblongis, profunde striato-punctatis, apice obtusis

Longit. 3/4, 1 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 5/12, 1/2 lin.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

L. ANGUSTICOLLIS Gyllenhal affinis, sed major, præsertim in elytris multo angustior.

266. LATRIDIUS PROTENSICOLLIS: Elongatus, depresso, glaber, nigro-piceus, antennis, pedibus elytrisque ferrugineo-testaceis, his macula communi media nigrescente, thorace angustiore, oblongo-quadrato, canaliculato, medio utrinque foveolato, basi transversim impresso, angulis anticis lobato-productis, elytris profunde striato-punctatis, apice obtusis.

Longit. 3/4 lin. Latit. 1/2 lin.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

Præcedenti affinis, thorace angustiore, lateribus magis elevato-marginatis, elytris brevioribus et colore diversus.

- 267. LATRIDIUS CORDICOLLIS:** Elongatus, depresso, glaber, ferrugineo-testaceus, capite subrotundato, thorace cordato, apice truncato, angulis rotundatis, basi transversim impresso, elytris oblongis, profunde striato-punctulatis, apice rotundatis.

Longit. 1/2 lin. Latit. 1/6 lin.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

- 268. RHYZOPHAGUS DIMIDIATUS Eschscholtz:** Linearis, subdepressus, nitidus, thorace oblongo-quadrato, subtiliter remote punctulato, elytris piceus, capite antice, elytrorum basi, antennis pedibus abdomineque rufo-ferrugineis.

VAR. b. Corpore toto ferrugineo-testaceo.

Longit. 1 1/2 lin. Latit. 1/2 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 337.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

- 269. RHAGODERA TUBERCULATA Eschscholtz:** Elongata, sordide nigro-fusca opaca, clypeo magno dilatato, explanato, thorace dorso bicostato, lateribus serrato, elytris conjunctim novem-costatis, interstitiis bifariam profunde striato-punctatis.

Longit. 3 1/4 lin. Latit. 1 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 337.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole misit D. *Rouillier*.

270. SILVANUS SEXDENTATUS Fabricius: Elongatus, fusco-testaceus pubescens, thorace sulcato, utrinque sexdentato, elytris punctato-striatis, interstitiis alternis elevatioribus

Longit. $1\frac{1}{2}$ lin. Latit. $\frac{4}{5}$ lin.

Gyllenhal, Ins. Suec. III. p. 406. 2.—*Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 338.

DERMESTES 6-DENTATUS Fabr. Syst. El. I. 317. 25.

COLYDIUM 6-DENTATUM Paykull. Fauna Suec. III. p. 318. 2.

COLYDIUM FRUMENTARIUM Fabr. Syst. El. II. p. 557. 11.

IPS FRUMENTARIA Oliv. Entom. II. 18. p. 10. 14. Tab. 2. fig. 13. a. b.

SILVANUS SURINAMENSIS Stephens Illustr. of British Entom. III. p. 104. Manual of British Coleopt. p. 127. 1032.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; in granis Oryzae certe allatus.

271. TROCOSITA CHLORODIA: Elongata, supra viridæna, fronte canaliculata corporeque subtus cyanescens, capite thoraceque punctatis, hoc basin versus sinuato-angustato, elytris striato-punctatis, interstitiis seriato-punctatis.

Longit. $7\frac{1}{2}$ lin. Latit. $2\frac{1}{3}$ lin.

In nave e California ad Americam meridionalem iter faciente a D. *Blaschke* capta; verosimile Californiam incola.

T. VIRESCENTI valde affinis et forsitan ejus varieetas major.

N° II. 1843.

20

272. *TROGOSITA VIRIDICYANEA*: Elongata, supra cyanea, viridi-micans, subtus virescens, fronte canaliculata, capite thoraceque crebrius punctatis, hoc versus basin rotundato-angustato, elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis seriato-punctatis.

Longit. 6²/₃ lin. Latit. 2 lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

A praecedente differt colore, capite thoraceque crebrius punctatis, clytris paullo brevioribus, subtilius striato-punctatis et thorace versus basin haud sinuato-angustato.

273. *TROGOSITA MAURITANICA* Linné: Elongata, depressa, supra nigra nitida, subtus rufo-picea, thorace cordato, elytris a thorace remotis, tenui punctato-striatis, interstitiis serie dupli punctatis.

VAR. b. rufo-ferruginea.

Longit. 3, 4 lin. Latit. 1¹/₃, 1¹/₂ lin.

Oliv. Entom. II. 19. p. 6. 2. Tab. 1. fig. 2. a. b.—Gyllenhal, Ins. suec. I. p. 72. 1.—Stephens Illustr. of British Entom. IV. p. 224. Manual of British Coleopt. p. 141. 1139.

TROGOSITA CARABOIDES Fabr. Syst. El. I. p. 151. 6.—Schönherr, Syn. Ins. p. I. 155. 5.—Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 339.

TENEBRIOS MAURITANICUS Linné Syst. Nat. I. II. p. 674, 4.

Habitat in insula Sittha in cibariis et pellibus D. Blaschke; per totum orbem terrarum obvia.

274. **TROGOSITA PUSILLIMA**: Elongata deppressa, pallide rufo-testacea, thorace basi transversim impresso, lineolis tribus exarato, in medio foveolato, elytris subtiliter crebre punctulatis, stria suturali profunde impressa.

Longit. 1/2 lin. Latit. 1/6 lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

275. **CUCUJUS PUNICEUS Eschscholtz**: Elongatus, depressus, læte sanguineus, antennis nigro-fuscis, pectore abdomineque rufo-ferrugineis, thorace subrotundato, lateribus leviter denticulato, supra obsolete bisulcato.

Longit. 6 1/2 lin. Latit. 1 3/4 lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 340

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. benevole communicavit Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

C. DEPRESSO Fabr. longior, angustior, colore et capitis thoracisque structura diversus **C. CLAVIPEDE Oliv.** adhuc multo longior et ab illo colore, thorace rotundato et capite postice minus producto distinctus.

276. **LÆMOPHLOEUS LONGICORNIS**: Oblongus, planus, rufo-testaceus, subtiliter punctulatus et pubescens, thorace transverso mutico, apice tenue marginato, basi angustato, supra tenuer bistriato, elytris ferrugineis utrinque tristriatis.

Mas: Antennæ corpore multo longiores, articulis 1—4 brevibus subobconicis, 5—10

antecedentibus fere duplo longioribus subcylindricis, ultimo adhuc paulo longiore, apice rotundato.

Femina: Antennæ longitudine capitis cum thorace, moniliformes, articulis subrotundatis, duobus primis et tribus ultimis majoribus.

Longit. $\frac{2}{3}$ lin. Latit. $\frac{4}{5}$ lin.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

L. TESTACEO *Fabr.* minor, latior et antennis maris longioribus tenuioribus diversus.

LONGICORNIA.

277. SONDYLIS UPIFORMIS Eschscholtz: Elongatus, niger, crebre rugoso-punctatus, thorace subcordato, elytris lineis tribus elevatis ad apicem fere extensis.

Longit. $6\frac{1}{2}$ lin. Latit. $2\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 341.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole misit D. *Rouillier*.

Minoribus S. *Buprestoidis* individuis adhuc minor, angustior, - thoracis forma et punctura omnium partium alia distinguendus.

***278. ASEUM ATRUM Eschscholtz:** Atrum, thorace punctulato, elytris lineis elevatis obsoletis.

Eschscholtz, Bullet. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou II. p. 66.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

279. OPSIMUS QUADRILINEATUS *Eschscholtz.* Elongatus, brunneo-testaceus, subtilissime punctulatus, pube cinereo-flavescente obductus, capite et thorace linea media, elytrisque in utroque lineis binis longitudinalibus, elevatis glabris.

Mas: Antennis corpore interdum longioribus, paullo crassioribus, elytris thorace plus quam triplo longioribus.

Femina: Antennis corpore multo brevioribus, tenuioribus, elytris thorace quadruplo longioribus.

Longit. 4 $\frac{1}{2}$, 5 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{2}{3}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 354.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff*, *Fischer*, *Blaschke* et *Tschernikh*; individuum in California captum etiam misit D. *Tschernikh*, verosimile navibus istuc allatum.

280. CLYTUS NAUTJCUS: Nigro-piceus, obscurus, supra parcus, subtus dense cinereo-pubescent, thorace rugoso-punctato, lateribus et lineis duabus longitudinalibus, elytris macula fasciisque duabus flexuosis cinereo-pubescentibus, his basi, margine suturaque testaceis.

Longit. 7 lin Latit. 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Lectus a D. *Blaschke* in nave e California iter faciente ideoque ut illius regionis incola putandus.

CHYSOMELINÆ.

281. DONACIA GERMARI *Eschscholtz*: *Viridi-cuprea*,
 antennis nigris, articulis exterioribus basi
 pedibusque rufis, thorace oblongo-quadrato
 subtilissime punctulato, antice binodulo, elytris
 crenato-striatis, intersticiis transversim rugu-
 losis, femoribus posticis unidentatis.

VAR. b. fusco-aenea, elytris levius striato-
 punctatis, subtilius transversim rugulosis,
 segmentis ventralibus late ferrugineis.

Longit. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 383.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*. VAR. b. in Museo
 Univ. Imp. Mosqu. asservata.

282. DONACIA FLAVIPENNIS *Eschscholtz*: Ferrugineo-
 testacea, capite antennisque nigris, thorace
 oblongo-quadrato, posterius angustato, rufo,
 antice binodulo, elytris crenato-striatis, inter-
 sticiis transversim rugulosis, femoribus posti-
 cis unidentatis.

Longit. 3 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 383.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ.
 Imp. Mosqu. ad describendum benevole communicavit
 Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

Statura fere præcedentis, sed multo angustior et aliter
 coloratus, elytris profundius striato-punctatis punctis
 inter se remotioribus etiam diversa.

283. SYNETA CARINATA *Eschscholtz*: Elongata, ferrugineo-testacea, ore thoracis elytrorumque marginibus pallidioribus, thorace lateribus unidentato, elytris costis utrinque binis argute elevatis.

Longit. 4 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 385.

Habitat in insula Sitka D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ab Excell. D. *Fischer de Waldheim* missa.

284. ODONTOTA RUBROLINEATA: Oblonga, capite thoraceque profunde punctatis nigris, elytris profunde punctato-striatis atro-cyaneis, thorace macula utrinque lateral i elytrisque linea longitudinali media rubris, corpore subtus cœruleo.

Longit. 2 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

285. CORTOCYCLA AURISPLENDENS *Eschscholtz*: Subhemisphærica, rufo-ferruginea, marginē omni explanato, elytris leviter striato-punctatis, lateribus compressis, utrinque anterius in dorso foveola leviter impressa infuscata, corpore subtus antennisque extrorsum nigris.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{3}{4}$ lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lin.

C. *SEXPUNCTATA* VAR. *Dejean*, Cat. 3^{me} édit. p. 397.

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

C. *SEXPUNCTATA* *Fabr.* certe valde affinis, sed diversa mihi videtur, magnitudine semper minore, marginē thoracis

elytrorumque minus explanato-dilatatis, elytris angulis humeralibus multo minus productis, striis crebre punctatis, foveola tantum unica dorsali levius impressa et corpore subtus fere toto nigra, ano tantum rufescente.

- 286. CASSIDA NOVEMMACULATA:** Subovata, rufo-testacea, margine explanato ferrugineo, in elytris reflexo, elytris profunde striato-punctatis, lateribus vix compressis, thorace maculis tribus, elystrisque utrinque tribus, scutello antennarum apice corporeaque subtus cum pedibus nigris.

Longit. 3 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 2 $\frac{1}{4}$ lin.

Habitat in California DD. *Blaschke et Tschernikh.* Color in vivis læte sanguineus auro-splendens.

- 287. GALLERUCA FLAVOLIMBATA:** Viridi-aenea, cærulecenti-micans, capite, thorace, pedibus elytrorumque margine flavo-testaceis, capite plaga verticali thoraceque maculis tribus virescentibus, tibiis externe tarsisque infuscatis, femoribus interdum nigro-maculatis.

Longit. 3 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California DD. *Blaschke et Tschernikh;* a DD. *Fischer de Waldheim et Obert* communicata. Magnitudo et fere statura *G. CALMARIENSIS Paykull.*

- 288. GALLERUCA PUNCTIPENNIS:** Subdepressa, nigra, thorace flavo maculis tribus nigris, ore, antennarum articuli priimi apice, geniculis, tibiarumque basi flavis, elytris concinne punctulatis.

Longit. 3 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

Statura et magnitudo G. *Nymphaea*, elytris totis nigris, regulariter concinne punctulatis ab illa mox distinguenda.

289. **DIABROTICA TRIVITTATA**: Oblonga, nigra, thorace fulvo, biimpresso, femorum basi elytrisque pallide flavis, his costulatis, interstitiis bifariam striato-punctatis, vitta media lata et sutura nigris.

Longit. 2 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

D. *VITTATA* Fabr. affinis, paullo major, nigredine suturali latiore, tibiis totis femorumque maxima parte nigris præcipue diversa.

290. **DIABROTICA DUODECIMPUNCTATA** *Fabricius*: Oblonga, flava, capite, antennis extorsum, pectore, femoribus extus, tibiis, tarsis elytrorumque maculis in singulo sex per paria dispositis, nigris.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 405.

CARIOCERIS 12-PUNCTATA Fabr. Syst. El. I. p. 547. 39.—*Schönherr, Syn. Ins.* II. p. 273. 40.

GALLERUCA 12-PUNCTATA Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 15. 12.

VAR. b. in omni puncto simillima, sed antennis nigris, articulis tribus primis basi testaceis et corpore subtus cum pedibus nigro, subtiliter griseo-pubescente.

GALLERUCA 11-PUNCTATA *Eschscholtz* in litteris.

Longit. 3 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh*;
Var. b. ibi tantum invenitur, anne re vera species distincta?

291. GRAPTODERA PLICIPENNIS: Oblonga, convexa, supra coerulea, subtus cyanea, capite rugoso-punctato, thoracis apice vix angustiore, thorace disperse, elytris creberrime punctulatis, his costa marginali elevata posterius ambiente ibique ad suturam connexa.

Longit. 2 $\frac{1}{2}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh*.

Statura G. JANTHINE *Illiger*, sed in elytris longior et multo subtilius et crebrius punctulata, thorace levius transversim impresso et costa marginali elytrorum distincta. (*)

282. GRAPTODERA CALIFORNICA: Oblongo-ovata, convexa, coerulea, capite thoracis apice multo

(*) In *Dejean's Catalog.* p. 412. findet sich als Varietät von **GRAPTODERA PLICATA** *Klug* eine COSTATA Mannerh. von der Nordwest Küste Amerikas. Ich bekam freilich von dem verstorbenen Professor *Sitschegloff* einige Stücke dieses Käfers, mit einer solchen Angabe des Vaterlandes; allein da der fragliche Käfer dort sehr häufig vorkommen sollte und nicht von den auf der Insel Sitkha gewesenen Sammler *ex professo* gefunden worden ist, muss ich jetzt die Angabe des Herrn *Sitschegloff* bezweifeln.

angustiore, thorace obsoletissime punctulato, linea transversa postica levissime impressa, elytris subtiliter punctulatis.

Longit. 2 $\frac{1}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$ lin.

Habitat in California ad Ross D. Fischer.

Statura G. OLERACEA, sed major thorace convextiore, obsoletissime transversim impresso et elytris subtilius punctulatis distincta.

293. DISONYCHA MARITIMA: Rotundato-ovata, crebre punctulata, nigra, fronte macula, thorace, elytrorum vittis duabus postice connexis anque flavis.

VAR. b. *capitis macula thoraceque fulvo-croceis.*

Longit. 2 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 414.

Habitat in California, in plantis ad littora maris DD. Eschscholtz et Blaschke.

294. CHLAMYS CONSPERSA: Nigro-fusca, foveolato-punctata, thoracis medio pulvinato, elytris tuberculis elevatis scabris, sutura, crenata, fronte, thoracisque apice maculis majoribus notatis, thoracis disco, elytris et pedibus guttis minutis luteis conspersis.

Longit. 1 lin. Latit. 2/3 lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

295. PACHYBRACHYS SIGNATIFRONS: Niger, confertim punctatus, elytris extrossum punctato-striatis.

capitis macula magna furcata, thoracis marginé laterali, elytrorum basali et subhumerali, femorum basi et macula antica flavo-ferrugineis.

Longit. 1 $\frac{1}{4}$ lin. Latit. $\frac{3}{4}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

296. **CRYPTOCEPHALUS CHALCONATUS**: Cupreo-aeneus, fronte, ore, antennis; thorace subtus et lateribus pedibusque rufo-ferrugineis, thorace convexo, postice punctis utrinque quatuor impressis, elytris seriato-punctatis.

Longit. 1 lin. Latit. $\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. *Blaschke*, a D. *Obert* communicatus.

TRIMERA.

297. **HIPPODAMIA VITTIGERA**: Oblongo-ovata, nigra, minus convexa, macula frontali, thoracis marginé antico et lateralí lineaque media, elytrisque margine et vitta longitudinali rufo-testaceis.

Longit. $2\frac{1}{3}$ lin. Latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in California D. *Tschernikh.*

298. **COCCINELLA CALIFORNICA Eschscholtz**: Hemisphærica, nigra, capite maculis duabus, thorace utrinque macula apicis elytrisque juxta

scutellum albidis, elytris rufis, macula scutellari suturaque nigris.

VAR. b. elytrorum albedine juxta scutellum deficiente.

Longit. 2 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 457.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Blaschke. VAR. b. a D. Tschernikh captam misit Excell. D. Fischer de Waldheim.

299. SCYMNUS MARGINICOLLIS : *Subhemisphæricus, niger, pubescens, ore, antennis thoracisque margine antico et laterali rufo-ferrugineis.*

Longit. 1 lin. Latit. 3/8 lin.

Habitat in California D. Blaschke.

S. PARVULUS Fabr. statura et magnitudine similis, niger, undique sat dense griseo-pubescent, ore, antennis thoracisque margine antico et laterali tantum rufescens-tibus.

DIMERA.

***300. BATRISUS ALBIONICUS Eschscholtz :** *Elongato-subcylindricus, convexus, niger, capite majusculo, in vertice tuberculo parum elevato, medio fossula vix perspicua impresso et sulco lœvi circumducto, adjectis foveolis posticis duabus rotundatis, thorace trapezoidali, in medio lineola brevissima et utrinque singula*

*integra ante basin cum tribus foveolis con-
junctis, his foveolis sulco transverso bisinuato
connexis, elytris castaneo-testaceis.*

Longit. 15/8 lin.

Aubé in *Guérin Magasin de Zoologie.* III. p. 49 6.
Dejean, Cat. 3^{me} édit. p. 466.

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

