


BOLETIN  
DE LA  
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE  
HISTORIA NATURAL

FUNDADA EN 15 DE MARZO DE 1871

Tomo XXVII. - 1927

MADRID  
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES  
HIPÓDROMO.—TELÉF. 50.804

1927



## Sex nova Coleoptera palaeartica

auct.

**J. Roubal.**

### **Neuraphes elongatulus Müll. v. rugosissimus n.**

*Neuraphis elongatuli* Müll. thoracis structura maxime variabilis est. Supra omnem modum densissima et asperrima, praecipue in exemplaribus regionum alpinarum reperiri potest. His autem exemplaribus pronoto punctatissimo simul que prope granuloso et opaco proprium nomen dandum esse puto.

In montanis regionibus Europae centralis, praecipue in Alpibus ut mihi dominus Etibor Blattny-Pragae per litteras nuntiavit, in Carpathibus orientalibus.

Corná hora in RCS, cf., quae in Ent. Blatt., XXII, 1926, p. 10 commemoravi, in Transsilvania Mehadia, Aquae Herculis, Victor Stiller leg. Coll Ct. Blattny, Stiller, Roubal.

### **Xenostrogylus (Oxystrogylus) sanctissimus n. sp.**

Unicae adhuc cognitae speciei subgeneris *Oxystrogylus*, *seriepunctati* Reitt., Fauna germanica, III, 1911, p. 26, de qua auctor dicit: «nur eine Art aus Spanien», haec nova addenda est, quae quia seriepunctatae est simillima, per comparisonem describatur: distinguitur enim nova illa species ab *O. seriepunctato* Reitt. (cuius unum exemplar cotypicum ab illustrissimo amico, domino J. M. de la Fuente donatum possideo) his signis: primum quod est corpore brevior, crassior, parallelior, nam elytrorum latera ad apicem versus multo lenius convergunt, deinde quod eius prothorax brevior atque latior et paululum elytris angustior est, cum idem in *seriepunctato* sit multo angustior, tum quod latera aequabiliter rotundantur neque ad apicem versus coangustantur sicut in *seriepunctato*, deinde quod scutellum non tam dense punctatum est et setae elytrorum tenuiores sunt, denique quod puncta minora quidem sed spissa elytrorum post basim aliquanto rude-granulosa efficiunt, priore autem rubra elytrorum fascia suturam non in dimidio, sed intra tertiam et dimidiam partem secante.

Palaeestina: «Petah Tykv», 4, I, 1926. Coll. mea.



De domino gymnasii direttore, Simone Tenenbaum-Varsoviae, lectus. De eadem excursionione *Euplectus Tenenbaumi* m., Bull. Soc. Ent. Fr., 1926, p. 181-182, *Carpophilus Tenenbaumi* m., Entom. Anz. VI, 1926, p. 171, proveniunt.

**Exochomus illaesticollis** n. sp.

*Exochomo bipustulato* L. affinis, his signis ab illo dignosci potest: thoracis basi a neutra parte excisa, elytrorum lateribus parte antica manifeste angustioribus, ad partem posticam rotunde dilatatis, angulis humeralibus non prominulentibus, rotundatis; elytris laevibus neque microscopice reticulatis, ut in *E. bipustulato* cernitur, macula elytrorum rufotestacea rotundata post humerum collocata neque lunulata. Macula posterior, paulum quidem transversa, solito loco posita est.-Ab *E. bipustulato cordiformi* m., Col. Centralbl., I, 1926, p. 245-246, praecipue elytrorum forma distinguendus est.

Caucas occ. Krasnaja Poljana, VII, 1910 a me captus. Coll. mea.

**Nephus Redtenbacheri** Muls. a. **ochraceipennis** n.

Cum altera extrema aberratio *Nephi Redtenbacheri* Muls. a. *nigra* Wse. elytris totis nigris sit, altera, a. *ochraceipennis* n. colore totorum elytrorum ochraceo abundat.

RCS: Pacov, VIII, 1915, exemplaria nonnulla collegi. Coll. mea.

**Cardiophorus cinereus** Hrbst. a. **Kyselyi** n.

Corpore nigro, antennis baseos ferrugineis ad apicem versus paulatim obscuratis, hoc nigro, femoribus, apicibus ferrugineis exceptis, nigris, elytris nigris, post humeros macula parva testacea, cui similis in *Selatosomo bipustulato* cerni potest.

RCS: Bratislava, V, 1923 exemplaria 3 inceni. Coll. mea.

Domino scholarum directori, Carolo Kysely, Drzovicensi (Moravia) dedicatus.

**Phytodecta Gobanzi** Reitt. a. **Thurnheri** n.

Color niger reliquos superat, capitis color ut in ♀ a. *lagarinensi* Halbheer, Aggiunte all'elenco sist. d. Coll. fin. racc. nel. Valle Lagar., Mus. Civ. Rovereto, XLV, 1908, p. 33; thorax totus niger est cum in a. *la-*

*garinensi* luteo nigram maculam litterae M similem habet, elytra ita fere ut in *Ph. viminali* L. a. *cincta* Wse. colorata sunt, quorum par posterior nigra, angustiore vel latiore margine luteo praecincta, ad basim versus plus-minus porrigitur, luteae parti superiori per acutos sinus in mediis fere elytris immiscetur, ita quidem, ut flavus sinus utrinque et in sutura in partem nigram penetret; pedes nigri sunt tibiis mediis ac posterioribus luteam maculam incertam gerentibus, tarsis clarioribus.

Aberratio analogica *Ph. variabili* Oliv. a. *marginatae* Reineck, Deut. E. Z., 1911, p. 480.

*Phytodecta Gobanzi* Reitt., Wien. E. Z., XXI, 1903, p. 141, quae descriptio de Fiori in Riv. C. It., I, 1903, p. 59, recapitulata, quamvis J. Daniele, Münch. Kol. Z., I, 1902-1903, p. 254-255, dubitante, certe pro specie distincta habenda est.

Alpes Trentinae, in altudine 1.000 m. a. domino Ing. Venceslao Thurnher, Stodensi (Bohemia), entomologo egregio, 1925 lecta eique dedicata (Coll. Thurnher, Roubal).

## Líquenes de la provincia de Pontevedra

por

**Gonzalo Sampaio y Luis Crespi.**

### I

Durante el verano y las vacaciones de Navidad del año 1925 realicé, en compañía de mi cuñado Miguel Rodríguez, cuya inteligente y entusiasta vocación por los estudios botánicos auxilió mucho mi labor, varias excursiones liquenológicas por la provincia de Pontevedra. De este modo formé la colección que hoy obra en poder del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y de ella nació la presente lista, fruto de una colaboración con mi queridísimo maestro e ilustre botánico Dr. Sampaio, durante mi última etapa de pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios. Pensé apurar la bibliografía existente sobre líquenes de España antes de publicarlo. De ese modo podrían precisarse las especies nuevas que este trabajo contiene. No me ha bastado el año transcurrido para dar concluida la labor. Será objeto de otro trabajo, ya que es una necesidad inventariar esta flora de nuestro país.—L. CRESPI.



## ADVERTENCIA

El tomo XXVII del BOLETÍN se ha publicado en diez cuadernos sueltos, cuyas fechas de publicación y páginas que comprenden son las siguientes:

- 1.º (págs. 1 a 64), 30 enero 1927.
- 2.º ( » 65 a 112), 28 febrero 1927.
- 3.º ( » 113 a 160), 25 marzo 1927.
- 4.º ( » 161 a 216), 30 abril 1927.
- 5.º ( » 217 a 264), 30 mayo 1927.
- 6.º ( » 265 a 304), 30 junio 1927.
- 7.º ( » 305 a 336), 20 septiembre 1927.
- 8.º ( » 337 a 368), 30 octubre 1927.
- 9.º ( » 369 a 416), 30 noviembre 1927.
- 10.º ( » 417 a 512), 31 diciembre 1927.

