


discal fascia and the upper margin of the apical fascia converging towards the costal border; appendix whitish hyaline. Wings hyaline, with veins brown. Legs and abdomen below pale ochraceous, with the pygofer and ovipositor brownish; posterior margin of last ventrite with a rather



*Pogonoscopus myrmex*, sp. n.

a, face; b, crown and pronotum; c, tegmen.

broad semicircular median incision, the remainder convexly sinuate on each side.

Total length 9 mm; width across base of pronotum 3 mm.

Described from material preserved in spirit.

3 ♀♀, West Australia, Perth (*J. Clark*); November 1920. Attended by ants, *Camponotus (Myrmophyma) testaceipes*, Smith.

---

LVIII.—*Un Scymnus (Pullus) nouveau de Mexique* (Col., Coccinellidæ). Par Dr. A. SICARD.

PARMI quelques Coccinellids communiqués par M. Guy A. K. Marshall se trouvaient deux espèces de *Scymnus* de Mexique.

Une de ces espèces ne me paraît se distinguer du *Sc. (Dionemus) margipallens*, Muls., du Brésil, que par la bordure

apicale claire des elytres un peu plus nettement marquée que dans l'exemplaire typique de la collection Mniszech actuellement en ma possession. Ce caractère ne me paraît pas suffisant pour le différencier de cette espèce, d'autant plus que les exemplaires communiqués sont plus frais que celui que je possédais déjà.

La deuxième espèce me paraît nouvelle, et j'en donne ci-dessous la description.

*Scymnus* (*Pullus*) *uncinatus*, sp. n.

Late ovatus, parum convexus, brunneus. Prothorace rufo, medio infuscato (♂), nigro lateribus rufis (♀). Elytris nigris, apice tenue testaceis, macula elongata obliqua, in medio stricta, ad apicem dilatata, externe producta; subtus brunneus, abdomine rufo medio leviter infuscato. Laminis abdominalibus integris; prosterno carinulato; pedibus testaceis.

Long. 1.5-1.8 mm.

En ovale large, peu convexe, luisant, couvert d'une pubescence grise courte et peu dense. Tête roussâtre dans les deux sexes. Corselet roux, marqué d'une tache noire à la base (♂), ou noir avec les côtés étroitement roussâtres. Elytres largement arrondis à l'extrémité, droits sur les deux tiers des côtés, à calus huméral très peu saillant, noirs avec l'apex étroitement testacé et marginé en outre d'une tache allongée, légèrement oblique en arrière et en dedans, étendue du quart aux cinq sixièmes de la longueur environ et paraissant formée de deux taches réunies par une partie étranglée plus sombre, la tache antérieure rougeâtre, la postérieure testacée, cette dernière plus grosse, un peu transversale et recourbée en dehors et en avant, l'ensemble formant ainsi un crochet ou un point d'interrogation renversé. Dessous brun sur la poitrine et le milieu du ventre avec le reste de l'abdomen plus clair. Pieds entièrement testacés. Plaques abdominales entières; prosternum finement carinulé.

Cette espèce est originaire du Mexique et a été acclimatée à Honolulu, d'où viennent les exemplaires qui m'ont été communiqués, envoyés par M. Fullaway.

Son dessin l'éloigne de toutes les espèces décrites jusqu'ici. Le *Sc. bisbinotatus*, Gorb., en est bien distinct par son corselet noir, ses elytres à apex concolore, la forme et la direction de ses taches. Des exemplaires chez lesquels la tache antérieure serait absente ressembleraient assez comme dessin au *Sc. pictus*, Gorb., mais ce dernier est plus convexe, plus acuminé en arrière, ses elytres n'ont pas de bordure apicale, son corselet est entièrement rouge et sa taille plus petite.