

4 triangulare, 5 et sequentibus plus minusve longe dentatis; thorace parum elongato, obconico, antice valde angustato, angulis posticis valde prominulis, medio subconvexo, lateraliter paulo compresso, in disco sulcatulo, sat fortiter punctato, fere uniformiter albo-pubescente; scutello parvo; elytris thorace postice paulo latioribus, brevibus, lateraliter subarcuatis, ad basin medio minuto tuberculatis, humeris rotundatis, sat prominulis, minute striatis, dense albo-pubescentibus, lateraliter pro parte denudatis; pygidio horizontali, valido, dense uniformiter albo-pubescente, supra medio breviter sulcato; pedibus 4 anticis gracilibus, posticis validis, femoribus apice tridentatis dente prima longiore, tibiis carinatis, apice intus longe spinosis.

Long. 3 mm.

SOUDAN ANGLAIS.

Par sa forme voisin de *B. atrolineatus*, Pic, en diffère, en plus du revêtement blanc uniforme, par la tête plus longue derrière les yeux, le prothorax plus égal en dessus, les élytres à stries à peine indiquées, les cuisses postérieures plus fortes.

Bruchus poupillieri diversiventris, subsp. n.*.

Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pro parte dense pubescens, rufo-testaceus, capite pectoreque nigris, thorace variabili, nigro aut diverse rufo-testaceo, oculis maximis; thorace plus minusve brevi, sat lato, antice paulo attenuato, lobo medio paulo inciso aut supra depresso; membris testaceis; antennis crassioribus ♂, femoribus posticis parum crassis, inermis.

Long. 2 mm.

SOUDAN ANGLAIS.

Semble différer de *B. poupillieri*, All., par le prothorax plus robuste, moins conique, à lobe médian impressionné, la tête très large chez le ♂, enfin, chez les trois exemplaires examinés, par la coloration testacée de l'abdomen.

XXXIII.—Description de quelques espèces nouvelles de Coccinellides. Par le Dr. A. SICARD.

Scymnus (Nephus) bicolor, sp. n.

Breviter ovatus, niger, nitidus, pube tenui grisea sat dense vestitus; capite rufo (♂) in medio leviter infuscato (♀), abdomine nigro, apice anguste dilutiore, lateribus prothoracis fulvis (♂) vel nigris (♀). Pedibus, in utroque sexu, rufo-flavis. Laminis

* Figure aussi dans la coll. Pic.

abdominalibus haud integris, linea femorali $\frac{3}{4}$ longitudinis segmenti attingente, extus abbreviata. Prosterno haud carinato, quadrato-elongato.

Long. 1.9-2.0 mm.

En ovale court, médiocrement convexe, brillant, à pubescence grisâtre, avec la tête et les côtés du corselet roux (σ) ou la première rembrunie au milieu et les seconds concolores (♀). Pieds d'un roux vif dans les deux sexes. Dessous noir avec l'extrémité abdominale parfois étroitement plus claire. Plaques abdominales incomplètes. La ligne femorale, d'abord en ligne courbe jusqu'aux trois quarts de la longueur du premier segment abdominal, se dirige ensuite obliquement vers le bord latéral dont elle reste éloignée. Le prosternum est plan, en quadrilatère allongé.

PANAMA.

Je n'ai trouvé aucune description correspondant au signalement de cet insecte dans la 'Biologia Centrali-Americana' de Gorham, et elle ne peut être assimilée à aucune de celles décrites de l'Amérique centrale par M. Casey. Son système de coloration la rapproche du *Scymnus (Pullus) auritulus*, Muls., dont la distinguent facilement sa forme générale moins parallèle et plus arrondie, la tache latérale rousse du corselet plus atténuée en arrière, la tête rousse dans les deux sexes, seulement rembrunie au milieu chez la ♀ , ses élytres à extrémité concolore, son ventre noir, et enfin son prosternum non caréné et le dessin de ses plaques abdominales qui la font placer dans un sous-genre différent.

PHARELLUS, gen. nov.

Corpus parvum, breviter ovatum, postice attenuatum; supra pilis erectis vestitum. Caput inclinatum. Antennæ perbreves, 11-articulatæ (?), clava ovoidea triarticulata, palpi maxillares crassi, articulo ultimo conico; prosternum quadratum, curtulum, inclinatum, mesosternum transversale, metasternum grande, convexum. Pedes breves, femoribus sulcatis, tarsis crassioribus, triarticulatis. Epipleuris latis, in medio abrupte dilatatis usque ad $\frac{2}{3}$ longitudinis elytrorum prolongatis.

Très petit, en ovale court et atténué en arrière. Tête inclinée sur un prosternum très court et oblique (comme chez certains *Rodolia*). Antennes courtes, m'ayant paru formées de 11 articles, à massue ovoïde, arrondie surtout en dedans, de trois articles dont le troisième plus long que chacun des deux autres atténué et arrondi au sommet. Palpes maxillaires courts, gros, à dernier article conique. Prosternum très court, incliné. Mesosternum transversal, droit à sa partie

antérieure, échaneré en arc de cercle large en arrière pour recevoir l'extrémité antérieure du métasternum. Ce dernier grand, convexe, sans fossettes. Abdomen de six arceaux, le premier plus grand que chacun des trois suivants qui sont subégaux entr'eux, le cinquième aussi long que le premier, le sixième étroit, ogival, petit.

Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur des yeux; ceux-ci petits, arrondis, saillants; front convexe; épistome droit à sa partie antérieure, labre allongé, rétréci en avant et arrondi. Prothorax à côtés convergents en avant, régulièrement convexe, en ogive large et non sinué à la base qui est finement rebordée. Elytres à peine plus larges que le prothorax à leur base, régulièrement arrondis et élargis de l'angle huméral jusqu'au tiers antérieur, puis régulièrement atténués jusqu'à l'apex qui est arrondi. Epipeures larges, formant un repli à la partie externe des elytres, concaves, d'abord parallèles jusqu'au tiers, s'élargissant assez brusquement en cet endroit et formant un renflement arrondi, atténué en arrière jusqu'aux deux tiers de la longueur où les deux côtés se confondent pour former une lame unique. Pieds courts, fémurs sillonnés, ne dépassant pas le bord externe elytral, tarses larges, ongles petits (appendiculés?). Dessus couvert de poils hérissés dirigés d'arrière en avant sur le corselet et d'avant en arrière sur les élytres. Hanches antérieures et intermédiaires assez rapprochées, les postérieures très écartées.

Pharellus minutissimus, sp. n.

Supra piceus, prothorace dilutiore, subtus brunneus, labro, pedibus, palpis antennisque testaceis.
Long. 0.8 mm.

De très petite taille, inférieure à 1 millimètre. En ovale court, atténué en arrière. En dessus d'un brun de poix, plus clair sur le corselet, avec le labre, les antennes et les palpes testacés. Prothorax lisse. Ecusson bien visible, triangulaire. Elytres à repli externe bien marqué, à points gros, écartés, superficiels, calus huméral marqué. Epipeures foncées.

Dessous brunâtre, plus clair que le dessus. Premier arceau ventral deux fois plus long que chacun des trois suivants. Plaques abdominales grandes, n'atteignant pas tout à fait le bord postérieur de l'arceau en arc de cercle plus convexe en dehors qu'en dedans. Mésosternum lisse; métasternum couvert de gros points varioliques presque contigus.

JAVA.