

LE
COLÉOPTÉRISTE

OU

RÉPERTOIRE DES TRAVAUX SUR LES COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN-MONDE

Description des nouvelles Espèces, échos de ce qui se dit et se fait

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE M. G. CHÉRON, AVEC LE CONCOURS DU D^r A. CHOBAUT

Membres de la Société Entomologique de France et de la Société Française d'Entomologie

SOMMAIRE

- J. CROISSANDEAU. — De la Priorité en matière de description.
 Id. — Description de six nouvelles espèces de *Cephennium*.
 H. NICOLAS. — De la ponte de *Leptidea brevipennis* Muls.
 SICARD (D^r). — Habitat de coccinellides et variétés nouvelles.
 C.-E. LEPRIEUR. — Le Tamis à insectes, par E. REITTER. (*Suite.*)
 Nouvelles bibliographiques.
 Communications et Échanges.
 Comptes rendus des séances de la Société Entomologique de France du mois de décembre.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL

Payable en un Mandat à l'ordre de M. CHÉRON, 30, rue Duret, Paris

PARIS ET DÉPARTEMENTS..... 7 francs. || ÉTRANGER..... 8 francs.

Les Abonnements partent du 1^{er} Octobre de chaque année.

Les personnes qui s'abonneront durant l'année en cours recevront les numéros parus.

AVIS. — Prière d'envoyer les annonces et autres communications
 avant le DIX du mois.

La Direction du journal *LE COLÉOPTÉRISTE* fait appel à tous les Entomologistes pour les prier de vouloir bien la seconder dans sa tâche. C'est avec reconnaissance qu'elle recevra pour être publiés tous les travaux et observations qu'on voudra bien lui communiquer.

L'auteur de tout article inséré dans la Revue aura droit à quinze exemplaires.

Tout ouvrage dont il sera envoyé un exemplaire à la Direction, sera annoncé sur la couverture et analysé s'il y a lieu.

COMITÉ D'ÉTUDES

- H. du Buysson**, au Vernet (Allier). *Elatérides* d'Europe et confins.
Carret (abbé), professeur aux Chartreux, Lyon. *Carabiques*.
G. Chéron, 30, rue Duret, à Paris. *Aphodiides* et *Mylabrides* d'Europe et circa.
A. Chobaut, 4, rue Dorée, à Avignon. *Anthicidés*, *Mordellidés*, *Rhipiphoridés*, *Meloïdés* et *Edemeridés* d'Europe.
J. Croissandeau, à Orléans. *Pselaphidés* d'Europe et *Scydmaenidés* du globe.
L. Gavoy, 5 bis, rue de la Préfecture, à Carcassonne (Aude). *Lamellicornes*.
A. Lapeyre, faubourg El Kantara, à Constantine (Algérie). *Meloïdés* d'Europe et circa.
C.-E. Leprieur, 38, rue des Écoles, à Paris. *Hydrocanthares* et *Histéridés*.
J. Minsmer, capitaine au 142^e de ligne, à Mende (Lozère). *Longicornes* de France.
E. Olivier, à Moulins. *Lampyridés* d'Europe et circa.
M. Pic, à Digoin (Saône-et-Loire). *Longicornes* d'Europe et circa.
Sicard (D^r), à Albi (Tarn). *Coccinellidés* de France.

TABLEAUX ANALYTIQUES POUR DÉTERMINER LES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

LES NÉCROPHAGES

Un vol. in-8°, broché, de 116 pages, 3 fr. 50.

Adresser les demandes à M. ERNEST OLIVIER, Directeur de la *Revue scientifique du Bourbonnais*, 10, cours de la Préfecture, à MOULINS.

saule, les galeries nombreuses, véritables méandres, qu'elle se trace en sinueux détours.

Les corbeilles en osier, et généralement tous les gros ouvrages en vannerie sont détruits rapidement s'ils sont attaqués par le *Leptidea brevipennis*, qui choisit de préférence ceux où la poussière a pu s'accumuler en quantité.

La *Sympiezocera Laurasi* ♀, que j'ai examinée dans la collection de mon ami Chobaut, m'a montré quelques poils sur le bord postérieur des anneaux de l'abdomen, des derniers surtout, faibles houppes, simple duvet dont les insectes sont souvent revêtus et dont l'utilité reste la plupart du temps à l'état de problème.

Par atavisme peut-être, elle conserve donc encore une faible brosse, héritage légué par les formes ancestrales et bien amoindri, mais qui, chez la *Leptidea brevipennis*, a gardé sa valeur première et s'est même peut-être augmenté, s'il n'avait pas dans le passé géologique toute l'importance que nous lui constatons aujourd'hui.

H. NICOLAS (Avignon).

HABITAT DE COCCINELLIDES ET VARIÉTÉS NOUVELLES

- Chilocorus similis* Rossi. — Dordogne. (Commun sur des rosiers infestés de pucerons. — Jusqu'à l'automne.)
- Chilocorus Bipustulatus* L. — Avec le précédent, plus commun, quelques individus à élytres brunes.
- Exochomus auritus* Scrib. — En nombre sur des genévriers, Dordogne. — Tarn, quelques exemplaires.
- Exochomus 4-pustulatus* L. — Plus commun que le précédent (même habitat) et d'apparition plus tardive dans la Dordogne. — La var. *distinctus* Brul. est assez commune. — Var. *floralis* Mots. quelques exemplaires. — Var. *bilun-natus* Ws. 2 exemplaires.
- Adonia variegata* Goeze. — Commune, Dordogne. — Très commune, Alby (type et variétés par défaut). — Variété *corsica* Coch., 2 exemplaires (champ de tir). — Var. *maculigera* Ws., 5 ou 6 exemplaires.
- Adalia oblitterata* L. — Dordogne, 2 exemplaires sur un pin.
— *bipunctata* L. et variétés. — Très commune partout.
- Adalia 11-notata* Schneid. — Soulac. — Alby, très commune sur les chardons et les graminées (type et var. *cardui* Brahm., cette dernière plus commune).
- Coccinella 7-punctata* L. — Très commune partout.
— *labilis* Muls. — 1 exemplaire, Bordeaux.
- Coccinella 11-punctata* L. — La Teste, en grand nombre sur les Tamaris; quelques exemplaires à taches antérieures ou postérieures réunies (var *longula* et *tamaricis*). Un seul exemplaire à tache blanche du corselet prolongée jusque dans les angles postérieurs (*aegyptiaca*? Reiche). — Var. *4 maculata* F. et *littoralis*, étang de Veudres, entre les joncs et au vol.
- Coccinella 10-punctata* L. et var. — Dordogne. — Commune sur les noisetiers.
- Coccinella 14-pustulata* L. — Très commune sur les genévriers (Dordogne), un ou deux exemplaires avec deux taches réunies.

- Harmonia lyncea* Ol. — Dordogne, assez rare et seulement la var. *12 pustulata* F.
— Var. *Weisei* Sicard (var. nov.) (1), 1 exemplaire.
- Harmonia Doublieri* Muls. — Très commune. La Teste, sur les tamaris, avec quelques types de la var. *gaditana* Weise.
- Harmonia 4-punctata* Pont. — Meudon (étang de Fouceaux), sur les haies.
- Micraspis* var. *16-punctata* L. — Commune, Dordogne. — Var. *flavidula* Wse., 1 exemplaire.
- Thea 22-punctata* L. — Sur les plantes basses, commune, mais moins que la précédente.
- Propylea conglobata* L. et var. — Commune, Dordogne.
- Vibidia 12-guttata* Poda. — Très commune sur les noisetiers (Dordogne), et var. *hispanica* Wse., 2 exemplaires. — Var. *Tarnensis* Sicard (var. nova) (2), Arfons, montagnes noires.
- Halysia 16-guttata* L. — Bordeaux, assez commune; Dordogne, rare.
- Calvia 15-guttata* F. — Bordeaux, assez commune.
- Calvia 14-guttata* L. — Plus rare que la précédente.
- Sospita 20-guttata* L. — (Var. *Linnei* et var. *tigrina*, cette dernière plus rare), Pessac près Bordeaux.
- Mysia oblongoguttata* L. — La Teste, sur les pins. — Forêt de Fontainebleau, commune.
- Epilachna Argus* Fourcr. — Alby, très commune sur le Bryone. — Var. *Bedeli* Sicard (var. nova) (3), Tarn.
- Lasia 24-punctata* L. et var. — Marais de Bordeaux, commune. — Dordogne, assez rare.
- Platynaspis villosa* Fourcr. — Bègles, commune sur les écorces de platanes.
- Scymnus frontalis* F. et var. *4-pustulatus*. — Dordogne, commun.
— *interruptus* Goeze. — Commun, Dordogne, Tarn, etc.
- Scymnus subvillosus* Goeze. — Commun dans la Dordogne, sur les genévriers, avec la variété *Juniperi* et *aurantiacus* Panz.
- Scymnus rubromaculatus* Goeze. — Commun sur les rosiers, Dordogne.
— *pulchellus* Hbst. — Très commun sur le lierre autour des vieux chênes.
- Scymnus arcuatus* Rossi. — Alby. Sur un grenadier dans un jardin, 2 exemplaires dont l'un laisse à peine apercevoir, sur les élytres, un arc de cercle plus clair.
- Scymnus discoideus* Illig. — Assez commun sur des rosiers, Dordogne.
— *capitatus* E. — Commun, Dordogne.
— *ater* Kug. — Montagnes noires, 1 exemplaire.
— *minimus* Rossi. — Assez commun, Dordogne.
— *hæmorrhoidalis* Herbst. — Assez rare, Tarn, Dordogne.
- Rhyzobius litura* F. — Commun partout, en fauchant, ainsi que ses variétés.
- Coccidulla scutellata* Herbst. — Marais de Bordeaux, commune. — Bassin du Jardin des Plantes, sur les herbes aquatiques, Bordeaux.
- Coccidulla rufa* Herbst. — Très commune dans les prairies humides. — En hiver, au pied des poteaux enfoncés dans les prés, Bègles.

D^r A. SICARD.

(1) *Harmonia lyncea* v. *Weisei* Sicard. — Semblable au type dont elle diffère par la fusion des deux taches juxtasurales moyennes (4 à 6). — Je suis heureux de dédier cette espèce à M. J. Weise, qui a revu la plupart de mes *Coccinellidæ*, m'a signalé des formes nouvelles et m'a enrichi d'espèces précieuses.

(2) *Vibidia 12 guttata* v. *tarnensis* Sicard. — Prothorax flave très largement sur

les bords. Élytres sans taches blanches, un peu plus pâles seulement à la place que devrait occuper la tache juxtascutellaire. Le pli transversal qui existe au niveau de la déclivité des élytres est ici très accusé.

(3) *Epitachna argus* var. *Bedeli* Sicard. — Variété par défaut, qui diffère du type par l'absence des deux points postérieurs. Je dédie cette variété à M. Bedel, qui a bien voulu me déterminer un grand nombre d'insectes. Je dois faire remarquer ici que, bien que dans le tableau de M. Weise cette espèce soit portée comme ayant le corselet unicolor, elle présente souvent sur les côtés de celui-ci une tache enfumée.

LE TAMIS A INSECTES

SON UTILITÉ POUR LA RECHERCHE DES INSECTES (SURTOUT COLÉOPTÈRES) ET DE SES EMPLOIS

Par EDM. REITTER

(Traduit de l'allemand par C.-E. LEPRIEUR)

— SUITE —

La tentative que je fis en juin 1876 pour trouver cet insecte au pied des mêmes chênes, et de la même manière, fut sans résultat parce que l'époque favorable était déjà passée. Le tamisage de la mousse desséchée, qui renfermait une grande quantité de *Plinus subpilosus* ne me donna pas davantage le résultat que je désirais. Ce fut seulement après avoir brisé en morceaux l'écorce vieille et noueuse en partie détachée du tronc, opération qui se faisait naturellement au-dessus du tamis, que je me trouvai en possession d'un *Pleganophorus* femelle, qui fut, du reste, le dernier exemplaire de cette espèce fourni par la localité. Il m'est arrivé, vers le milieu d'avril 1880, de prendre à Trieste, dans une localité tout à fait analogue, quelques *Triplax tergestana* n. op. au pied de vieux chênes, que je n'ai plus retrouvé depuis. Après tout ce que je viens de dire on doit tirer cette conclusion que pour le chasseur expérimenté il ne suffit pas de fouiller avec le ciseau ou l'écorçoir à l'entour des troncs d'arbres et de jeter immédiatement dans les flacons de chasse les insectes qu'on aperçoit. On ne prendra jamais ainsi qu'une très petite portion de ceux qui vivent dans ce point, tandis que quelques moments de plus consacrés au tamisage auraient fourni un butin plus abondant.

Les copeaux qui se rencontrent souvent dans les bois, sur le terrain d'anciennes coupes ou qui se décomposent sur les points où on avait construit des cahutes, méritent toujours une recherche et on doit les frapper très fortement au-dessus du tamis jusqu'à faire tomber la terre qui les recouvre. Dans les débris tamisés, on trouve souvent des *Anommatus*, *Trichophya*, *Homalota*, etc., en nombre. Même le fumier qu'on rencontre sous les arbres à la lisière des bois, là où les poules domestiques ont pris l'habitude de passer la nuit, fournit pour le tamisage de bonnes espèces d'*Aleochara*, *Microglossa* et autres *Staphyliniens*. Rencontre-t-on sous les pierres de ces nids de fourmis où se trouvent des *Claviger*, des *Hetaerius* ou *Catopomorphus*, il faut bien se garder de poursuivre les myrmécophiles un à un. Si on a son tamis près de

OUVRAGES A VENDRE au Bureau du journal :

JACQUELIN du VAL et FERMAIRE (<i>Genera des Coléoptères d'Europe</i>), 4 vol. avec pl. col., reliure toile. Tout neuf.	
<i>Annales de la Soc. Ent. de France.</i> — Années 1873 à 1876 inclus.....	32 fr.
— — — 1877 à 1882 —	48
— — — 1882 à 1884 —	24
FOUDRAS (<i>Alticides</i>), 1 vol. in-8°, 384 p.	5
MULSAN (<i>Scuticolles et Securipalpes</i>), 1 vol. in-8°.....	5
LACORDAIRE (Th.). (<i>Suites à Buffon. Introduction à l'étude de l'entomologie</i>). Paris, 1873. 2 vol. in-8°, fig. col.....	8
CHAPUIS (<i>Monographie des Platypides</i>).....	6
DEJEAN (<i>Catalogue</i>) 1 ^{re} éd.	2
— — — 3 ^e éd.	4

Nous prions nos Abonnés qui auraient des Livres à vendre de vouloir bien nous en donner connaissance.

H.-P. DUURLOO

A VALBY, près COPENHAGUE (Danemark)

Offre : 1° COLÉOPTÈRES DE LAPONIE (68° de latitude nord), *Leptura virens*, 0^f,25; *Leptura strigilata*, 0^f,50; — *Pachyta Lamed*, 2^f; *Amara alpina*, 0^f,20; *Pterostichus vitreus*, 0^f,30; *Agabus arcticus*, 0^f,25; *Agabus sp.?*, 0^f,20; *Graphoderes piciventris*, 1^f; *Otiorhynchus maurus*, 0^f,10; *Aphodius sp.?*, 0^f,10.

2° COLÉOPTÈRES DU DANEMARK : *Bradycellus pubescens*, 0^f,05; *Bradycellus cognatus*, 0^f,30; *Amara convexiusculus*, 0^f,15; *Berosus spinosus*, 0^f,10; *Ochthebius marinus*, 0^f,05.

A VENDRE A BAS PRIX PLUSIEURS LOTS DE COLÉOPTÈRES :

Du Danemark, 200 exempl. (50 esp.) non préparées et indéterminées, prix..	5 fr.
De Laponie, 100 exempl. (30 espèces) — — —	10 fr.

Dans chaque lot il se trouve des espèces très rares.

PORT ET EMBALLAGE GRATIS CONTRE MANDAT-POSTE

USTENSILES NÉCESSAIRES A L'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES

HENRI GUYON

Fournisseur du Museum d'Histoire naturelle de Paris

FABRICATION SPÉCIALE DE BOITES POUR COLLECTIONS D'INSECTES

Grand format vitré, 39-26-6.....	2 ^f 50	Grand format carton, 30-26-6....	2 ^f »
Petit format vitré, 26-19½-6.....	1 85	Petit format carton, 26-19½-6....	1 50
Boîtes doubles de 26 × 19½ × 9½.....		2 ^f 50	

Toutes ces boîtes sont de fabrication supérieure défiant toute concurrence.

MEUBLES & CASIERS pour COLLECTIONS, OUTILLAGE de CHASSE, OPTIQUE, etc.
 CARTONNAGES SPÉCIAUX, BOITES ET CARTONS POUR HERBIERS, ETC.

Rue des Bourdonnais, 20 — PARIS

MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

ALFRED GUILLOT

NATURALISTE

4, Place St-Michel, PARIS

ZOOLOGIE, ENTOMOLOGIE GÉNÉRALE

Grand Choix de COLÉOPTÈRES et LÉPIDOPTÈRES européens et exotiques

LÉPIDOPTÈRES DE CHINE

ARRIVAGE D'OCTOBRE — PREMIÈRE LISTE

<i>Leucophasia Gigantea</i> ♂.....	3 75	<i>Argynnis Niphe</i> ♂.....	1 25
— — ♀.....	6 »	— — ♀.....	2 »
<i>Terias Hecabe</i> ♂.....	» 70	— <i>Ella</i>	2 50
— — ♀.....	1 »	<i>Acraea Vesta</i>	1 25
<i>Thecla Bieti</i> ♂.....	3 »	<i>Lethe Maackii</i> ♂.....	2 »
<i>Lycaena Altroguttata</i> ♂.....	4 25	— — ♀.....	3 75
— — ♀.....	6 25	— <i>Syrceis</i>	5 »
<i>Athyma Jina</i>	5 »	<i>Melanitis Asura</i> ♂.....	1 25
— <i>Alwina</i>	7 »	— — ♀.....	3 »
— <i>Fortuna</i>	3 »	<i>Callerebia Polyphemus</i>	2 »
— <i>Opalina</i>	2 50	— — (grand)....	3 »
<i>Neptis Eurynome</i>	1 25	— <i>Pratorum</i>	5 »
— <i>Prycri</i>	1 50	<i>Aulocera Padona</i>	3 »
— <i>Soma</i>	1 25	<i>Melanargia Monlana</i>	2 50
— <i>Thisbe</i>	1 25	— <i>Halimede</i>	2 »
<i>Limenitis Helmanni</i>	2 25	<i>Lasiommata Dumicola</i>	6 25
<i>Precis Iphita</i>	» 75	— <i>Epimenides</i>	3 »
<i>Junonia Orithya</i>	1 25	<i>Pararge Procusta</i> ♂.....	6 25
<i>Vanessa Urticae</i> , var.....	1 50	— — ♀.....	9 25
— <i>Charonia</i>	2 »	<i>Satyrus Arvensis</i>	5 »
— <i>Indica</i>	2 »	— <i>Episcopalis</i>	5 »
<i>Araschnia Prorsoides</i>	3 »	— <i>Thibetanus</i> ♂.....	3 »
<i>Melitaea Athalia</i> , var.....	2 »	— — ♀.....	6 25
<i>Argynnis Paphia</i> ♂, var.....	1 25	<i>Epinephele Bieti</i>	3 75
— — ♀, var.....	2 50	<i>Hesperia Abax</i>	2 25
— <i>Sagana</i> ♂.....	1 25	<i>Plesioneura Bifasciata</i>	2 »
— — ♀.....	3 »	— <i>Sinica</i>	2 »
— <i>Nerippe</i>	2 25	— <i>Maculosa</i>	2 »
— <i>Laodice</i>	2 »	— <i>Subhyalina</i> , var. <i>Thibetanus</i>	1 50
— <i>Childreni</i>	3 »	— <i>Ochracca</i>	2 »