

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Кокуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ †

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev †, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky,
N. Shiriajev et T. Tshitsherin †

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie.

IX.

1909.



С.-Петербургъ — St-Pétersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Изд. п., 7 рота, 26).

1910.

216056

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНИЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Конуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичериномъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

подъ редакціей
Н. Я. Кузнецова.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky,
N. Shiriajev et T. Tshitsherin †

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie

sous la rédaction de
N. J. Kusnezov.

1909.

T. IX. №№ 1 и 2.



С.-Петербургъ — St-Pétersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Изм. п., 7 рота, 26).

1909.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА:

Извлечение изъ протоколовъ общихъ собраний Русскаго Энтомологическаго Общества за 1909 г. 1

ОРГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ¹⁾:

- * В. Е. Яковлевъ, Описание нового вида рода *Sphincteridae* (Coleoptera, Buprestidae). (Посмертный трудъ) 1
- Г. Блекеръ, Ревизія фауны Macrolepidoptera Олонецкой губерніи 3
- Е. Ильинъ, Къ познанію фауны прямокрылыхъ области Войска Донского 14
- * Андрей Семеновъ-Тянъ-Шанскій Колеоптерологическая замѣтка, XV. 24
- А. В. Журавской, Къ перевоплощеннѣ руковоющихъ положений сравнительной биологической географии. (Полярные предѣлы) 35
- Ф. А. Зайцевъ, Нѣсколько фенологическихъ наблюдений наль водными жуками и описание нового вида р. *Hydroporus Clairv.* изъ Новгородской губ. (Coleoptera, Dytiscidae) 57
- Л. Круликовскій, Къ свѣдѣнію о фаунѣ чешуекрылыхъ Вологодской губерніи. 65
- * Г. Л. Суворонъ, Описание новыхъ видовъ рода *Neodorecadium* G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae) 80
- * Г. Л. Суворонъ, Описание одного нового вида подрода *Compsodorecadium* G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae) 93
- В. В. Баровскій, Три новыхъ вида *Lithophilus Frhl.* изъ азиатской Россіи (Coleoptera, Coccinellidae) 96
- Д. А. Смирновъ, Образъ жизни и превращенія некоторыхъ видовъ рода *Rhinoncus Sch.* (Coleoptera, Curculionidae), съ описаніемъ нѣсколькихъ новыхъ фазъ. (Съ 4 рис.) 100
- Л. Круликовскій, Мелкая лепидоптерологическая замѣтка. XI. 109
- * Оскаръ Іонъ, Подраздѣленіе рода *Palpangula Stg r.* (Lepidoptera, Noctuidae) на новые роды. (Съ 24 рис.) 115
- * В. Кизерницкій, Новый видъ рода *Thanatophilus Leach* (Coleoptera, Silphidae) 126
- * В. Болдыревъ, Къ образу жизни *Potosia incerta Costa* subsp. *boldyrevi* Jacobson. (Coleoptera, Scarabaeidae) 128
- К. М. Дерюгинъ, Замѣтка о массовомъ появленіи въ сѣверной Лапландіи пяденицы *Larentia dilutata* B k h. var. *sandbergi* Lampra (Lepidoptera, Geometridae) 136
- Г. Гаддъ, Къ сравнительной анатоміи цикадъ. I. Слюноотдѣлительный аппаратъ. (Съ 2 рис.) 138
- * Оскаръ Іонъ, *Callogonia* или *Telessilla virgo?* (Lepidoptera, Noctuidae). (Съ 1 табл.) 144

(Продолженіе см. на 3 стр. обложки).

BULLETIN ENTOMOLOGIQUE:

Comptes-Rendus des s閙ances de la Soci t  Entomologique de Russie en 1909. 1

MATERIAUX SCIENTIFIQUES¹⁾:

B. E. Jakovlev, Description d'une nouvelle esp ce du genre *Sphincteridae* (Coleoptera, Buprestidae). (Œuvre posthume) 1

* H. Bl cker, Revision de la faune des Macrol『pidopt『res du gouvernement d'Olonet. 3

* E. Pylnov, Contributions 『 l'『tude de la faune des Orthopteres de la province des Cosaques du Don. 14

Andreas Semenov - Tian-Shansky, Analecta coleopterologica. XV. 24

A. V. Zhuravsky, Essai d'une critique des principes de la g『ographie biologique compar『e. (Limites polaires) 35

* Ph. A. Zaitzev, Quelques observations ph『nologiques sur les coleopt『res aquatiques et description d'une esp ce nouvelle du genre *Hydroporus* Clairv. provenant du gouvernement de Novgorod (Coleoptera, Dytiscidae) 57

* L. Krulikovsky, Contributions 『 la faune lepidopt『rologique du gouvernement de Vologda. 65

G. L. Suvorov, Beschreibung neuer Arten der Gattung *Neodorecadium* G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae) 80

G. L. Suvorov, Beschreibung einer neuen Art der UnterGattung *Compsodorecadium* G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae) 93

* V. V. Barovsky, Trois esp ces nouvelles du genre *Lithophilus Frhl.* de la Russie d'Asie (Coleoptera, Coccinellidae) 96

* D. A. Smirnov, La vie et les m『tamorphoses de quelques esp ces du genre *Rhinoncus Sch.* (Coleoptera, Curculionidae), avec description de quelques phases nouvelles. (Avec 4 fig.) 100

* L. Krulikovsky, Petites notices lepidopt『rologiques, XI. 109

Oscar John, A generic subdivision of the genus *Palpangula Stg r.* (Lepidoptera, Noctuidae). (With 24 figures) 115

V. Kieseritzky, Species nova generis *Thanatophilus Leach* (Coleoptera, Silphidae) 126

V. Boldyrev, Zur Lebensweise von *Potosia incerta Costa* subsp. *boldyrevi* Jacobson. (Coleoptera, Scarabaeidae) 128

* K. M. Derjugin, Notice sur l'apparition en masse de la *Larentia dilutata* B k h. var. *sandbergi* Lampra dans la Laponie du Nord (Lepidoptera, Geometridae) 136

* G. Gadd, Contributions 『 l'anatomie compar『e des cigales. I. Appareil salivaire. (Avec 2 fig.) 138

Oscar John, *Callogonia* or *Telessilla virgo?* (Lepidoptera, Noctuidae). (With plate I) 144

(Voir p. 3 de la couverture).

¹⁾ Les titres traduits sont marqu『s d'un asterisque.

А. А. Мейнгардтъ, Къ вопросу о географическомъ распространениі *Argynnis eugenii* E v. (Lepidoptera, Nymphalidae) и времени ея лета 148

А. А. Мейнгардтъ, Къ фаунѣ чешуекрылыхъ Сибири 150

В. В. Баровскій, Энтомологический экскурсій въ Ново-Ладожскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губерніи лѣтомъ 1908 года 153

* **В. Караваевъ**, Описание солдата и рабочихъ *Hodotermes (Anacanthotermes) ahugeriensis* Jacobson, въ юго-западной части постройкахъ средне-азиатскихъ термитовъ (Isoptera). (Съ 3 рис.). 157

* **J. D. Alfken**, Два туркестанскихъ вида рода *Prosopis* (Hymenoptera, Prosopidae). 163

В. Лучникъ, Новые формы трибы *Carabina* (Coleoptera, Carabidae) 166

КРИТИКО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДѢЛЬ:

Insecta	169
Coleoptera	172
Lepidoptera	180
Diptera	186
Hemiptera	195
Neuroptera	203

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТИЯ:

Двѣнадцатый Съездъ Русскихъ Естествопытателей и Врачей въ Москвѣ 205

Первый Международный Энтомологический Конгрессъ въ Брюссель 1910 г. 206

В. Лучникъ, Списокъ новыхъ для Ставропольской губерніи видовъ *Cicindelidae* и *Carabidae* 208

В. Лучникъ, Списокъ прямокрылыхъ, новыхъ для сѣверо-западного Кавказа 209

Г. А. Кожениниковъ, Вопросъ о роли покоса въ жизни насѣко-мыхъ 210

Дни Собраний Общества въ 1909 г.

По понедѣльникамъ:

12 и 26 января, 6 апрѣля, 12 октября, 9 февраля, 4 мая, 2 и 16 ноября, 2 и 16 марта, 28 сентябрь, 7 и 21 декабря.

Собрания происходятъ въ залѣ Общества, въ домѣ б. Министерства Землемѣдія и Государственныхъ Имуществъ, у Сплюшаго моста.

Секретарь находится въ помѣщеніи Общества по п/янялица съ 2 час. лѣтъ 5 час. пополудни и по понѣдельникамъ вечеромъ съ 7 до 10 ч., кромеѣ праздниковъ и канунъ ярмарочного времени (съ 15 мая по 15 сентября).

Составъ Совѣта Общества въ 1909 г.

Президентъ: Петър Петровичъ Семеновъ-Тянъ-Шанскій.—Вас. Остр., 8 линія, д. 39.

Вице-Президентъ: Андрѣй Петровичъ Семеновъ-Тянъ-Шанскій.—Вас. Остр., 8 линія, д. 39, кв. 3.

Секретарь: Георгій Георгіевичъ Якобсонъ.

Помощникъ секретаря:

Оскаръ Ивановичъ Іонъ.

Консерваторъ: Алексѣй

Георгіевичъ Якобсонъ.

Кассиръ: Викторъ Викто-

ровичъ Мазаракій.

Ббліотекарь: Песь Мар-

тиновичъ Вольманъ.

Редакторъ: Николай Яков-

евичъ Кузнецковъ.

Въ помѣщеніи Общества, въ домѣ б. Министерства Землемѣдія и Государственныхъ Имуществъ, у Сплюшаго моста.

* **A. A. Meinhardt**, Sur la distribution g ographique de l'*Argynnis eugenii* E v. (Lepidoptera, Nymphalidae) et la date de son apparition. 148

* **A. A. Meinhardt**, Contributions   la faune l pidopt rologique de la Sib rie 150

* **V. V. Barovsky**, Excursions entomologiques dans le district de Novaja Ladoga du gouvernement de St-P tersbourg pendant l' t  de 1908. 153

* **W. Karawajew**, Soldaten und Arbeiter von *Hodotermes (Anacanthotermes) ahugeriensis* Jacobson, nebst einigen Bemerkungen  ber die Bauten central-asiatischer Termiten (Isoptera). (Mit 3 Fig.). 157

* **J. D. Alfken**, Zwei turkestanische *Prosopis*-Arten (Hymenoptera, Prosopidae). 163

* **V. Lutshnik**, Formes nouvelles de la tribu des *Carabina* (Coleoptera, Carabidae). 166

REVUE CRITICO-BIBLIOGRAPHIQUE:

Insecta	169
Coleoptera	172
Lepidoptera	180
Diptera	186
Hemiptera	195
Neuroptera	203

NOUVELLES DIVERSES:

* Douzi me Congr s des Naturalistes et M decins Russes   Moscou 205

* Premier Congr s International d'Entomologie de 1910   Bruxelles 206

* **V. Lutshnik**, Liste des esp ces des *Cicindelidae* et des *Carabidae* nouvelles pour la faune du gouvernement de Stavropol 208

* **V. Lutshnik**, Liste des Orthopt res nouveaux pour la faune du nord-ouest du Caucase 209

* **G. A. Kozhevnikov**, Sur le r le de la fenaison dans la vie des insectes. 210

S ances de la Soci t  en 1909.

Les lundis.

25 janvier. 19 avril. 15 et 29 novembre.
8 et 22 f vrier. 17 mai. 20 d cembre.
15 et 29 mars. 11 et 25 oct. 3 janvier 1910.

Les s ances ont lieu   huit heures du soir dans la salle de Soci t , au palais du Minist re de l'Agriculture et des Domaines.

Le Secr taire se trouve au bureau de la Soci t  chaque vendredi de 2   5 heures et chaque lundi de 7   10 heures du soir, except  les jours de f tes et les trois mois de l' t .

Membres du Bureau pour l'ann e 1909.

Pr sident: Mr. P. Semenov-Tian-Shansky.—Vassily Ostrov, 8-e ligne, 39.

Vice-Pr sident: Mr. A. Semenov-Tian-Shansky.—Vassily Ostrov, 8-e ligne, 39.

Secr taire: Mr. G. Jacobson.

Secr taire-adjoint: Mr. O. John.

Conserveur: Mr. A. Jacobson.

Tr sorier: Mr. V. Mazarak .

Biblioth caire: Mr. L. Wollmann.

R dacteur: Mr. N. Kuznetsov.

Au bureau de la Soci t , au palais du Minist re de l'Agriculture et des Domaines, pres du Pont Bleu.

В. В. Баровский (С.-Петербург).

Три новыхъ вида *Lithophilus* Frhl. изъ азиатской Россіи
(Coleoptera, Coccinellidae).

Lithophilus jacobsoni, sp. n.

Minimus, oblongus, perangustus, totus brunneus vel brunneofulvus (oculis nigris exceptis), pilis griseo-flavis obtectus. Caput corpore vix obscurius, sat dense punctulatum, pilis brevibus ac sat longis flavis obtectum; palpis in specimibus examinatis nonnullis apicem versus obscurioribus. Pronotum planum, transversum, elytris distinete angustius, valde cordiforme, margine laterali ipso crassiusculo reflexoque, angulis posticis fere rectangularibus, crenate (lateribus adeo crenatis) punctulatum, tibrido pilosum, basi elytrorum basi nonnihil angustius. Elytra basi ad humeros rotundata, dein parallelia, lateribus late reflexis, postice obtuse rotundata; dorso parum convexo seriebus parallelis longitudinalibus distinete explicatis punctorum fortiorum pilos majores anreolos gerentium; interspatiis punctorum magnitudine punctis ipsis aequalibus; intersticiis haud dense punctulatis, haud rugulosis. — Long. 2 mm.

A speciebus jam cognitis magnitudine parva seriebusque regularibus ac parallelis distinctis punctorum piligerorum elytrorum mox distinguendus.

Specimina sex: quinque a G. Jacobson, cui species dedicata, 9. V. 1903 inter Mulla-Vulgan et Ilbe-Kijbak in Golodnaja Stepj prope limitem Kisilkumorum (districtus Dzhizakensis prov. Marakandicae) ad radices *Artemisiae* eiusdem fruticosae odoratissimaeque inventa; unum a G. Rybakov in Turkestan capta.

Очень маленький, продолговатый, узкий, весь бурый или буро-желтый (за исключениемъ черныхъ глазъ), покрытый мелкими сброжелтыми волосками. Голова несколько темнѣе тѣла (но очень незначительно), довольно густо пунктирована и покрыта вперемѣнику желтыми короткими и довольно длинными волосками, у некоторыхъ изъ разсмотрѣнныхъ экземпляровъ щупики къ концу затемнены.

Переднеспинка плоская, по ширине попечечная, яено уже надкрыльй, сильно сердцевидная съ утолщеннымъ боковымъ краемъ и почти прямымъ заднимъ углами, густо пунктирована (къ бокамъ гуще) и покрыта желтоватыми волосками: основаніе переднеспинки нѣсколько уже основанія надкрыльй, которые отъ основанія по плечамъ закруглены. Надкрылья параллельны, кзади тупо закруглены, съ яено выраженнымъ правильными параллельными рядами крупныхъ точекъ съ болѣе грубыми и длинными золотистыми волосками; разстоянія между точками равны самимъ точкамъ, промежутки между которыми мелко, но не густо пунктированы и не шагренированы (морщинисты).— Длина 2 мм.

Легко отличается отъ известныхъ уже видовъ своей небольшой величиной (2 мм.) и яено выраженнымъ правильными параллельными рядами крупныхъ точекъ на надкрыльяхъ съ длинными лежачими золотистыми волосками.

6 экземпляровъ: 5 найденныхъ 9. V. 1903 на корняхъ сильно пахучей полыни въ Голодной Степи между Мулла-Вульганъ и Ильбек-Кубакъ, Джизакскаго уѣзда Г. Г. Якобсономъ, въ честь которого я предлагаю назвать этотъ видъ, и одинъ Г. Г. Рыбаковъмъ въ Туркестанѣ (болѣе подробнаго мѣстонахожденія, къ сожалѣнію, не указано).

Lithophilus semenovi, sp. n.

Breviter-ovalis, flavo-rufus (scutello oculisque exceptis), sternitis abdominalibus rufis; densissime minutissimeque griseo-flavo-pilosus. Caput rufum, cerebre punctulatum, pilis flavis antrorsum introrsumque declinatis obtectum. Pronotum cordiforme, lateribus explanatis, margine incrassato, elytris multo (fere in $1\frac{1}{2}$) angustius, punctis medioeribus dense tectum, griseo-flavo pilosum, basi elytrorum basi vix angustius. Elytra ad humeros rotundata, dorso densissime (ut in *L. krasnori* Sem. ¹), sed nonnihil fortius) uniformiter tenuiterque punctulata et dense (ut in *cibratello* Fairm. ²), sed minutissime) pilis parvulis griseo-flavis obtectum. Forma corporis *L. ovipenne* Crotch ³), coloratio *L. cordicollis* Ritter ⁴ in mentem vocat. sed magis ovalis, basi elytrorum rotundata (ut in *unicolor* Ritter ⁵), pronoto angustiore, punctura pilositateque brevi uniformi elytrorum facile distinguitur. Long. ♂ 3,2, ♀ 3,8 mm.

Transeaspia: Duz-olum (C. A. H. g e r! 25. XI. 02), 2 expl. in collectione Musei Zoologiei Academiae Scientiarum Petropolitanae. Investigatori illustrissimo faunae Rossicae coleopterorum А. Р. Семенову-Tian-Shansky dedico.

¹⁾ Semenov, A. Diagnoses coleopterorum novorum ex Asia centrali et orientali. III. Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1890, pp. 381, 382.

²⁾ Fairmaire. Ann. Soc. Ent. France, 1880, p. 32.

³⁾ Crotch. Rev. Coccinell., p. 302.

⁴⁾ Reitter, Edm. Uebersicht der bekannten *Lithophilus*-Arten. Deutsch. Ent. Zeitschr., XXVII, 1883, pp. 61—64.

⁵⁾ Ibid., p. 64.

Коротко-овальный, весь желто-рыжий, за исключениемъ глазъ и щитика; брюшные сегменты рыже-красные; сверху очень густо покрытъ очень мелкими сѣровато-желтыми волосками. Голова рыжая, густо пунктирована и покрыта желтыми волосками, направленными къ срединѣ и впередь. Переднеспинка сердцевидная съ утолщеннымъ боковыми краями, значительно уже надкрыльй (почти въ 1½ раза), довольно густо пунктирована и покрыта сѣро-желтыми волосками, у основанія едва уже основанія надкрыльй, которые у иллечай совершенно закруглены, густо (гуще чѣмъ у *krasnovi* Sem.) однородно мелко-пунктированы и густо (какъ у *cribratellus* Fairm., но гораздо мельче и короче) покрыты короткими сѣровато-желтыми волосками. Формою тѣла напоминаетъ *L. ovirennis* Сротен., общимъ видомъ и окраской *L. cordicollis* Ritter, но легко отличается отъ нихъ гораздо болѣе яйцевидной формой, совершенно закругленными основаніями надкрыльй (какъ у *anicolor* Ritter), причемъ основанія ихъ не шире основанія переднеспинки, какъ это замѣтио у *L. ovirennis* Сротен. и *cordicollis* Ritter, болѣе узкой переднеспинкой, пунктирковой и однотонной мелкой волосистостью надкрыльй.

Длина ♂ 3,2; ♀ 3,8 мм.

Закаспийская область Дузъ-олумъ. К. Анигеръ. 25. XI. 02, 2 экз. ♂ и ♀ въ коллекціи Зоологического Музея Имп. Академіи Наукъ.

Lithophilus roddi, sp. n.

Oblongo-ovalis. Palpi, os, antennae, pronotum pedesque flavo-rufa; caput paginaque corporis inferna piceo nigra; pectus nigrum; ab-domen apice pallidius; elytra nigra, coeruleo resplendentia, apice vix perspicue flavo limbata. Pronotum antice fere recte truncatum, medio haud sinuatum (ut in *L. connato* Panz. ⁶⁾ et *taurico* Sem. ⁷⁾), angulis anticis antrorsum perparum prominentibus; antrorsum angustatum, postice solum nonnihil cordiforme; uniformiter tenuiter punctulatum, longitudine maxima (in medio sita) quam basis elytrorum haud angustiore. Elytra haud parallela, postice nonnihil dilatata, basi recta, angulis humeralibus eminentibus, quam basis pronoti latiora; dorso seriebus irregularibus punetorum fortiorum distinete explicatis sed hic illie interruptis ornata (quae series in *L. jacobsoni* m. rite regulares ac parallelae sunt); interspatiis punetorum majorum inaequalibus, quam puncta ipsa nonnihil majoribus; interstitiis serierum tenuiter punctulatis, postice disperse transversim rugulosis; pilis brevibus flavidogriseis haud dense obtecta.

Long. ♂ 3,3 mm.

L. subseriatu Ritter. ⁸⁾ mihi in natura ignoto, proxime affinis, sed multo minor, capite obscuriore pronoto quam elytra haud angustiore,

⁶⁾ Panzer. Fauna Germaniae. 1797, p. 36.

⁷⁾ Semenov, A. Coleoptera nova Rossiae europaeae Caucasique. VIII. Horae Soc. Ent. Ross., XXXV, 1901, pp. 254—255.

⁸⁾ Cf. ⁴⁾, Ibid., p. 63.

forma oblongo-ovali, elytrorumque colore pilositateque nec non seriebus punctorum majorum interruptis ac irregularibus distinguitur.

Sibiria occidentalis: prov. Tomskensis, Ak-Bom in tractu Tshuieo prope limitem Mongoliae. 1 ♂ ab Eug. Rodd, 16. VI. 07, cui species dedicata, inventa et mihi liberaliter communicata.

Продолговато-овальный, щупики, роть, антёны, переднеспинка и ноги красно-желтые. Голова и нижняя часть туловища смоляно-чёрного цвета; грудь чёрная, посреди сегменты брюшка несколько светлее; надкрылья чёрные съ единимъ отпечаткомъ. Переднеспинка на вершинѣ почти прямая, безъ выемки посерединѣ, какъ у *conatus* Panz. и *tauricus* Sem., съ очень слабо выступающими впередъ передними углами, спереди сужена, кзади нѣсколько (но не сильно) сердцевидна, однородно мелко пунктирована; наибольшая ширина переднеспинки (по срединѣ) не ѿже основанія надкрыльевъ; надкрылья не параллельны, нѣсколько расширены кзади, у основанія прямые, съ выступающими плечевыми углами, шире основанія переднеспинки, съ ясно выраженнымъ прерывающимся неправильными рядами грубыхъ точекъ (у *Jacobsoni* ряды эти совершенно правильные и параллельные), не густо покрыты мелкими (не длинными) желтовато-серыми волосками; разстоянія между грубыми точками въ ихъ рядахъ неодинаковы, нѣсколько больше самихъ точекъ; промежутки между рядами мелко пунктированы, на концахъ морщинисты. — Длина ♂ 3,3 мм.

Близко стоять къ неизвѣстному мнѣ въ натурѣ *L. subseriatus* Ritter, но отличается отъ послѣдняго гораздо меньшей величиной въ 3,3 мм. (*subseriatus* 4,5 мм.), болѣе темной окраской головы, шириной переднеспинки (по отношенію къ надкрыльямъ), продолговато-овальной формой, волосистостью и цветомъ надкрыльевъ неправильными, прерванными рядами крупныхъ точекъ на нихъ.

Зап. Сибирь: Томская губ., Чуйский трактъ, Акъ-Бомъ, 16. VI. 07, Е. Г. Роддъ, въ честь котораго и называю этотъ видъ.