

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Кокуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ †

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev †, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky,
N. Shiriajev et T. Tshitsherin †

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie.

IX.

1909.



С.-Петербургъ — St-Pétersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Изд. п., 7 рота, 26).

1910.

216056

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѦНИЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Кокуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ †

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

подъ редакціей
Н. Я. Кузнецова.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev †, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky,
N. Shiriajev et T. Tshitsherin †

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie

sous la rédaction de
N. J. Kusnezov.


1909.

T. IX. № 3.



С.-Петербургъ — St-Pétersbourg.
Типо-Литографія „Герольдъ“ (Ізм. п., 7 рота, 26).

1910.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА:

Извлечение изъ протоколовъ общихъ собраний Русского Энтомологического Общества за 1909 г.	XVII
Отчетъ Совѣта Общества за 1909 г.	XXXIII
Члены-Учредители Общества	XLI
Составъ Общества къ 1 января 1910 г.	XLII
Перечень ученыхъ учрежденій въ Россіи, съ которыми Общество находится въ сношенихъ по обмѣну изданиями	LVI
Перечень иностраннѣхъ periodическихъ изданий, полученныхъ библиотекой Общества въ 1909 г.	LXII

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ¹⁾:

* А. Андреевъ-Шанский, Новые и малоизвѣстные виды <i>Chrysididae</i> (Hymenoptera). IV	213
* В. А. Караваевъ, Миrmekofилы Закаспійской области. (Съ 7 рис.)	227
Л. С. Бергъ, По поводу статьи А. В. Журавского: „Къ переносѣнію руковоляшпхъ положений сравнительной биологической географіи“	238
* И. Кокуевъ, Новые азиатскіе перепончатокрылые. IX	246
А. А. Яхонтовъ, Замѣтки по фаунѣ <i>Lepidoptera</i> средней Россіи. 249	
В. Баровскій, Новые азиатскіе виды <i>Lithophilus</i> Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae)	255
Г. Л. Суровъ, Описание нового вида подрода <i>Tennorhinus</i> Fst (Coleoptera, Curculionidae)	262
Л. Круликовскій, Замѣтки о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1909 года въ Осинскомъ уѣздѣ Пермской губ.	264
* В. Караваевъ, Добавление къ моей работе „Муравьи Закаспійской области и Гуркестана“. (Съ 3 рис.)	268

(Прот. жеје см. на 3 стр. обложки).

Les titres traduits sont marqués d'un astérisque.

SOMMAIRE.

BULLETIN ENTOMOLOGIQUE:

Comptes-Rendus des s閙ances de la Soci��t�� Entomologique de Russie en 1909	XVII
Compte-Rendu du Bureau de la Soci��t�� pour 1909	XXXIII
Liste des Membres-Fondateurs de la Soci��t��.	XLI
Liste des Membres de la Soci��t�� en 1909.	XLII
Liste des institutions en Russie, avec lesquelles la Soci��t�� fait des changes	LVI
Liste des ditions priodiques, reues par la bibliothque de la Soci��t�� en 1909	LXII

MATRIAUX SCIENTIFIQUES¹⁾:

Andreas Semenov - Tianshansky, Chrysidiadarum species novae vel parum cognitae (Hymenoptera). IV	213
W. A. Karawajew, Myrmekophilen aus Transkaspien. (Mit 7 Textfiguren)	227
* L. S. Berg, Quelques mots par rapport  l'article de Mr. A. B. Zhuravsky: „Essai d'une critique des principes de la gographie biologique compare“	238
N. Kokujev, Hymenoptera asiatica nova. IX	246
* A. A. Jachontov, Observations sur la faune des Lpidopteres de la Russie centrale	249
* V. Barovsky, Nouvelles espces asiatiques du genre <i>Lithophilus</i> Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae)	255
* G. Suvorov, Description d'une nouvelle espce du sous-genre <i>Tennorhinus</i> Fst. (Coleoptera, Curculionidae)	262
* L. Krutikovsky, Notice sur la chasse aux Lpidopteres durant l'te 1909 dans le district d'Osa, gouvernement de Perm	264
W. Karawajew, Nachtrag zu meinen „Ameisen aus Transcaspien und Turkestan“. (Mit 3 Textfiguren)	268

(Voir p. 3 de la couverture).

* P. Longin Navás, Новые

японские виды Panorpidae. (Съ 4 рис.) 273

П. Бахметьевъ, Къ вопросу о
фаунѣ чешуекрылыхъ Болгаріи 278

* Г. Л. Суворовъ, Описание
новаго вида рода *Dorecadion* Dalm.
(Coleoptera, Cerambycidae). 290

Л. Круликовскій, Новая съ-
дѣнія о чешуекрылыхъ Вятской гу-
берніи 292

* Е. Бергротъ, *Plocariodes*
B. White и *Plocariola* Reut.
(Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae) 324

В. Баровскій, Новые виды
Cantharis Linn. изъ Азиатской
России (Coleoptera, Cantharidae) 325

А. С. Скориковъ, *Bombus men-*
dax Gerst. и его варианты (Hyme-
noptera, Bombidae) 328

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕ- СКІЙ ОТДѢЛЪ:

Insecta	331
Diptera	333
Hemiptera	333
Dermatoptera	335

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТИЯ:

Некрологи:

Gustav Kraatz	341
К. Л. Брамсонъ	343
Л. Ф. Млокошевичъ	344
Н. А. Пальчевскій	344
F. A. Dohrn	345

Дни Собраний Общества въ 1910 г.

По понедѣльникамъ:

18 января.	5 апреля.	11 октября.
26 февраля.	3 мая.	1 и 15 ноября.
8 и 22 марта.	27 сентября.	13 и 20 декабря.

Собрания пропускаются въ залѣ Общества,
въ домѣ б. Министерства Землеустройства и Госу-
дарственныхъ Имуществъ, у Синего моста.

Секретарь находится въ помѣщениіи
Общества по пятницамъ съ 2 час. до 5 час.
пополудни и по понедѣльникамъ вечеромъ
съ 7 до 10 ч., кроме праздниковъ и канику-
лярного времени (съ 15 мая по 15 сентября).

Составъ Совѣта Общества въ 1909 г.

Президентъ: Петър Петрович Семеновъ-Тянъ-
Шанскій.—Вас. Остр., 8 липня, д. 39.
Вице-Президентъ: Андрей Петрович Семе-
новъ-Тянъ-Шанскій. Вас. Остр., 8 липня,
д. 39, кв. 3.

Секретарь: Георгій Геор-
гіевич Якобсонъ.
Помощникъ секретаря:
Оскаръ Иванович Іонз.
Консерваторъ: Владимирий
Владимировичъ Баров-
скій.
Кассиръ: Викторъ Викто-
ровичъ Мазаракій.
Библиотекарь: Левъ Мар-
тыновичъ Вольманъ.
Редакторъ: Филиппъ Яда-
ловичъ Зайцевъ.
Члены Совѣта: Василій
Федоровичъ Ошанинъ
и Николай Яковлевичъ
Кузнецковъ.

Въ помѣщениіи
Общества, въ
домѣ б. Мини-
стерства Земле-
устройства и Госу-
дарственныхъ
Имуществъ, у
Синего моста.

P. Longin Navás, Panorpides
nouveaux du Japon. (Avec 4 fig.) . 273

* P. Bachmetjev, Contributions
à la faune lépidoptérologique de la
Bulgarie 278

G. L. Suvorov, Beschreibung
einer neuen Art der Gattung *Dorecadion*
Dalm. (Coleoptera, Cerambycidae). 290

* L. Krulikovsky, Données nou-
velles concernant la faune des Lépi-
doptères du gouvernement de Viatka. 292

E. Bergroth, *Plocariodes* B.
White und *Plocariola* Reut.
(Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae) 324

* V. Barovsky Nouvelles espèces
du genre *Cantharis* Linn. de la Russie
asiatique (Coleoptera, Cantharidae) 325

* A. S. Skorikov, *Bombus men-*
dax Gerst. et ses variations (Hyme-
noptera, Bombidae). 328

REVUE CRITICO-BIBLIOGRAPHI- QUE:

Insecta	331
Diptera	333
Hemiptera	333
Dermatoptera	335

NOUVELLES DIVERSES:

Nécrologie:

Gustav Kraatz	341
C. L. Bramson	343
L. F. Mlakosiewicz	344
N. A. Paltschevsky	344
F. A. Dohrn	345

Séances de la Société en 1910.

Les lundis.

31 janvier.	4 et 18 avril.	14 et 28 novembre.
11 et 21 mars.	16 mai.	26 décembre.
10 et 24 oct.	2 janvier 1911.	

Les séances ont lieu à huit heures du
soir dans la salle de Société, au palais du
Ministère de l'Agriculture et des Domaines.

M. le Secrétaire se trouve au bureau de
la Société chaque vendredi de 2 à 5 heures
et chaque lundi de 7 à 10 heures du soir, ex-
cepté les jours de fêtes et les trois mois de
Pétet.

Membres du Bureau pour l'année 1909.

Président: Mr. P. Semenov-Tian-Shansky. --

Vassily Ostrov, 8-e ligne, 39

Vice-Président: Mr. A. Semenov-Tian-Shansky. --

Vassily Ostrov, 8-e ligne, 39.

Secrétaire: Mr. G. Jacob-
son.

Secrétaire-adjoint: Mr. O.
John.

Conservateur: Mr. V. Ba-
rovsky.

Trésorier: Mr. V. Maz-
raki.

Bibliothécaire: Mr. L. Woll-
mann.

Rédacteur: Mr. Ph. Zait-
zev.

Membres du Conseil: MM.
B. Oshanin et N. Kus-
neozov.

Au bureau de la
Société, au pa-
lais du Ministère
de l'Agriculture
et des Domai-
nes, près du
Pont Bleu.

В. Баровский (С.-Петербургъ).

Новые азиатские виды *Lithophilus* Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae).

Lithophilus kozlovi, sp. n.¹⁾.

L. ovipenni Crotch²⁾ similis, sed multo major. Oblongo-ovalis, convexiusculus, nitidus, pilis longis aureo-flavis vestitus, totus rubro-rufus, oculis nigris, elytris (margine angusto rufo excepto) nigro-piceis. Caput crebre punctatum pilisque aureolis sat longis vestitum; interspatiis punctorum punctis ipsis aequalibus. Pronotum transversum, fere in $\frac{1}{2}$ longitudinis ipsius latius, cordiforme, lateribus magis incrassatis, basi quam elytrorum basis multo angustius, rubro-rufum, crebre punctatum et pilis inclinatis obtectum. Elytra ovalia, convessa, in medio parallela, nigra (margine rufo excepto; angusto in lateribus, lato ante, postice, in humeris atque in apicibus, ut in *L. lato* Ritter³⁾; basi quam pronoti basis multo latiora, angulis humeralibus distincte eminentibus, crebre fenuiterque punctata; dorso seriebus irregularibus punctorum fortiorum distincte explicatis ornato pilisque aureo-flavis dense obiecta, lateribus adeo densius. Subtus obscurus, sterno, sternitisque duobus ultimis abdominis rufis exceptis.—Long. 4,75 mill.

Mongolia mer.-or.: montes Alaschan: Dyn-Juan-Tshen. 25. IV—5. V. 1908, P. Kozlov. In coll. P. P. Semenov-Tjan-Shansky.

A speciebus jam cognitis magnitudine multo majore, forma corporis, structura pronoti ejusque cum elytris proportione, punctura coloreque distingendum.

Очень похожъ на *L. ovipennis* Crotch, но значительно больше его. Продолговато-ovalный, квадратнѣйшій, блестящій,

1) Viatori illustrissimo P. Kozlov grato animo dedicata.

2) Crotch, G. R. A Revision of the Coleopterous Family Coccinellidae London, 1878, pp. 301—302.

3) Reitter, Edm. Neue Coleopteren aus Syrien und Marocco. Deutsch. Ent. Zeitschr., XXVIII, 1884, pp. 151—152.

покрытый длинными золотисто-желтыми волосками; весь красно-рыжий, глаза и надкрылья за исключением желтого рантка черные. Голова грубо пунктирована и покрыта золотистыми довольно длинными волосками: разстояния между точками равны самим точкамъ. Переднеспинка поперечная, въ полтора раза шире своей длины; красно-желтая, сердцевидная съ сильными утолщениами по бокамъ, ея основание значительно уже основания надкрыльй: грубо пунктирована и покрыта стоячими, несколько наклоненными волосками; волоски эти гуще по бокамъ: разстояния между точками значительно большие самихъ точекъ. Надкрылья яйцевидныя, выпуклые, въ средней своей части параллельныя, черные за исключением узкаго желтаго рантка (впереди и позади надкрыльй эта полоска нѣсколько шире, а также на плечахъ и концахъ надкрыльй, напоминая окраску надкрыльй у *L. latus* Ritter), въ основании значительно шире основания переднеспинки, съ ясно-выступающими въ бока плечевыми углами, густо и мелко пунктированы, съ неправильными рядами краинныхъ точекъ; густо покрыты золотисто-желтыми волосками, къ бокамъ гуще. Снизу темный, за исключениемъ головы, груди и двухъ послѣднихъ брюшныхъ сегментовъ, которые желтые. — Дл. 4,75 мм.

Алашань: Цынь-Юань-Чэнъ, взять 25. IV—5. V. 1908 нашимъ извѣстнымъ путешественникомъ Петромъ Кузьмичемъ Козловымъ, въ честь которого и называю этотъ видъ (I экз. въ колл. П. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

Отъ извѣстныхъ уже видовъ отличается своей большей величиною, формою переднеспинки, ея отношенiemъ къ надкрыльямъ, пунктировкой и цветомъ надкрыльй.

Lithophilus pellucidus, sp. n.

L. semenovi m.⁴⁾ proximus, sed minor, *pellucidus*. Ovalis, convexus, totus rufo-testaceus (oculis nigris, capite sentelloque rufis exceptis), dense minutissimeque aureolo-pilosus. Caput rufum, cerebro punctatum, interspatiis punctorum punctis ipsis aequalibus minutissime punctulatis, pilis brevibus aureolis obtectum. Pronotum transversum, valde cordiforme lateribus anguste explanatis, margine incrassato, elytris multo (fere in 1¹/2) angustius, dense punctulatum, interspatiis punctorum quam puncta ipsa majoribus et minutissime punctulatis, aureolo-pilosum: basi quam elytrorum basis nonnihil angustius. Elytra ad humeros rotundata, dorso densissime tenuiterque punctata cum seriebus irregularibus punctorum fortiorum distincte explicatis: ad apicem rugulosis et minutissime sat dense aureolo-pilosa.—Long. 2,5 mm.

Persia or.-mer.: Kerman, Mekran: specimen unicum 9. III. 01 N. Zarudny leg. (coll. cl. P. P. Semenov-Tjan-Shansky).

A speciebus jam cognitis pellucientia, magnitudine puncturaque

4) Варовский, В. Trois espèces nouvelles du genre *Lithophilus* Frhl. de la Russie d'Asie. Rev. Russ. Ent., IX, 1909, p. 97.

facile distinguitur; а *L. unicolor* Ritter⁵⁾, e Siberia, cui proximus, forma corporis, colore pilorum rugositateque apicem elytrorum etc.

Близко стоять къ *L. semenovi* m., но маленький, прозрачный. Овальный, выуклый, блѣдо-желтый за исключениемъ черныхъ глазъ и желтыхъ головы и щитика, густо покрытъ очень мелкими золотистыми волосками. Голова желтая, сильно пунктирована; промежутки между точекъ очень мелко пунктированы, равны самимъ точкамъ; покрыта короткими золотистыми волосками. Переднеспинка поперечная, сильно сердцевидная, съ утолщенными боковыми краями, значительно уже (почти въ 1½ раза) надкрыльй, густо пунктирована и покрыта золотистыми волосками; разстоянія между точками больше ихъ самихъ, мелко пунктированы; въ основаніи немного уже основанія надкрыльй. Надкрылья по плечамъ закруглены, очень густо и мелко пунктированы, съ неправильными рядами крупныхъ точекъ, на концахъ морщинисты, довольно густо покрыты золотистыми волосками. — Дл. 2,5 мм.

Персія, Керманъ, Мекранъ, 1 экз. 9. III. 1901. Н. Зарудный (колл. П. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

Отъ извѣстныхъ видовъ отличается прозрачностью, величиной и пунктировкой, отъ соѣдняго съ нимъ *unicolor* Ritter.—формою тѣла, цвѣтомъ волосковъ и морщинистостью концовъ надкрыльй.

Lithophilus zarudnyi, sp. n.

L. semenovi m.⁶⁾ similis, sed multo major. Ovalis, totus rubro-rufus, interdum subtus nonnihil obscurior; pronoto, interdum margine angustissimo elytrorum rubro-rufis; pedibus, antennis palpisque dilutioribus; oculis nigris. Caput rufo-flavum, cereberrime punctatum pilisque minimis flavidis vestitum. Pronotum transversum, angustum, medio elytrorum sesqui angustius, sat cerebre ac grosse punctatum pilisque parvis flavidis obtectum; interspatiis punctorum quam puncta ipsa multo majoribus; latitudine basis latitudini apicis aequalis vel parum major; leviter cordiforme; angulis postice fere rectangularibus; basi quam elytrorum basis multo angustiore. Scutellum elytris concolor, vel interdum parum obscurius. Elytra basi quam pronoti basis latiora, angulis humeralibus nullis, pilis griseis dense vestita, a basi retrosum obtuse rotundata, medio fere parallela, postice obtuso-rotundata, ruditer inaequaliterque punctata; interspatiis punctorum majorum punctis ipsis fere aequalibus tenuiterque punctulatis.—Long. 3,75—5 mm.

Persia orient.: prov. Chorassan, N. Zarudny, cui dedico, 21—22. X. 1898.—Specimina numerosa (coll. cl. P. P. Semenov-Tjan-Shanskyy).

А *L. unicolor* Ritter⁷⁾, cui proximus, forma corporis, magnitudine, structura pronoti puncturaque elytrorum distinguendus.

5) Reitter, Edm. Uebersicht der bekannten *Lithophilus*-Arten. Deutsche Ent. Zeitschr., XXVII, 1883, pp. 62—64.

6) Cf. 4).

7) Cf. 5).

Похожъ на *L. semenovi* m., но значительно больше его. Овальный красно-рыжий, иногда снизу немного темнѣе, переднеспинка, а иногда и узкий раптикъ вокругъ надкрыльй красно-рыжіе, ноги, антены и пальцы свѣтлѣе, глаза черные. Голова красно-желтая, очень густо пунктирована и покрыта очень мелкими желтоватыми волосками. Переднеспинка широкочаша, узкая (въ 1 $\frac{1}{2}$ раза уже средины надкрыльй), довольно густо и крупно пунктирована и покрыта мелкими желтоватыми волосками, промежутки между точками значительно больше ихъ самихъ; ширина основанія ея равна ширинѣ передняго края (или немного больше); слабо сердцевидная, задніе углы почти прямые; основаніе переднеспинки значительно уже основанія надкрыльй. Щиткъ одноцвѣтныи съ надкрыльями иногда немного темнѣе ихъ. Надкрылья въ основаніи шире основанія переднеспинки, безъ плечевыхъ угловъ, густо покрыты сѣрыми волосками, отъ основанія сразу тупо закруглены, посерединѣ почти параллельны назади тупо закруглены, грубо и ємкѣнно пунктированы, промежутки между грубыми точками, почти равные самимъ точкамъ, очень мелко пунктированы. Дл. 3,5—5 мм. 13 экз.

Восточная Персія: Хорасанъ, И. Зарудный, въ честь котого и называю этотъ видъ; 21—22. X. 1908 (coll. П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго).

Отличается отъ соѣднаго съ нимъ *L. unicolor* Ritter общей формой тѣла, строеніемъ переднеспинки и пунктировкой.

***Lithophilus bipustulatus*, sp. n.**

L. semenovi m. ⁸⁾ proximus, sed angulis posticis pronoti acutis, nonnihil extrosum eminentibus mox distinguendus. Ovalis, rufus, capite obscuro, elytris (margin'e angusto maculisque sat magnis oblongis in apice fulvo-rufis exceptis) nigris; dense pilis longis griseis vestitus. Caput cebre punctatum pilisque parvis flavidis vestitum; interspatiis punctorum punctis ipsis aequalibus. Pronotum transversum, leviter cordiforme, angulis posticis acutis extrosum eminentibus, lateribus nonnihil incrassatum, ceberrime punctatum (interspatiis punctorum quam puncta ipsa minoribus), pilis pertenuibus vestitum; basi elytrorum basi aequali. Elytra angulis humeralibus eminentibus carentia, inde a basi rotundata, ovalia, latitudine maxima in dimidio sita, haud cebre rude punctata, interspatiis punctorum rugulosis, pilis flavo-griseis obtecta. Subtus obscurus, elytrorum epipleuris, sternitis tribus ultimis abdominis, pedibus, antennis palpisque flavis.—Long. 3,3 mm.

Turkestan: mons Pangu-Dagh, С. А л и г е р! 30. X. 1902. Solum specimen (coll. cl. P. P. Семенов-Тянь-Шанскы).

A speciebus jam cognitis structura angulorum posticorum pronoti et punctura rugositateque elytrorum facile distinguitur.

Очень близокъ къ *L. semenovi* m., но легко отличается отъ послѣдняго острыми, немного выступающими въ бока задними углами

8) Cf. 4).

переднеспинки. Овальный, рыжо-красный; голова темная; надкрылья за исключением узкого желто-красного рантика и двух желто-красных довольно больших продолговатых пятен на концах — черные; густо покрыты длинными сбрывыми волосками. Голова темная, густо пунктирована: разстояние между точками равны самим точкам; покрыта мелкими желтоватыми волосками. Переднеспинка неперечная, слабо-сердцевидная, съ выступающими въ бока остройми задними углами, по боковымъ краямъ со слабыми утолщениеми, очень густо пунктирована: разстоянія между точками меньше самихъ точекъ; покрыта очень тонкими желтыми волосками; основаніе переднеспинки равно основанію надкрыльй. Надкрылья безъ выступающихъ плечевыхъ угловъ, прямо отъ основанія закруглены; овальная, имѣютъ наибольшую ширину по срединѣ, не густо грубо пунктированы; промежутки между точками мелко морщинисты, сплошь покрыты длинными желтовато-сбрывыми волосками. Снизу темный, нижний ободокъ надкрыльй, три постъдніе брюшныхъ сегмента, ноги, антennы и пальцы желтые.—Дл. 3,3 мм.

Туркестанъ, гора Пангу-Дагъ, 30. X. 1902 К. А н г е р ъ! (1 экз. въ коллекціи П. П. Семенова-Тянъ-Шансаго).

Легко отличается отъ извѣстныхъ уже видовъ строеніемъ заднихъ угловъ переднеспинки, пунктировкой и морщинистостью надкрыльй.

Lithophilus glazunovi, sp. n.

L. jacobsoni m. simillimus, sed paulo major. Oblongus, planus, totus rufus (oculis nigris exceptis), pilis flavo-incanis, nitidis longisque dense obtectus. Caput rude punctatum, interspatiis punctorum quam puncta ipsa majoribus, pilis griseo-flavis vestitum. Pronotum transversum, sed minus quam in *jacobsoni*. planum, cordiforme, lateribus incrassatis, latioribus atque planioribus quam in *jacobsoni*, cibre punctatum, interspatiis punctorum punctis ipsis fere aequalibus et sat dense griseo-flavo pilosum. Angulis posticis obtusangularibus (in *jacobsoni* plus rectangularibus et fere parallelis). Basi quam elytrorum basis angustius (in *jacobsoni* nonnihil angustius). Elytra basi recta, pronoti basi latiora, in humeros atque apieem rotundata sed minus fortiter quam in *jacobsoni*, medio parallela (quare magis attenuata esse apparent), capite pronotoque parum obscuriora, dense punctata, punctis parvis cum punctis majoribus commixtis, quae latera versus in series plus regulares transeunt, dorso flavo-incano obtecta, lateribus adeo densius et quam in *jacobsoni* scribus parallelis longitudinalibus distincte explicatis punctorum fortioribus pilos maiores aureo-incanos gerentium, interspatiis punctorum punctis ipsis superantibus tenuiterque rugulosis.—Long. 3 mm.

Turkestan occid.: provincia Syr-darjensis, districtus Perovsk, Baigakum prope Dzhulek, 1 specimen 3. VII. 1907, D. G l a z u n o v, cui species dedico, captum et mihi liberaliter communicatum.

Формою тѣла похожъ на *L. jacobsoni* m., но больше его. Продолговатый, плоский, весь рыжий за исключениемъ черныхъ глазъ,

густо покрытъ желто-сѣдыми блестящими длинными волосками. Голова густо пунктирована грубыми точками, разстоянія между которыми больше ихъ самихъ; покрыта желтовато-сѣрыми волосками. Переднеспинка попечная (но менѣе, чѣмъ у *Jacobsoni*), плоская, сердцевидная, съ утолщенными боковыми краями, которые шире и плосче, чѣмъ у *Jacobsoni*, грубо пунктирована; разстоянія между точками почти равны самимъ точкамъ; довольно густо покрыта желто-сѣрыми волосками; задніе углы тупые (у *Jacobsoni* прямые—почти параллельные), основаніе переднеспинки уже (чѣмъ у *Jacobsoni*) основаній надкрылій. Надкрылья въ основаніи прямые, шире основанія переднеспинки, къ плечамъ закруглены, но менѣе круто, чѣмъ у *Jacobsoni*, по срединѣ параллельныя и квадраты не такъ тупо, какъ у *Jacobsoni* закруглены (отчего получается впечатлѣніе болѣе вытянутою), немного темнѣе, чѣмъ голова и переднегрудь, густо пунктированы; мелкая пунктировка перемѣщана съ болѣе крупными точками, которая къ бокамъ переходитъ въ болѣе правильные ряды; покрыты желто-сѣдыми волосками, къ бокамъ гуще, въ крупныхъ точкахъ болѣе длинные волоски. Промежутки между точками значительно больше ихъ самихъ и мелко шагренированы.—Дл. 3 мм.

Сырь-дарынская обл., Первый уѣздъ, Байгакумъ близъ Джулека, найденъ 1 экз. 3. VII. 07, Д. К. Глазуновымъ, въ честь которого и называю этотъ видъ, и любезно переданъ мнѣ.

Lithophilus sumakovi, sp. n.

L. connato Panz. proximus, sed multo major. Oblongus, convexus, piceo-niger, elytris nigris, nitidis, pronoto, prosterno, elytrorum apicibus plus minusve, pedibus, antennis palpisque cinnamomeo-rufis, tarsis tibiarumque parte superiore pedum posticorum piceo-nigris, unguiculis rubro-ferrugineis. Caput rufo-ferrugineum, cerebre punctatum, interspatiis punetorum punctis ipsis nonnihil superantibus, pilis aureolis, nitidis, tenuibus obtectum, oculis adeo densius et longius pubescens. Pronotum transversum, cordiforme, angulis posticis fere rectangularibus, sat convexum, cinnamomeo-rufum, dense punctatum, interspatiis punetorum quam puneta ipsa majoribus, in medio pilis parvis flavis vestitum, ad lateribus late explanatis, hicque pilis longioribus griseo-flavis obtectum, basi quam elytrorum basis multo angustius. Elytra nigra (aut anguste rufo marginata) oblonga, in medio parallela, angulis humeralibus magis eminentibus (magis quam in *connato*), dense tenuiterque punctata seriebusque irregularibus punetorum fortiorum distincte explicatis ornata et dense (densius quam in *connato*) pilis albis minutissimis nitidisque obtecta.—Long. 4,8—5 mm.

Turkestan: statio Kulbastau inter Tshimkent et Aulie-Ata, in deserto.—Specimina 3; 24. III. 1906 capta et a G. Sumakov, cui speciem dedico, mihi liberaliter communicata.

A speciebus iam cognitis magnitudine multo majore, punctura minutissima pilositateque elytrorum mox distinguendus; a *L. major* Crotch e Persia—structura pronoti puncturaque etc.

Очень близокъ къ *L. connatus* Ранз., по значительно больше его. Продолговатый, выпуклый, смоляно-черный; надкрылья черные, блестящія; переднеспинка, переднегрудь, концы надкрыльй (въ большей или меньшей мѣрѣ), ноги, антениы и пальцы краепо-вато-желтые, лапки и верхняя часть голеней заднихъ ногъ смоляно-черныя, коготки на нихъ красно-желтые. Голова красно-желтая, густо пунктирована; разстоянія между точками немного больше самихъ точекъ; покрыта золотистыми блестящими тонкими волосками; къ глазамъ эти волоски гуще и длиннѣе. Переднеспинка поперечная, сердцевидная, съ почти прямыми задними углами, довольно выпуклая, съ широкими боковыми утолщеніями, коричнево-красная, довольно густо пунктирована; разстоянія между точками больше самихъ точекъ; покрыта по срединѣ довольно короткими желтоватыми волосками; на боковыхъ утолщеніяхъ и около нихъ волоски длиннѣе, сѣровато-желтые; основаніе переднеспинки значительно уже основанія надкрыльй. Надкрылья черные (иногда окружены узкимъ желтымъ рантикомъ), продолговатыя, въ срединѣ параллельныя, съ сильно выступающими (сильнѣе чѣмъ у *connatus*) плечевыми углами, густо и мелко пунктированы, съ неправильными рядами крупныхъ точекъ; довольно густо покрыты (гуще чѣмъ у *connatus*) бѣлыми блестящими короткими волосками.—Дл. 4,8—5 мм.

Туркестанъ: станція Кульбастау, въ степи между Чимкентомъ и Аулѣ-ата, 24. III. 1906, 3 экз. въ коллекціи Г. Г. Сумакова, въ честь котораго я называю этотъ видъ.

Отличается отъ извѣстныхъ уже видовъ своей большої величиною, мелкой пунктировкой и блестящей волосистостью надкрыльй; отъ *L. major* Сготсѣн изъ Персіи—формою переднеспинки, пунктировкой и т. д.