

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновыимъ, Н. Р. Кокуевыимъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ †

ИЗДАВАЕМОЕ
Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

подъ редакціей
Ф. А. Зайцева.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev †, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky,
N. Shiriajev et T. Tshitsherin †

PUBLIÉE PAR
la Société Entomologique de Russie

sous la rédaction de
Ph. Zaitzev.

X.

1910.



С.-Петербургъ — St.-Pétersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Изд. п., 7 рота, 26).

1911.

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Конуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ-
Тянъ-Шанскимъ, Т. С. Чичеринымъ †, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ †

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

подъ редакціей

Ф. А. Зайцева.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov, A. Jakovlev †, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shansky,
N. Shiriajev et T. Tshitsherin †

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie

sous la rédaction de

Ph. Zaitzev.

1910.

Т. X. № 1—2.

Выпушль въ снѣтъ 1 сентября 1910.
Paru le 11 septembre



С.-Петербургъ — St.-Pétersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Изм. п., 7 рота, 26).

1910.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА:

- Извлечение изъ протокола
попы Общихъ Собраний Об-
щества за 1910 г. 1
- Андрей Семеновъ-Тянъ-
Шанский, О значеніи задачахъ,
Русскаго Энтомологическаго Об-
щества LI
- Андрей Семеновъ-Тянъ-
Шанский, Александръ Ивано-
вичъ Яковлевъ (22. II. 1863.—
† 28. XII. 1909). Его жизнь, обще-
ственная и научная дѣятельность.
(Съ портретомъ). LXI

ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ¹⁾:

- Никита Кокуевъ, Материалы
для фауны перепончатокрылыхъ
Россіи. II. Списокъ найденныхъ въ
Россіи видовъ изъ семейства *Eva-
niidae* и описание новыхъ 1
- А. Н. Кирichenko, Hemiptera-
Heteroptera окрестностей г. Вельска,
Вологодской губ. 10
- А. А. Яхонтовъ, Признаки
холодовой формы у кавказской раз-
новидности *Vanessa io* L. (? var.
sardoa Stgr.) (Lepidoptera, Nym-
phalidae) 11
- * В. Кожанчиковъ, Къ по-
знанию представителей трибы *Apho-
diini* (Coleoptera, Lamellicornia) 18
- А. Н. Кирichenko, Новый видъ
р. *Phimodera* Gertt. съ Алтая (He-
miptera-Heteroptera, Pentatomidae) 21
- А. Дьяконовъ, Описание по-
ловинного гермафрода *Coenonympha*
hero L. (Lepidoptera, Satyridae).
(съ 3 рис.). 23
- А. Н. Бартеневъ, Къ фаунѣ
Odonata Кубанской области 27
- В. Баровскій, Новые азиатские
виды р. *Lithophilus* Frhl. (Coleo-
ptera, Coccinellidae) 39
- * Андрей Семеновъ-Тянъ-
Шанский, Къ фаунѣ среднеазиат-
скихъ пековъ. I. Обзоръ видовъ р.
Argyrophana Sem. 1889 (Coleoptera,
Tenebrionidae) 42
- А. А. Яхонтовъ, *Epinephele*
lupinus Costa (Lepidoptera, Satyri-
dae) и ея кавказская форма 45
- * Я. П. Целкановичъ, Къ
познанию рода *Bergiola*, nom. n.
(*Bergiella* Stschelkan. 1907) (Ortho-
ptera, Decticidae). (Съ 1 рис.). 50
(Продолжение см. на 3 стр. обложки).

SOMMAIRE.

BULLETIN ENTOMOLOGIQUE:

- Comptes-Rendus des Séan-
ces de la Société en 1910 I
- André Semenov - Tian -
Shansky, Le rôle et la tâche de la
Société Entomologique de Russie LI
- André Semenov - Tian -
Shansky, Alexandre Jakovlev
(22. II. 1863 — † 28. XII. 1909).
Sa vie et son œuvre. (Avec por-
trait). LXI

MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES¹⁾:

- * N. Kokujev, Contributions à
la faune des Hyménoptères de Russie.
II Liste des espèces de la famille
Evanidiidae trouvées en Russie avec
la description de quelques nouvelles
formes 1
- * A. N. Kiritshenko, Hémi-
ptères-Hétéroptères des environs de
Veisk, gouvernement de Vologda 10
- * A. A. Jachontov, caracté-
res de la forme réfrigérée de *Vanessa*
io L. (? var. *sardoa* Stgr.) (Lepi-
doptera, Nymphalidae) 14
- B. Koschantschikov, Beitrag
zur Kenntnis der *Aphodiini* (Coleo-
ptera, Lamellicornia) 18
- * A. N. Kiritshenko, Espèce
nouvelle du genre *Phimodera* Latr.
trouvée dans l'Altaï (Hemiptera-Hete-
roptera, Pentatomidae) 21
- * A. Djakonov, Description
d'un exemplaire gynandromorphique
de *Coenonympha hero* L. (Lepidoptera,
Satyridae). (Avec 3 fig.) 23
- * A. N. Bartieniev, Contribu-
tions à la faune des Odonates de la
province du Kuban 27
- * V. Barovsky, Espèces nou-
velles du genre *Lithophilus* Frhl.
(Coleoptera, Coccinellidae) de l'Asie. 39

- Andreas Semenov - Tian -
Shansky, Symbolae ad faunam de-
sectorum mesasiaticorum. I. Synopsis
specierum generis *Argyrophana* Sem.
1889 (Coleoptera, Tenebrionidae). 42

- * A. A. Jachontov, *Epinephele*
lupinus Costa (Lepidoptera, Satyri-
dae) et ses formes du Caucase 45

- J. P. Stschelkanovtzev, Zur
Kenntnis der Gattung *Bergiola*, nom. n.
(*Bergiella* Stschelkan. 1907) (Or-
thoptera, Decticidae) (Mit 1 Textfig.) 50
(Voir p. 3 de la couverture).

¹⁾ Les titres traduits sont marqués d'un astérisque.

В. Баровский (С.-Петербургъ).

Новые азиатские виды *Lithophilus* Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae).

Lithophilus minimus, sp. n.

L. pallido Crotch proximus, sed minor, angulis humeralibus minus eminentibus (fere nullis). Minimus, oblongo-ovalis, convexus, nitidus, rufo-ferrugineus (oculis nigris, antennis, palpis pedibusque rufis exceptis), sat dense aureolo-pilosus, cerebro punctatus (pronoto elytrisque inaequaliter). Caput rufum, raro-punctatum, aureolo-pilosum. Pronotum cordiforme, elytris distinete angustius, margine laterali ipso crassiusculo reflexoque, angulis posticis fere rectangularibus; basi quam elytrorum basis angustius, inaequaliter punctatum, interspatiis punctorum fortiorum quam puneta ipsa multo majoribus tenuiterque punctulatis. Elytra ovalia, convexa, rufo-ferruginea (apice obscurius), angulis humeralibus fere nullis, basi quam pronoti basis latiora; dorso seriebus irregularibus punctorum fortiorum ornata, interspatiis punctorum majorum inaequalibus, quam puneta ipsa nonnihil majoribus tenuiterque punctulatis; subtus rufus, raro-punctatus, aureolo-pilosus.— Long. 2 mm.

Persia occ.: Luristan: Salmi, 3. I. 1904, N. Zarudny! Solum specimen (coll. et. P. Semenov-Tjan-Schansky).

A speciebus jam cognitis magnitudine parva, a *L. jacobsoni* Vagov. 1909 punctura pilositateque elytrorum facile distinguitur.

Очень близокъ къ *L. pallidus* Crotch, но отличается отъ него меньшей величиной и слабо выраженными плечевыми углами которые почти отсутствуютъ, приближая его такимъ образомъ къ *unicolor* Ritter. и другимъ видамъ съ закругленными плечами. Очень маленький, продолговато-ovalный, выпуклый, блестящий, желто-буро-рыжий (за исключениемъ черныхъ глазъ, рыжихъ сяжковъ, щупальцевъ и ногъ), довольно густо покрытъ золотистыми волосками, грубо пунктированъ (переднеспинка и надкрылья смѣшанно-пунктированы крупными и мелкими точками. Голова рыжая съ разбросанными точками, покрыта довольно длинными золотистыми волосками.

Переднеспинка сердцевидная, ясно уже (въ самой широкой своей части) надкрылій, съ утолщеными боковыми краями и почти прямыми задними углами; основание переднеспинки уже основания надкрылій; пунктирка смѣшанная, промежутки между грубыми точками значительно больше самихъ точекъ, мелко пунктированы. Надкрылья овальныя, выпуклые, рыже-буро-желтые (къ концу темнѣе), съ очень слабо выраженнымъ плечевыми углами, въ основаніи шире основанія переднеспинки, сверху покрыты неправильными рядами крупныхъ точекъ, промежутки между которыми, болѣе чѣмъ сами точки, очень мелко пунктированы. Снизу рыжій, разсѣяно пунктированный, покрытъ золотистыми волосками. — Дл. 2 мм.

Зап. Персія: Луристанъ: м. Сальми, недалеко отъ р. Каруна, 3. I. 1904, Н. Зарудный! (Одинъ экземпляръ въ колл. П. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

Lithophilus hissariensis, sp. n.

L. ovipenni Crotch similis, sed angulis humeralibus minus eminentibus, fere nullis (ut in precedenti). Ferrugineus (dorso elytrorum piceo-nigro oculisque nigris exceptis), ovalis, convexus, nitidus. Caput raro-punctatum pilisque flavis longis nitidis obtectum. Pronotum transversum, longitudine duplo latius, cordiforme, antrorsum angustatum, antice sinuatum, angulis anticis antrorsum valde prominentibus, basi quam elytrorum basi nonnihil angustius, fusco-lituratum; crebre inaequaliter punctatum et dense flavo-pilosum. Elytra ovalia, convexa, dorso nigra, margine rufo excepto: in lateribus angusto, latiore antice in humeris et postice in apicibus ut in *kozlovi* Barov. 1909; basi quam pronoti basis nonnihil latiora, angulis humeralibus obtusangularibus fere nullis; dorso seriebus irregularibus punctorum fortiorum distincte explicatis ornato; interspatiis punctorum majorum inaequalibus, quam puncta ipsa multo majoribus, crebre tenuiterque punctulatis et dense pilis aureolis sat longis obtecta. Subtus ferrugineus, capite sternoque obscuriore excepto.—Long. 3,3—3,5 mm.

Buchara or. (Hissar): fl. Tupalang 1898, Willberg! Specimina 2 (coll. cl. P. Semenov-Tjan-Shansky).

Очень похожъ на *L. ovipennis* Crotch, но легко отличается отъ него весьма слабо выраженнымъ плечевыми углами. Желто-буро-рыжій (за исключениемъ смоляно-черной верхней части надкрылій и черныхъ глазъ), овальный, выпуклый, блестящій. Голова рѣдко пунктирована и покрыта длинными блестящими желтыми волосками. Переднеспинка поперечная, въ два раза шире своей длины, сердцевидная, спереди выемчатая и съуженная, съ сильно выступающими передними углами, въ основаніи уже основанія надкрылій, покрыта неясными бурыми пятнами (у обоихъ описываемыхъ экземпляровъ одинаково) грубо пунктирована точками разной величины и покрыта желтыми волосками. Надкрылья овальные, выпуклые, сверху черные, узкая боковая кайма, расширяющаяся къ плечамъ

и задняя часть ихъ желтая (какъ у *kozlovi* Вагор. 1909), въ основаніи шире основанія переднесинки, съ очень слабо выраженнымъ (почти отсутствующими) плечевыми углами; сверху усѣянъ неправильными, но все же замѣтными рядами крупныхъ точекъ, разстоянія между которыми, болѣе чѣмъ сами точки, часто и очень мелко пунктированы; густо покрытъ довольно длинными золотистыми волосками. Снизу темно-буро-рыжій, хотя нѣсколько светлѣе чѣмъ сверху, за исключеніемъ болѣе темныхъ головы и груди.—
Дл. 3,3—3,5 мм.

Вост. Бухара (Гиссаръ): верховья рѣки Тупаланга, Вильбергъ, 1898 г. (2 экземпляра въ колл. П. И. Семенова-Тянь-Шапсакаго).